

POCKET

PDF BOOKS FREE PK

عابد کینٹ
میٹریا میڈیکا

• ڈاکٹر عابد
• ڈاکٹر مسعود حفیظ

مرتب:

عثمان پبلی کیشنز

پاک

عابد کینٹ میڈیر یا میڈیکل گائیڈ

مصنف

ڈاکٹر مسعود حفیظ رفاعی ایم۔ اے

نظر ثانی

حکیم و ڈاکٹر عابد

ڈاکٹر احمد مسعود ایم۔ اے

ناشر عثمان پبلی کیشنز

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-7640094

سیل پوائنٹ

جلال دین ہسپتال بلڈنگ اردو بازار لاہور

0333-4275783 موبائل

فون نمبر

انتساب

امراض کے یلغار سے دکھی انسانیت کے

محسنِ عظیم

سید سید منہا

کے نام

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	ایومنا	۹	حرف اول
۵۷	انا کارڈیم ۲۵	۱۲	کچھ اس میٹریا میڈیکا کے بارے میں
۵۰	ایس مینفیکا	۱۵	آر سینکم البوم
۵۳	ایوسا سٹم	۱۸	آر سینکم آئیوڈائیڈ
۵۵	ایسا ٹوڈا	۲۰	آر جنٹیم ٹائیٹریٹ
۵۷	ایسڈ پورک	۲۳	آرم ٹیٹیکم
۵۹	ایسڈ سلف	۲۴	آرم میور
۵۹	ایسڈ فاس	۲۶	آرنیکا ٹانٹ
۶۲	ایسڈ ٹائیٹریٹ	۲۸	آئرس ورس
۶۸	ایسڈ ٹائیٹریٹ روڈیاک	۲۹	سارٹوڈیم
۷۰	ایسکیوس ہپ	۳۱	ابرا ٹینم
۷۲	ایکونائٹ	۳۳	اپیکاک
۷۶	ایگنس کاسٹس	۳۵	اکٹیا رسی موسا
۷۸	ایلو	۳۷	انیشیا
۸۲	ایلیٹیم سیپا	۴۰	ایر کیس

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۷	ٹیری بنتھیا	۸۳	ایمرا گیشیا
۱۴۰	جیشیا	۸۶	ایونیم کارب
۱۴۱	جلی میم	۸۹	اینٹی مونیم ٹارٹ
۱۴۲	چائنا	۹۲	اینٹی مونیم کروڈ
۱۴۷	چنی نم سلف	۹۵	پیشیا
۱۴۹	چیلی ڈونیم	۹۸	برائی اونیٹا
۱۵۱	چیو تھقس	۱۰۳	بریکس ونگر
۱۵۳	ڈانسکوریٹا	۱۰۵	بریٹا کارب
۱۵۶	ڈوروسرا	۱۰۷	بلاٹا اوری
۱۶۰	ڈورکامارا	۱۰۸	بوریکس
۱۶۳	ڈیجی ٹیلیس	۱۰۹	بیٹا ڈونا
۱۶۹	روٹا ۱۶۶ رٹاکس	۱۱۳	پاڈونفا سلیم
۱۷۰	روڈو ڈینڈرن	۱۱۶	پیرولیم
۱۷۲	ریٹینیا	۱۱۸	پلائینا
۱۷۴	رین کولس بلب	۱۲۰	پلسا ٹیل
۱۷۵	ریومیکس	۱۲۲	پلمیم ٹیلیکم
۱۷۷	ریوہم	۱۲۶	تھوجیا
۱۷۹	زنجیبر	۱۳۰	ٹوبریکیولینیم
۱۸۰	زنگم ٹلیکم	۱۳۲	ٹوبیکم
۱۸۱	سابل سیرولاٹا	۱۳۸	ٹیرنولا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۸	سیمی	۱۸۴	سار سا پرپلا
۲۲۰	سیکیل کار	۱۸۶	ساٹھ بھیم
۲۲۲	سیلینیر	۱۸۷	سایکیوٹا
۲۲۳	سیٹی کولا	۱۸۹	سائنا
۲۲۵	ٹاسفوس	۱۹۱	سبادیلا
۲۲۷	ٹاسٹولا کا	۱۹۲	سبانا
۲۲۹	ٹائی سو شگما	۱۹۴	سپانچیا
۲۳۰	ٹلورک ایسڈ	۱۹۶	سپائی جیلا
۲۳۲	ٹیرم ٹیلکیم	۱۹۸	ٹائی سیگیا
۲۳۴	ٹارباک ایسڈ	۲۰۰	ٹٹانم
۲۳۵	ٹاربو انیمالس	۲۰۲	ٹٹامونیم
۲۳۷	ٹاربووج	۲۰۳	ٹٹلینم
۲۳۹	ٹاسٹیم	۲۰۶	ٹٹف
۲۴۱	ٹافیا کروڈا	۲۰۸	ٹٹیشیا
۲۴۲	ٹاپیکیم	۲۱۰	ٹٹوکس ٹائیڈا
۲۴۳	ٹالیا	۲۱۲	ٹٹفٹم
۲۴۵	ٹالین سونیا	۲۱۳	ٹٹسی فیوگا
۲۴۶	ٹالوسنتہ	۲۱۳	ٹٹونیریا
۲۴۷	ٹالونائلم	۲۱۵	ٹٹونیم
۲۴۸	ٹالی باٹیکرام	۲۱۷	ٹٹونوٹس

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۹	کینتھرس	۲۵۰	کالی برومیٹم
۲۹۲	کیوریوم ٹیلیکم	۲۵۲	کالی کارب
۲۹۵	گرنفائٹس	۲۵۴	کروٹن گجک
۲۹۷	گواناٹن	۲۵۵	کروکس سٹائوا
۲۹۹	گوس پیچم	۲۵۶	کریازوٹ
۳۰۱	لانی سین	۲۵۸	کریٹے گس
۳۰۳	لایکو پوڈیم	۲۶۰	کلکیر یا آرس
۳۰۵	لیمیم گجک	۲۶۱	کلکیر یا فاس
۳۰۸	لوبیلیا	۲۶۲	کلکیر یا کارب
۳۱۰	لیڈم پان	۲۶۴	کو کا
۳۱۲	لیکے سس	۲۶۶	کو کوسس
۳۱۴	مانکس	۲۶۸	کو نیم
۳۱۶	مرکیوریس	۲۷۰	کیپی کم
۳۱۸	مرکیوریس بن آئیوڈائیڈ	۲۷۲	کیکنس
۳۱۹	مرکیوریس پیرائیوڈائیڈ	۲۷۵	کیلنڈولا
۳۲۰	مرکیوریس سال	۲۷۸	کیلنڈیم
۳۲۲	مرکیوریس سائی	۲۸۰	کیفر
۳۲۳	مرکیوریس کار	۲۸۳	کیموٹلا
۳۲۵	مٹی فولیم	۲۸۵	کینا بس انڈیکا
۳۲۶	میڈورینم	۲۸۷	کینا بس سٹائوا

	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۸	درتیرم درایت	۳۲۸	مزیریم
۳۵۰	دریر یو لینیم	۳۲۹	علی لوشس
۳۵۱	نایئر پر کیم	۳۳۰	میور کس
۳۵۲	نایئر اسٹس	۳۳۲	ناجا
۳۵۳	نایئر کوٹا میں	۳۳۳	نکس موسکٹا
۳۵۵	نایئر سیامس	۳۳۵	نکس وامیکا
۳۵۷	پیر سلف	۳۳۸	نیرم سلف
۳۶۰	ہیکلا لاوا	۳۴۰	نیرم میور
۳۶۱	ہیامیلس	۳۴۲	نیقالییم
۳۶۳	یوپے ٹوریم پرف	۳۴۴	ورسکم
۳۶۶	یوزریشیا	۳۴۶	وریریم البم

حرفِ اوّل

ہومیو پیتھی ، جیسا کہ ہر ہومیو پیتھ کو سچوئی علم ہے ، علاج بالمثل ہے یعنی جس دوا کی بیشتر علامات (خاص کر مخصوص علامات) مریض کی اپنی علامتوں سے مطابقت رکھتی ہوں ، وہی دوا اس مریض کے لئے شفا بخش ہوگی۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اور صرف ہومیو پیتھک میڈیا میڈیکا (خواص الادویہ) کا پورا علم مکمل ہومیو پیتھک معالج بنانے کا ضامن ہو سکتا ہے۔

جب سے ہومیو پیتھک طریق علاج کی عظیم دریافت منظر عام پر آئی ہے اس وقت سے اب تک ہومیو پیتھک خواص الادویہ پر مبنی ان گنت میڈیا میڈیکا معرض وجود میں آچکے ہیں۔ نہ صرف انگریزی زبان میں بلکہ اردو میں بھی ایسی متعدد کتب موجود ہیں۔ بلاشبہ ہر مصنف نے بڑی ہی جانفشانی اور پوری پوری قابلیت سے اپنی اپنی تصانیف ترتیب دی ہیں اور ان جملہ علمی خدمات کا اعتراف اور ان کی قدر کرنا جہاں فرض ہے۔

تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیر نظر میڈیا میڈیکا پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی ہے جو ان کے طویل پر چند ایک معروضات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

عام طور پر جو ہومیو پیتھک میڈیکل ایڈریجیٹس میں۔ ان میں ایک خصوصیت مشترک طور پر نظر آئے گی۔ وہ یہ کہ ہر دوا خاص کر اہم ادویہ کی علامات کا پھیلاؤ کچھ زیادہ ہی وسیع ہوتا ہے۔ ہر مصنف کی بالعموم یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ادویہ کی زیادہ سے زیادہ علامات بلکہ تمام تحریر و ریافت شدہ تمام تر علامات کو متعلقہ دوا کے ضمن میں بیان کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوشش اپنی جگہ نہایت اہم اور مستحسن ہوتی ہے۔ کہ دوا کے خواص کا پورا علم حاصل کرنے میں اس سے مدد حاصل ہوتی ہے لیکن اس صورت حال سے جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی انکار ممکن نہیں۔

ایک تو یہ علامات کی وسیع جبرمار سے ایک عام ہومیو پیتھک کو کئی ایک مختلف ادویہ میں یکسانیت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے لئے بعض کئی بالمشکل دوا جاننا بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ دوسری وقت یہ پیش آتی ہے کہ علامات کی بہتات کے باعث ایک عام ہومیو پیتھک کے لئے ادویہ کے خواص کو ذہن نشین کرنا کافی محال ہو جاتا ہے۔

زیر نظر میڈیکل ایڈریجیٹس میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ ادویہ کی علامات جو بیک وقت کئی ایک ادویہ میں مشترک ہوتی ہیں سرے سے نظر انداز نہ ہوں بلکہ مناسب طریق پر اختصار سے پیش کر دی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر دوا کی مخصوص علامات کچھ ایسے انداز سے تحریر کر دی جائیں کہ وہ آسانی قاری کے ذہن نشین ہو سکیں اور ان ہی علامات، نازقہ کی روشنی میں وہ مختلف ادویہ کے فرق کو بخوبی یاد رکھ سکے۔

میڈیکل ایڈریجیٹس کی بڑی بڑی ضخیم اور مفصل کتب کا بھی اپنا ایک اہم مقام ہے۔ ہم ان کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے بلکہ شاید ایف ایس ایس

یعنی حوالہ دیکھنے کی کتب کے طور پر ان کی اپنی ایک مسلمہ اہمیت ہے۔ لیکن ذہن نشین کرنے کے لئے خواص الادویہ کی ایک ایسی کتاب کی ہی ضرورت ہوتی ہے جس میں اگرچہ اختصار سے کام لیا گیا ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اہم اور ضروری نکات کو نظر انداز بھی نہ کیا گیا ہو۔

زیر نظر تصنیف میں راقم الحروف نے اسی ضرورت کو پورا کرنے کی مقدور بھرگوشش کی ہے۔ یہ یقین ہے کہ یہ پیشکش اہل فن حضرات کے لئے بیحد عمدہ معاون ثابت ہوگی۔ بایں ہمہ اگر کسی وقت کسی دوست کو اس سلسلہ میں کوئی خامی یا کوتاہی محسوس ہو تو ہمیں اس سے ضرور آگاہ کریں۔ تاکہ آئندہ اشاعتوں میں اس کا تدارک کیا جاسکے۔

مسعود حفیظ رفاہی

کچھ اس

میٹر یا میڈیکا

کے بارے میں

اس میٹر یا میڈیکا کا اولین مقصد چونکہ یہی ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک عام ہومیو پیتھ کے ذہن نشین ہو سکے اس لئے روایتی انداز سے مٹ کر اس کی ترتیب تدریج کچھ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ دوا کے استعمال کا ہر پہلو حافظہ میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔

(۱) کسی دوا کی اگر کوئی بہت ہی مخصوص علامت ہے تو اس کا ذکر بالکل ابتداء میں کر دیا گیا ہے۔

ہومیو پیتھی میں اگرچہ امراض کے نام کوئی اہمیت نہیں رکھتے ، ہومیو پیتھی میں تو براہ راست مریض کی مجموعی علامات کا علاج کیا جاتا ہے لیکن عام رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ مرض کے نام کے لحاظ سے متعلقہ ادویہ فوری طور پر ذہن میں آسکیں۔ اس طریق کار کے مستحسن یا غیر مستحسن ہونے سے قطع نظر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرض بھی آخر چند ایک علامات کا ہی مجموعہ ہوتا ہے اور مرض کا نام آتے ہی اس سے متعلقہ علامات بھی مجموعی طور پر ذہن میں آجاتی ہیں۔ لہذا یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ دوا کی نام علامات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے شروع میں ان چیدہ چیدہ امراض

کا ذکر کر دیا جائے جن میں وہ دوا عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔

۹) دواؤں کی علامات کے بیان میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ عمومی

علامات کے دوران اگر اس دوا کی کوئی مخصوص علامت بھی آگئی ہے

تو اس کو خاص طور پر خط کشیدہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کسی علامت کے

نیچے آپ لیکر کیپنی ہوئی پائیں تو اسے دوا کی مخصوص علامت سمجھیں

علامات کی تفصیل کے دوران اگر کوئی ایسی خاص علامت آگئی

ہے جو اس دوا کے علاوہ مشترک طور پر کسی مزید ایک دوا یا ایک سے

زائد ادویہ میں پائی جاتی ہو تو اس علامت کے فوراً بعد بریکٹوں یعنی واہین

میں ان مزید ادویہ کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پاڈونائلم میں

کی علامات کے دوران ایک علامت آتی ہے ”بچہ دانست نکلنے کے

زمانہ میں اپنا سر ادھر ادھر چھپتے اور ستریکہ میں دھنسا ہے۔ یہ علامت

چونکہ صرف پاڈونائلم میں ہی نہیں بلکہ ایپس اور بیلاڈونا میں بھی پائی

جاتی ہے اس لئے علامت کے ساتھ ہی بریکٹوں میں ان مزید دواؤں

کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس

ایک علامت کی بنا پر ہی پاڈونائلم مریض کو نہیں دی جا

سکتی بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاڈونائلم، ایپس اور بیلاڈونا تینوں میں

کس دوا کی دیگر بیشتر علامت مریض کی علامات سے مطابقت

رکتی ہیں۔ تینوں میں سے جس دوا کی زیادہ تر علامات مریض کے

باشمل ہوں گی وہی دوا مریض کے لئے پوری طرح سودمند ہوگی۔

دوا کے انتخاب میں ماک جہان علامت کے علاوہ ایک تو

مریض کی ذہنی کیفیات اور دوسرے علامات کو گھشانے اور بڑھانے

والے عوامل بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس لئے ہر دوا کے متن میں ان امور کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

علاوہ بریں ایک ہومیو پیتھ کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی دوا کا دیگر ادویہ کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی کسی دوا سے پہلے یا بعد میں کون سی ادویہ کا استعمال موزوں ہے اور کن ادویہ کا استعمال غیر مناسب ہے۔ نیز یہ کہ مرینین پر استعمال شدہ کسی دوا کا اثر اگر کسی ضرورت کے تحت ذائل کن مقصود ہو تو مصلح کے طور پر کون سی ادویہ استعمال ہوں گی علاوہ بریں یہ کہ کوئی دوا عام طور پر کن کن طائفتوں میں مستعمل ہے۔ ایسے جگہ امور بھی جہاں جہاں ضروری سمجھے گئے۔ اس میٹریا میڈیکا میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ غرضیکہ آپ اس میٹریا میڈیکا کو دوسری ضخیم کتب کے مقابلہ میں کسی لحاظ سے تشنہ نہ پائیں گے۔ بلکہ اختصار کے باوجود اسے ایک جامع میٹریا میڈیکا پائیں گے۔

ARSENICUM ALBUM

اسسینیکم البوم

خصوصی علامات

- ۱۔ پیاس بار بار گے لیکن پانی تھوڑا تھوڑا ہی پیا جائے۔
- ۲۔ بچہ کمزوری، قوت حیات یعنی طانت کے جلد جلد سلب ہونے کی بنا پر۔
- ۳۔ دماغی بے چینی، لیکن جسمانی طور پر اس قدر کمزور ہو کہ ہل نہ سکے خصوصاً رات کو۔
- ۴۔ مریض سمجھے کہ تکلیف لا علاج ہے، موت کا خوف۔
- ۵۔ جلن وار درد، ماؤنٹ حصص آگ کی طرح جلیں لیکن گرمیٹھ سے ہی افاقہ ہو۔
- ۶۔ لیٹ نہ سکے کیونکہ لیٹنے سے دم گھٹنے کا خدشہ ہو۔
- ۷۔ غذا کی خوشبو یا غذا کی صورت برداشت نہ کر سکے (کالیکیم، سپیٹ)

عام استعمال

یہ دوا جسم کے جلد آلات اور ساختوں پر گہرا اثر کرنے والی ہے۔ فدا سی منت سے تکان ہو جائے، سمندر کے کناروں کے عوارض، چھپوں کے بعد کے نقصانات اس کے زیر اثر آتے ہیں۔ شراب یا تمباکو سے جو عوارض پیدا ہوئے ہوں، جسم کے زہریلے مادوں سے خون خراب ہو گیا ہو، خراب گوشت یا

مچھلی وغیرہ کے استعمال سے پیدا ہونے والے عوارض، ایسے امراض جو ہر سال لوٹ لوٹ کر آتے ہوں، خون کی کمی، سینہ صس، ملیریا کی کمزوری، جلدی عوارض، سخت اور مسک لافری، یرقان، سہل، جلد پر جھریاں پڑ جانا، استسقا، اور سوجن اور ہر قسم کے جریان خون وغیرہ میں مستعمل ہے۔ اسقاط حمل کا خطرہ ہوتے ہی اس کی حد تک ایک خوراک بسا اوقات اسقاط کو روکنے کی ضمانت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سرخ، بے چینی، موت کا ڈر، تنہائی کا خوف، ایک بستر سے دوسرے بستر کو جانا چاہے لیکن کسی طرح قرار نہ ہو۔

دورہ سے آنے والا دوسرا (صرف یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں ٹنڈک سے کمی ہوتی ہے۔ آر سینکم البم کی دیگر علامات گریٹ سے ہی کم ہوتی ہیں اور ٹنڈک سے بڑھتی ہیں)

آنکھوں میں دم، کھجلی، سرخی، پوٹوں کا سوجنا، پوٹوں کا چپک جانا، آنسو بہنا، جلن۔

ناک میں زہریلا زخم، کینسر، سخت جلن، زکام میں جتا ہوا پانی ناک سے بہے، مکان میں یا گرمی سے کم ہو جائے۔ سردی سے زیادہ ہو۔ کھانے کی خوشبو برداشت نہ ہو۔

چہرہ اترا ہوا، زرد، ڈراؤنا، سر چہرہ، ناک نیلی، ہونٹ سوجے ہوئے، خون بہتا ہوا، سیاہ خشک ہونٹ جس کو تر کرنے کے لئے بار بار زبان پھیرنی پڑے۔ دانت میں شدید درد جیسے کوئی شدید جھکے مارتا ہے، بستر میں یا

گرمیوں سے کم ہو، مسوڑھے سے بچنے کے لیے اور صبح و شام زبان تیلی سفید
 جودی یا سیاہ، حلق میں جلن

تمام کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کڑوا، نہایت سخت پیاس لیکن
 تھوڑا تھوڑا پانی پینے سے تسکین ہو جائے، کھانے پینے کے بعد تھوڑے
 کھانے کے خیال سے متلی ہو تو کالچیکیم اور کھانے کی بو سے متلی ہو تو
 سیاہ ودا ہوتی ہے)

دست آنا، گہری سبز آؤں، سیاہ پانی کا پتلا، بدبودار پانخانہ، انترہوں
 میں مروڑ، پانخانہ صبح و شام

کھانے پر ایسا محسوس ہو کہ سینہ میں دھواں بھرا ہے (چائنا) یا گرم کم
 بعض دفعہ خون کی چھینٹ بھی ہو۔ سانس چھوٹا خاص کر چڑھائی چڑھنے
 پر اور رات کو لیٹنے میں۔ دم گھٹنے کے ڈر کی وجہ سے لیٹ نہ سکتا۔ خشک
 اور تھکاتے والی کھانسی، رات کو دورہ سے آئے۔ سینہ میں رکاوٹ
 اور جلن، دھڑکن خاص کر رات کو چیت لیٹنے پر۔
 بخوابی، برابر بے قراری اور گھبراہٹ۔

بخار بہت تیز ہو، باری سے یا وقفہ سے آنے والا بخار، غھوٹی یا
 جراثیمی بخار جن کے ساتھ شدید کمزوری، بے چینی اور جلن کا احساس ہو
 نرسا جو آدھی رات کے بعد شدت اختیار کرے۔

مطلوب موسم میں، آدھی رات کے بعد، ٹھنڈک سے ٹھنڈ
 زیادتی :- پانی سے یا ٹھنڈی غذا سے، سمندر کے کنارے، واہنی سیاہ
 کھی :- گرمی سے، سر کو اٹھانے لکھنے سے، گرم چیزوں کے
 پینے سے۔

معاون :- کاربودیک ، فاسفورس ۔
 مصلح :- چائنا ، گریفائیٹس ، ہیرسپسلفر ، اپیکاک ، نکس و امیکا ،
 وریٹریم الیم ۔
 طاقت :- ۶ سے ۲۰ تک نیز بڑی طاقتیں بھی مستعمل ہیں ۔

ARSENICUM IODIDE

آرسینکیم آیوڈائیڈ

خصوصی علامات

- ۱۔ تمام اخراج خواہش دار اور بدبودار
- ۲۔ سسل اور دق کی سی علامات ، از حد کمزوری ، نبض تیز اور شویدہ
 بار بار نمودار ہونے والا سنجار ، شک کے پسینے ۔

عام استعمال

انفلوئنزا ، سنجار ، پرانے نرگام اور نملہ اذن میں مفید ہے ، جن
 میں اخراج خواہش دار ہوتے ہیں ۔ علاوہ بریں ناک کی اندرونی ساختوں کا
 سوج جانا ، بہا پین ، بوڑھوں کے دل کی سوزش ، قلب پر چربی چھا جانا
 نبض کا جھٹکے دار تیزی سے چلنا اور فوطوں کی سوزش نیز بالخصوص سسل اور
 دق میں مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

سر چکرائے اور ساتھ ہی سر کانپتا ہوا عسوس ہو یا مخصوص بوٹھے افراد میں، ناک سے پانی کی طرح پتلا، خراشدار، جلانیوالا اخراج اندرونی اور بیرونی نٹھنوں سے گرسے۔ چھینکیں آتی ہوں، بے فیوہ یعنی بخار کا ہی، مزمن نزلہ، ناک سوچی ہوئی، بجزرت گاڑھی زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہو، ناک میں زخم ہوں، جھلیاں دکھتی اور چھلی ہوئی ہوں، چھینکنے سے مرض میں زیادتی ہو، خنجرہ میں جلن، لوزہ میں سوچے ہوئے، ہونٹوں کی جھلیاں موٹی ہونگئی ہوں، سانس بدبودار آتا ہو، غدود ماؤٹ ہوں، خناق ہو۔

خنازیری رہد چشم، درد گوش کے ساتھ بدبودار، جلانے والی رطوبت خارج ہو، کان کا پردہ سخت ہو گیا ہو، جلن دار تیز زکام ہو۔
معدہ میں درد ہو اور کلیو جلتا ہو، کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد قے آجاتی ہو، تکلیف دینے والی مثلی ہو، پیاس شدید ہو اور پانی پینے سے فراتے ہو جائے۔

خفیف، بچنے والی کھانسی کے ساتھ نتھنے خشک اور بند ہوں، فونیا جو اچھا ہونے میں نہ آئے، برا نکو فونیا جو بخار کے بعد ہو جائے، آواز بالکل بیٹھ گئی ہو۔

بخار بار بار چڑھ جاتا ہو اور پینے آتے ہوں، رات کو پینے کی وجہ سے کپڑے تر ہوتے ہو جائیں، نبض تیز، کمزور اور بے قاعدہ چلے، سردی لگے مگر سردی کی برداشت نہ ہو۔

جلد خشک ہو، بھوسی اترتی ہو، خارش ہوتی ہے، جلد پر ٹرے بڑے

کھرنڈ اترتے ہوں، جن کے نیچے کچی جگر نمودار ہو، مچھلی کی طرح کے مھلکے جسم سے اترنے کا مرض، خنازیری غدو کا بٹھ جانا، آتشکی گھٹیاں، واٹر جی کا ایگزیا جس سے پانی کا ساموا نکلے، غارش ہو، دھونے سے تکلیف بٹھے، چھل میں بھی مفید ہے۔

طاقت :- ۳x سے ۳۰ تک اور اوپر

ARGENTUM NITRICUM

ارجم نایتریکم

تخصی علامات

- ۱- غیر معمولی یا مسلسل دماغی محنت سے ہونے والی عادی یا مزمن تکلیف
- ۲- آنکھوں میں سرخی جیسے گائے کے کچے گوشت کا رنگ ہوتا ہے۔
- ۳- مددہ کی مختلف تکالیف کے ساتھ ریاح کے اخراج کی زیادتی۔
- ۴- دست کٹھے ہوئے باریک گھاس کی طرح کے، کچھ دیر پڑا ہونے پر سبز ہو جاتے۔
- ۵- جماع کے بعد شرمگاہ سے سیاہ خون۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر دماغ اور حرام مغز پر نہایت واضح ہوتا ہے

حرام مغز میں مضمون اور بے حس ہونے کا احساس ہو، سر میں گرانی، تافتہ پاؤں میں درد، میٹھی اشیا، بکثرت کھانے کی رغبت کیساتھ نظام انہضام میں نفع اور ریج کی کثرت ہو اور ریج بلند آواز سے خارج ہو تو اس دوا کا استعمال نافع ہوتا ہے۔

عمومی علامات

کام کرنے کو جانا چاہے، خود کشی کرنے کو طبیعت چاہے، بالوسی، سر چکرائے، کان میں جھنجھناہٹ، سر کی طرف دوران خون اور کینٹیوں میں تسکین، درد، سر جو کہ چاکس کر باندھنے سے کم ہو، کان بند معلوم ہوں۔ پیوٹوں میں سرخ کتھو ریٹے ہوتے، کھجلی اور جھین ہو، پیوٹے سو جے ہوتے اور موٹے، آنکھ کے اندر کی سفیدی کی سوجن، آشوب، جیشم بکثرت کیوٹ والا۔

تصبح کو منہ سے بدبو آئے، زبان کی نوک سرخ اور تازے اجڑے ہوتے، زبان کے بیچ میں سرخ کلیہ۔

منہ کا ذائقہ میٹھا، کھیلا، شکر کھانے کو بہت جی چاہے (سانا)۔ ہر دفعہ کھانے کے بعد ٹھکار آتے اور ریج کی وجہ سے معلوم ہو کہ پیٹ چھٹ جائے گا۔ آئس کریم کھانے کے بعد سانس پیٹ میں پھیل جانے والا درد، گڑگڑاہٹ،

پانخانہ سبز، بدبو دار آؤں اور آواز کے ساتھ ریج خارج ہوں، چھٹ چھٹ کی آواز پیدا ہو، ریج بہت زور سے خارج ہو۔ پیشاب سرخ، سیاہی مائل، اس کے نیچے یوٹک ایسڈ کے ذرے بیٹھ

جائیں، پیشاب خود بخود ہو جائے، رات کو پیشاب نہ لگے۔

مردوں میں نامردی، عضو سکڑا ہوا، سوزاک، مستورات میں مباشرت کے وقت درد اور اندام نہانی سے خون کا اخراج، رحم کا باہر نکل پھینا، دم کی گردن میں گھاؤ، حیض بے قاعدہ خواہ بہت جلد خواہ بہت دیر کو، خواہ کثیر المقدار، خواہ قلیل ہو لیکن ہمیشہ گاڑھا جلتا ہوا خون نکلے، سیلانِ رحم زبرد اور چھینے والا بکثرت ہو۔

آواز سے زیادہ کام لینے والوں میں حلق کے دم کا مرض، آواز بلند کرنے سے کھانسی آتے، حلق میں دکھن، خراش، دھڑکن، ہستل۔

زیادتی :- کسی قسم کی گرمی سے، رات کو ٹھنڈی غذا سے، میٹھی اشیاء سے، کھانے کے بعد، حیض کے وقت، جذباتِ کثرت سے اور باتیں جانب۔

کمی :- ڈکاروں سے، تازہ ہوا سے، ٹھنڈک سے، دبانے سے۔

مصلح :- نیڑم میور

طاقت :- ۲ سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

AURUM METALLICUM

ہرم مٹیلکیم

تخصیصی علامات

- ۱۔ ہڈیوں کا بھر بھرا ہوا ہے
- ۲۔ رات کو ہڈیوں میں درد
- ۳۔ کھوپڑی، ناک اور تالو کی ہڈی کا زوال پذیر ہونا۔

عام استعمال

دل کی دھڑکن اور سوزش، پاسے کے اثرات بد، جنسی امراض، خنازیری حالتیں، دق، گھٹنیا اور دم مفاصل، ناک میں سونگھنے کی قوت کا زوال، قوتِ مردی کی کمی، شربانوں کی سختی، بلڈ پریشر کی زیادتی، جگر کا چھوٹا ہونا، سینہ میں درد جس میں رات کے وقت زیادتی ہو ان کیفیات میں عام طور پر استعمال ہے۔ مایخویشا شدید جس میں مریض خود کشی پر تلا ہے، یہ دوا جید مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

بید مایوسی، زندگی سے بیزاری، ہمہ وقت خود کشی کے خیالات، موت کا خوف بھی ہو۔
جسم کے مختلف حصوں کی ہڈیاں دھیرے دھیرے آشک کی مانند گل ٹر

رہی ہوں یا ان میں درم اور ورد عسوس ہو۔ جگر یا فولوں میں اجتماعِ خون
 آنکھوں کے لئے روشنی ناقابلِ برداشت ہو۔ ایک کے دو نظر آئیں یا چیز کا صرف
 نیچے کا حصہ نظر آئے اور اوپر کا حصہ دکھائی نہ دے، کانوں یا ناک سے بدبو وار اور
 کا اخراج، نوروں گلوں اور کتے ہوں، تانوں گل سڑ گیا ہو۔ معدہ میں جلن اور گرم
 ڈکار، خرد و جن گاسہ سو جے ہوئے اور پیپ دار، خصلوں میں پرانا دم یا
 خصلوں میں پانی بھر گیا ہو۔ دل بڑھ گیا ہو۔ نبض کی رفتار تیز، کمزور اور
 بے قاعدہ، رات کے وقت تنفس کی تنگی۔

زیادتی :- ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈ لگ جانے سے، موسمِ سرد میں،
 غروبِ آفتاب سے طلوعِ آفتاب تک۔

مصلح :- بیلا ڈونا، کیوریم، مرکوریس، کاکولس، سپائی جیسیا،
 پلسا ٹیلا۔

طاقت :- ۳۰ اور اوپر

AURUM MUR

ارام مریو

خصوصی علامات

- ۱۔ دم میں ٹیومر یعنی توڑی
- ۲۔ نظامِ عصی کے بگاڑ کی وجہ سے ہڈی پریشہ بڑھ جائے۔
- ۳۔ آنکھ کی مادہ کے زہر سے پیدا شدہ دورانِ خون کی رکاوٹ۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر خاص طور پر مستورات کے اعضاء پر ہوتا ہے۔ کمر
برنیٹ کا تجربہ ہے کہ رحم کے ٹیومر کے لئے اس سے زیادہ مؤثر کوئی
دوا نہیں۔

عمومی علامات

آتشگی مادہ کے ذریعے پن سے نیچے کے جببڈ کی ہڈی میں ورم، انڈیشن
میں سوجن، نظام عصبی کے بگاڑ کی وجہ سے بلڈ پریشر کی زیادتی یا لوگوں میں
دوران خون کی رکاوٹ، مزمن وجع المفاصل اور گھٹیا کارد، جگر میں ورم اور
سختی، ورم گردہ، رحم کی گردن میں ورم، پیٹرو میں سردی اور ٹنڈک، مزمن
ورم یا خروج رحم، بچہ دانی اور اندام نہانی میں زخم، سیلان رحم اور اس کے
ساتھ دفعتاً رحم میں تشنج اور تگی، نموں میں ورم، بھیتہ الرحم میں رطوبت اور
استقرار، بھیتہ الرحم کا ٹیڑھا پن۔ رحم میں ٹیومر (رسولی)
مصلح :- سلفر کے چٹھے

طاقت :- ۱ x سے ۲۰ طاقت تک

ARNICA MONT.

آرنیکا مانٹ

تخصوصی علامات

- ۱۔ تمام جسم میں مچھوٹے کا سا درد، چوٹ کا سا احساس، جیسے جسم کو ٹاٹا پٹا گیا ہے۔ ہر چیز جس پر لٹیا جائے سخت اور تکلیف دہ محسوس ہو۔
- ۲۔ جسم کا اوپر کا حصہ گرم اور نیچے کا ٹھنڈا
- ۳۔ بچوں کی کلائیوں میں مردہ کی سی ٹھنڈک، سر میں پانی کے اجتماع کے ساتھ۔

عام استعمال

چوٹ یا حادثہ کی وجہ سے جسم میں کہیں کچلا ہٹ یا ٹوٹن ہو جائے جو زخم، حصص کے کٹے بغیر ہو تو یہ دوا بہت کارگر ہوتی ہے۔ چوٹ کے علاوہ موچ آنا اور بل کھا جانا بھی اس کے دائرہ اثر میں ہے۔ علاوہ بریں سکڑ دیاں تپ مرتہ، مسلسل سناڑوں، خون کے زہریلے ہو جانے، خون میں پیپ بل جانے، دل کے عوارض جو زیادہ محنت کی وجہ سے ہوں، نوات الجنب کالی کھانسی، دوران سر، جوڑوں کی تکلیف، استسقا، سر اور خصیہ اور عرق النسا وغیرہ میں بھی مستعمل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

طبیعت گرمی رہنا، چڑچڑاپن، تشویش، بیہوشی یا سرسائی حالت
سر پھرتے اور گرم ہونے کے ساتھ ساتھ سردی ہو۔ ناک سے خون جاری ہونا، کپ
کا سوجنا، ٹوکار کے ساتھ گنداسر سے ہوتے انڈے جیسا بدبودار پانی
منہ میں آجائے، گوشت اور شہدے سے نفرت، کھانے کے بعد متلی
وضع حمل کے بعد اعضاء متعلقہ کی دکھن۔

کال کھانسی کے دور، سنجار، لہزہ اور پیاس کے ساتھ، صندھ جہرہ
میں جلن اور باقی جسم سرد۔ اندرونی لہزہ بیرونی گرمی (آرٹک) مقبوضا، تنہا
میں ذرا بھی کھینچنے یا بستری میں حرکت کرنے سے جاڑا معلوم ہو
(اسٹاکس)

زیادتی :- ذرا سا چھونے سے، حرکت سے، آرام سے، شراب اور
مطبوع سردی سے۔

کمی :- لیٹ جانے سے یا سر کو نیچا رکھنے سے

معاون :- ایگونیٹ، وریٹرم، اپیکاک

مصلح :- ایگونیٹ، آرسینکیم ایبم، کیمفر، چائنا، آگنیشیا، اپیکاک

طاقت :- اسے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔ پرانی چوٹوں کے لئے

۲۰۰ طاقت بھی استعمال کی جاتی ہے۔

خصوصی علامات

تھے یادستوں کی صورت میں ترش، خراش پیدا کرنے والے اور جلن دار
اخراج، کھانا کھانے کی نالی میں جلن

عام استعمال

معدہ اور ہاضمہ کے عوارض مثلاً، تھے، دست وغیرہ نیز ہمیشہ میں
کارآمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

پست ہمتی اور منہم و متفکر رہنا۔
زبان مجلسی ہوتی مسوس ہو، ایمین، اسکویس، پلائینا، پلسا ٹیلا،
سیپیا، رال بکثرت بچے (مرکیورس، نائٹروک ایٹڈ) بھوک نہ ہو، ڈوکاروں
کی کثرت، متلی، تھے، نم معدہ میں جلن، تپلے پاخانے جو جلن کے ساتھ آتے
تھے کھٹی اور گلے میں خراش پیدا کرنے والی، بچوں کا ہیضہ، پیٹ کی خرابیوں
کے ساتھ پیٹ، حلق اور زبان میں جلن، غذا کی نالی میں جلن۔ بعض اوقات
کڑوی تھے۔

جگر کی خرابی سے ہر صبح کو ہونے والا درد، عرق الفسار یعنی ننگری کا درد۔

مصلح :- نمک و امیک
 زیادتی :- شام کو، رات کو، آرام کرنے سے
 کمی :- مسلسل حرکت سے
 طاقت :- ٹنچر سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

IQDIUM

ایڈیڈیم

تخصیصی علامات

- ۱۔ جسم کا گوشت پوست گھٹتا جاتے، لاغری جو مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔
- ۲۔ جھوک ہر چند گھنٹہ بعد ٹھوس ہو، کھانا کھانے کے بعد بہتر ٹھوس کرے۔
- ۳۔ لکھیما سخت

عام استعمال

اس کا خاص اثر نرووں اور لیف پر ہوتا ہے۔ شروع میں ان کے فعل میں زیادتی پیدا کرتی ہے بعد میں کمزوری، لاغری اور مٹھڑن ہوتی ہے۔
 نخانزیری ماورہ کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ علاوہ بری ذات الجنب لکھیما، سل اور جوڑوں کے درد میں بچید مؤثر دکارآمد ہے۔

عمومی علامات

خنازیری مزاج، انتہائی کمزوری، لاغری، آہستہ آہستہ ذہریلی پن کا اثر کرنا، وجہ معلوم ہونے بغیر بچہ کمزوری محسوس ہو، زینہ پر چڑھنے سے سانس پھولے۔

بھوک بار بار محسوس ہو لیکن مریض بہت کچھ کھانے کے باوجود لاغر ہوتا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد مریض بہتر محسوس کرے۔

نھاتین میں پستانوں کی ٹھنڈی اور دکھن، رحم سے خون کا بکثرت اخراج، رحم میں ذہریلا زخم، مزمن سیلان الرحم جس میں کہ رطوبت بہ کثرت اور تیزاب کے مانند جاری ہو جو کپڑوں تک میں سوراخ کر دے۔

ذات الجنب (سپل) سانس لینے میں محنت جتنا بٹ، آداہنے کی سی آواز، بھونکنے والی کھانسی خاص کر بچوں کی، کھانسی ہوتے ہی گلے کو پکڑ لے گھسیکا، سل، جوڑوں کے درد (وجع المفاصل)

زیادتی :- چپ چاپ رہنے سے، گرم مکان میں، دامنی جانب، بھوک کے وقت (سودہ خالی ہونے کے دوران)

کمی :- ادھر ادھر چلنے پھرنے سے، کھلے ہوا میں، کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد

معاون :- ڈیٹا گا، لائیو پوریم

مصلح :- اینٹی مونیمرٹ، ایپس، آد سینیکم البم، بیلاڈونا، کیمفر، چائنا

سلف، کافیا، فیرم، گریفائیٹس، گریٹھیولا، میریٹھن اوپیم، فاسفورس،

سینجیا، قحوجا۔

طاقت :۔ ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

ABROTANUM

ابراہیم

خصوصی علامات

نا طاقتی اور لاغری خصوصاً نیچے دھڑکی، مرض سوکھے کی سی۔

عام استعمال

بچوں میں سوکھے کے مرض کے لئے عام استعمال ہوتی ہے۔ ہاضمہ درست ہونے کے باوجود دبلا پن بڑھنا جائے، دستوں کے بند ہونے پر لاحق ہونیوالا جوڑوں کا درد، ایسے امراض خواہ اپنی اصل جگہ سے دور کسی دوسری جگہ ظاہر ہوں، سرطان، گنشیا کے مریضوں میں بیماری کے دب جانے کی وجہ سے پیدا شدہ خرابی، نوات المجنب میں پردہ باریطون کی سوزش جبکہ ملاوتتا ہو اور دیگر اخراجی کیفیتوں میں چھاتی میں پیپ یا پانی پڑ جانے کا اندیشہ، اپریشن کروانے کے بعد متاثرہ مقام پر مسلسل بوجھ کا احساس، انفلوئنزا کے بعد کی کمزوری، خونی بواسیر جو گنشیا کو افاقہ ہونے پر بڑھ جائے بچوں کا مرض سوکھا نیز بچوں کو بحیر آنا یا قلموں میں پانی بھر جانا وغیرہ تکالیف میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

مزاج غصیلا، چڑچڑا، نگر مند، پست ہمت۔

چہرہ سرد، خشک، زرد، مہر یوں ہوا، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔

منہ کا ذائقہ پھیکا، بھوک اچھی، لیکن کمزوری بڑھتی جائے، غذا بغیر ہضم

ہوتے، معدہ سے نکل جاتے، پیٹ میں درد جو رات کو زیادہ ہو، ایسا

احساس ہے کہ پیٹ میں پانی تیرتا ہے، ٹھنڈا معلوم ہو، بھوک کا باعث معدہ میں

کھروچن کا احساس، بد ہضمی کی بکثرت بدبودار رطوبت والی تہے، ناف کے

نیچے سخت گولہ محسوس ہو، پیٹ بھولا ہوا، کبھی تھن، کبھی دست، بواسیر

بار بار پاخانہ کی حاجت، خون ملا پاخانہ، بائی کا درد اچھا ہونے پر پاخانہ

کی تکلیف بڑھ جائے، کیڑے گریں، ناف سے رطوبت نکلے ایسا معلوم ہو

کہ انتڑیاں بیٹھی جاتی ہیں۔

سینہ میں خراش، سانس میں رکاوٹ، خشک کھانسی، سینہ میں درد۔

گھر کا درد جو فوطوں تک پہنچے، بواسیر کے ساتھ دیر بھگنے کے سنبھلے حصے

کی کڑیوں میں درد ہو۔

زیادتی :- ٹھنڈی ہوا سے اور غماریج کے اخراجات کے بند ہونے سے۔

کمی :- حرکت سے

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک

تخصصی علامات

- ۱۔ کسی بھی بیماری میں مسلسل اور گاتار متلی۔
- ۲۔ معدہ ڈھیلا محسوس ہو جیسے نیچے لنگ رہا ہے۔
- ۳۔ چمکدار سرخ خون کا سیلان جسم کے کسی بھی مخرج سے۔
- ۴۔ کالی کھانسی میں بچہ سانس کھو بیٹھے۔

عام استعمال

معدہ میں تشنجی اثر سے متلی اور چھپیٹوں میں تشنجی اثر سے کھانسی یا سانس بھولنے کی تکلیف لاحق ہو، معدہ میں خون کے حرکت کرنے سے خون کی پیشکش یا خون کا اسپال اور چھپیٹوں میں خون کے حرکت کرنے سے تپے ہوتے ہو یا منہ سے خون آتا ہو تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ نیز کچے یا باسی چیل کھانے سے جو عوارض ہوتے ہیں ان کے لئے نافع ہے۔

عمومی علامات

سر میں ایک جانب کا درد متلی اور تپے کے ساتھ، سر چمکاتے، چہرہ زرد ہو، سخت متلی اور تپے ہو، پیٹ میں درد، خون کی تپے، ناف کے گرد سخت درد، سبز گھاس جیسی آؤں ملی، پیشاب، مروڑ کے ساتھ خون ہو یا شیرہ کے

مانند سیاہ ہو مگر روکے ساتھ پیشاب خون کا ہو۔

خواتین میں حیض بہت قبل از وقت اور کثیر مقدار میں، سرخ خون کا
لوٹھڑے خارج ہوں۔

سینہ میں بلبغ بھرا ہوا محسوس ہو جو کھانسنے سے خارج نہ ہو، پھیپھڑوں کا
اندر والی نالی ہوا کی نالیوں میں غرغراہٹ۔ بیدم کرنے والی کھانسی۔ کھانسنے
میں بلبغ کی تے ہو جائے۔ منہ سے خون آجانا۔

لزرہ بلا بخار کے، جو گرم کمرے میں یا بیرونی گرمی سے زیادہ ہو، پانی پینے
سے یا کھل ہوا میں ستری کم ہو۔

تمام جسم میں تپ عموماً زیادہ دیر تک رہنے والی متلی اور تے، سانس لینے
میں تکلیف، خشک کھانسی، کمرہ میں جانے سے ایک دم پسینہ آجاتے، بدبودار
پسینہ اور گندا پیشاب۔

زیادتی :- حرکت سے، سرد خشک موسم میں، رات کو گرم کمرہ میں۔
کسی :- آرام کرنے سے، آنکھ بند کرنے سے۔

معاون :- کیوپریم، نکس و امیکا، پلساٹیل

مصلح :- آرنیکا، آر سینکم البوم، چائنا

طاقت :- عموماً ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

ACTAEA RACEMOSA اکیٹاریسی موسا

خصوصی علامات

- ۱۔ عفونتی مزاج میں مریض کو احساس جیسے اس پر سیاہ بادل چھا گیا ہے، اور دماغ کو گھیر لیا ہے۔
- ۲۔ حمل میں متلی اور جھوٹے دروزہ۔
- ۳۔ وضع حمل کے پہلے درجہ میں لرزہ۔

عام استعمال

یہ مستورات کے عوارض کی خاص ادویہ میں سے ایک دوا ہے۔ ہشیریا، (اضنق الرحم) عفونتی یا ہشیریا کی مرق، حیض کی خرابیاں، سیلان الرحم اور زمانہ حمل اور وضع حمل سے متعلقہ عوارض نیز وجع المفاصل وغیرہ اس کے دائرہ اثر میں آتے ہیں۔

عمومی علامات

دماغی سستی، خودکشی کی طبیعت، چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ، تنہائی کی خواہش، یہ کہے کہ پاگل ہو جائے گا۔ سر چکراتے اور بھاری اور بڑا محسوس ہو، ہاتھ میں بیٹھا بیٹھا درد، سر کے بائیں حصہ میں درد، سر اور آنکھ کے ڈھیلے میں سخت درد، آنکھوں کے

سامنے سیاہ دھبے۔
 زخار کی پٹی میں درد، جورات کو موقوف ہو جائے۔ کان میں موسیقی
 کی آواز میں موسوس ہوں۔ ذرا سے شہد سے بھی تکلیف ہو۔
 منہ اور حلق گرم اور خشک جس کی وجہ سے کھانسی آئے۔ تانے کے
 ذائقہ کا کھیلا بلغم خارج ہو۔

سبز رنگ کی تے، پیٹ میں بڑھی لگنے کا سادرد
 رحم کے قریب اعضا نہایت ڈکی احساس ہوں، حیض بہت قبل از وقت
 بھرت جس میں کوٹھڑے خارج ہوں۔ پیٹ کے آر پار سخت درد جو دہرا
 کرے، درد زہ کے سے درد، وجع مفاصل کا درد ایام حیض میں جس کے
 باعث مریض چلائے اور روتے، سیلان الرحم میں ایسا محسوس ہو کہ رحم
 میں بوجھ ہے۔ زمانہ عمل میں درد زہ کا سادرد ہو، نفاس رک جائے یا بند
 ہو جائے۔

سینہ میں دانہی جانب درد ہو، چت لپٹ جائے، سینے کو دو دونوں طرف
 سے دباتے، حوالی دل میں درد اٹھ کر سینہ میں ہو کر بائیں بازو کے نیچے
 تک جائے، دل کی دھڑکن، لاقول میں سرور سپینہ، بائیں بازو سن ہو جائے۔
 ایسا محسوس ہو کہ پہلو میں بندھا ہوا ہے۔

گردن جڑی ہوئی، یہاں تک کہ لائق بلانے سے بھی پیٹھ اور گردن میں
 درد ہو، ریٹھ ڈکی احساس ہو جائے، خاص کر گردن کے بہروں میں پیٹھ سے
 لے کر کولہے تک اور ران تک سخت درد ہو۔

زیادتی :- دوران حیض میں جس قدر زیادہ مقدار میں حیض ہوگا اسی
 قدر زیادہ تکلیف ہوگی۔

کھی :- گہری سے ، کھانے سے ۔

طاقت :- مدد شکر سے ۲۰۰ طاقت تک استعمال ہوتا ہے ۔ ۳۰ طاقت
زیادہ مستعمل ہے ۔

IGNATIA

اگنیشیا

تخصوصی علامات

- ۱۔ یہ دو جذبہ (گٹری میں تولد ، گٹری میں ماشہ یعنی ایک بات یا ایک کام پر قائم نہ رہ سکیں) کی بہت بڑی دوا ہے ۔
- ۲۔ وہ انسان جو دیرینہ غم و اندوہ سے وماغی اور جسمانی طور پر کمزور اور نحیف ہو چکے ہوں ۔
- ۳۔ مرض از خود آہیں ہوتا ہے ۔
- ۴۔ تمباکو برداشت نہ کر سکے ۔
- ۵۔ قبض جس میں جید حاجت بھی شکم کے اوپر ہی حصہ میں محسوس ہو ۔
- ۶۔ تیز سوئیاں چھینے کا سارو مہرز میں جو اوپر تک جاتے ۔
- ۷۔ جارا پائیس کے ساتھ ، صرف جاٹے کے دوران پیایں ۔
- ۸۔ ہنمار بفرم پائیس کے جو کپڑا اور چھنے سے بڑھ جاتے ۔

عام استعمال

درد معدہ، تشنچ اور تشنہ، درد، اینیٹمن، ہیٹیریا یعنی باؤ گولہ (اضطراب)، امراض گردہ و متعدد، زرتی بخار، قبض بوجہ کمزوری، امعار، خروج مقعد یعنی کاپیٹلک میں عام طور پر مستعمل ہے۔ علاوہ بریں پلیگ کے لئے بطور حفظہ یا مقدم اور شافی مرض ایک کارآمد دوا ہے۔

عمومی علامات

مزاج نہایت مغوم، ہر چیز کی طرف سے لاپرواہی، گفتگو کرنے سے جی چرانی تغیر ہونے والا مزاج، کبھی مذاق، کبھی تہقیر، کبھی چیخنا چلانا، عاشق مزاجی۔ سر کھوکھلا معلوم ہو، بھاری معلوم ہو (اوسیم) درد سر جو جھکنے سے زیادہ ہو۔ پیشانی میں پھٹنے والا درد، چیت لینے سے کم ہو، درد والے پہلو لینے سے آرام ہو (تھوبا میں اسی قسم کا درد گدی میں ہوتا ہے) ناک کی جڑ میں اینیٹن کا درد۔

آنکھوں میں ریت بھری محسوس ہو، روشنی کی چپکا چونڈ برداشت نہ ہو، آنکھ کے سامنے سفید چمکتی ہوئی لہر معلوم ہو، ایسا محسوس ہو کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل پڑے گا۔

سامنے کے دانت میں چھیدنے والا درد جو کہ حقیقہ یا تھوہ پینے سے زیادہ ہو، دانت میں ایسا درد کہ گویا دانت کھپ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دانت کا درد جو کھانا کھانے کے دوران یا دونوں کھانوں کے وقفہ میں زیادہ ہو۔

بعض اوقات غذا منہ کو آجاتے اور اس کے ساتھ کڑواہٹ ہو، جو
 غذا شام کو کھائی جائے وہ رات کو تے ہو جائے۔ منہ میں رال زیادہ پیدا
 ہو۔ معدہ میں تشنج درد، معدہ میں جیسے سوتی چھبوتی جاتی ہے (رشاکس)
 معدہ میں تپکن (ایلو، سینگو نیریا)

پانخانہ کے وقت متعدد میں تنگی اور رکاوٹ، پانخانہ ہونے کے بعد
 درد، کھڑے ہونے اور چلنے میں درد، بیٹھنے میں آرام، بواسیر خون یا باری
 پانخانہ ہونے کے بعد تکلیف زیادہ ہو، بواسیر میں درد اور تکلیف اس
 وقت اور زیادہ ہو جبکہ پانخانہ پستلا ہو۔

پیشاب صاف بلانگ کا مقدار میں زیادہ ہو۔ ہشیریا میں اکثر ہوتا ہے
 حینِ حضورِی مقدار میں سیاہ اور بدبو دار، حیض کے دوران نہایت
 کمزوری، غشی اور پیٹ اور پیڑ میں درد، رحم میں تشنج، حیض کثیر مقدار
 میں اور جلد جلد ہو۔ ہشیریا کے دوسے۔

حلق میں رکاوٹ محسوس ہو جیسے دھواں بھرا ہے (آرسنگ چائٹا)
 حلق خشک، تشنجی کھانسی، دن اور رات ناکام بہتا ہوا، سینہ میں ہاتھ
 طرف کو ٹپن، دل میں دھوکن اور کونچن۔

شانے کے جوڑ پر درد جیسے اکھڑ گیا ہو۔ اٹھنے پر گھٹنہ کے جوڑ
 جکڑے ہوئے محسوس ہوں اور آواز دیں (کونیم) تمام جوڑ آواز دیں (کالی
 بائیکرام، پیرکا بھادی پن۔

بخار زیادہ لہرزہ اور پیاس کے ساتھ اور زیادہ مقدار میں پانی پیا جائے
 ہلاینے والا لہرزہ، چہرہ سرخ، شام کے وقت گرم کمرہ یا انگلیٹی کی گرمی

بہار بغیر پیاس کے سر پہر کو تمام جسم میں گرمی مگر پیاس نہ ارد، جلد خشک
 بیرونی گرمی اور سرخی جو لیکن اندرونی گرمی بالکل نہ ہو، تمام جسم پر تپتی اچھلتی
 زیادتی :- تمباکو، تھوہ، برانڈی سے، چھوٹے سے، حرکت کرنے سے
 تیز بو سے، دماغی جذبات، رنج وغیرہ سے، ٹنڈی ہوا سے۔
 کھی :- گرمی سے، زیادہ دبانے سے، چت لیٹنے سے۔
 معاون :- نیرٹرم میور، ایڈنٹاس، پلسا ٹیلا، سپیا۔
 متضاد :- کافیا، ٹو بی کم، نکس و امیکا۔
 مصلح :- ایٹیک ایڈ، آرنیکا، کیمپفر، کمیوٹلا، کوکولس، کافیا،
 نکس و امیکا، پلسا ٹیلا۔
 طاقت :- ۶ سے ۲۰۰ طاقت تک

AGARICUS

اگیرکس مسکرپس

تخصیصی علامات

- ۱۔ عیاشی کے اثرات بد۔
- ۲۔ بوائیاں جن میں ناقابل برداشت خارش اور جلن ہو۔
- ۳۔ ازخود حرکات عالم بیداری میں۔
- ۴۔ درد مکر کے مقام میں، دن کے وقت، محنت کے دوران جب
 بیٹھا ہو (زنگم)

عام استعمال

اعصابی فتور، چٹھوں کے درد، حرام مغز کی سوزش اور جلدی امراض خاص کر جو شدید سردی لگ جانے سے لاحق ہوں وغیرہ میں عام طور پر مستعمل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

مذ سے تیز بُو آتے، ذائقہ بے حد خراب ہو، خالی ٹوکاریں آئیں پیٹ میں بوجھ، جگر اوتلی میں درد، آنٹوں میں گڑگڑاہٹ، صبح بیدار ہونے پر اسہال ہوں، اور پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو، ریح بغیر بُو کے کثیر مقدار میں خارج ہو۔

نظام عصبی میں کونچن محسوس ہو، آنکھوں اور پوٹوں کی تشنجی حرکات رشتہ نیند کی حالت میں حرکات بند ہو جاتیں، طوفان آنے سے پیشتر علامات میں شدت ہو، ریڑھ کو چھو نہ جاسکے، ہر حرکت درد انگیز ہو۔ چہرہ سکڑا ہوا، چہرہ میں خارش، اور جبن، لبوں پر اجار ہوں، تالو میں آبلے نظر آئیں، پائیس زیادہ ہو، حلق میں خراش ہو، سونے کے بعد کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف۔

جلد میں جبن، خارش، سرخی جیسے شدید سردی لگ گئی ہو، سرد ہوا سے تکلیف بڑھے، نشیں پھول ہوتی ہوں۔

زیادتی :- ٹھنڈی کھلی ہوا میں، کھانے کے بعد، جماع کے بعد سرد موسم میں، ماول کی گرج سے قبل۔

کسی پر بیڑھ پر دباؤ سے از خود منہی، آہستہ آہستہ اور دھیر دھیر حرکت کرنے سے۔

مصلح :- کیمفر، کانیا، پیسا ٹیلا، سٹاکس
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ تک نیز ۲۰۰ طاقت بھی مستعمل ہے۔

ALUMINA

الیومینا

تخصوصی علامات

- ۱۔ آکر موافق نہ آئیں۔
- ۲۔ قبض جس میں نہ تو پاخانہ کی حاجت ہو اور نہ پاخانہ کو خارج کرنے کی طاقت، تا وقتیکہ بڑی مقدار میں جمع نہ ہو جائے۔
- ۳۔ مبرز میں اتنی نا طاقتی کہ نرم پاخانہ بھی بمشکل خارج ہو۔
- ۴۔ سیلان الرحم (لیکوریہ) تیز سوزش پیدا کرنے والا مقدار میں اتنا زیادہ کہ ایڑیوں تک پہنچ جائے۔
- ۵۔ حیض کے بعد دماغی اور جسمانی طور پر کمزوری کا احساس۔

عام استعمال

قبض، حلق کی سوجن، لیکوریہ (سیلان الرحم)، خون حیض قبل از وقت خفیف اور زردی مائل آکر بند ہو جائے جو مریض کو بھید کمزور کر دے۔

نخاع کے اعصاب میں نقص واقع ہو جاتے جس کے باعث ٹانگوں کے انزال میں باقاعدگی نہ ہے، مریض لڑکھڑا جاتا ہو۔ کھانسی خاص کر جو صبح کو آئے، نیز نشاستہ، کھڑیا مٹی، چاک، کوئٹہ وغیرہ کھانے کی رغبت وغیرہ میں یہ دوا کارگر اور مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

عقل زائل ہوتی ہوئی محسوس ہو، اپست ہمتی ہو، وقت کاٹے نہ کئے مزاج یکساں نہ ہے، جیسے جیسے دن چڑھے ویسے ویسے طبیعت اچھی ہوتی جائے۔ نشتر یا خون دیکھ کر خود کشی کرنے کو جی چاہے۔ درد سر جلن اور کوسٹین والا جو صبح کو زیادہ ہو مگر کھانے سے کم ہو جاتے۔ قبض بھی ساتھ ہو، سر چکراتے، بالوں کا گرنا، چاند پر کھسبی چیزیں زور دکھائی دیں۔

چلنے کی نا اہلیت، ذرا سی بے خیالی ہونے پر لڑکھڑائے اور گر جائے (آرڈنٹیم ٹائٹریکیم، جلسی میم)

معمول سے زیادہ ہبوک لگے، نشاستہ، چاک، مٹی، کوئٹہ، لوزگ، قہوہ، کٹھی اور ثقیل چیزوں کی نہ کھانے والی خواہش (سائیکوٹا، سورنیم) اور موافق نہ آئیں۔

مذہ سے بدبو نکلے، دانٹوں پر میل، مسوڑھوں میں دکھن اور آن خون نکلے، حلق خشک اور چر درد۔

پاخانہ خشک، سڈوں والا، پاخانہ کی خواہش نڈرد، مقعد سوچی ہوئی خشک اور چر درد، مہرز پر کھسبی اور جلن، نرم پاخانہ صبح وقت سے نکلے،

پیشاب کرنے کے لئے بھی زود لگانا پڑے۔

مرد میں جماع کی خواہش زیادہ ہو، پانخانہ کے وقت زود لگانے پر مزہ کا اخراج یا نڈی خارج ہو۔ مستورات میں حیض بہت جلد جلد تحلیل مقدار میں اور زود رنگ کے۔ خواش پیدا کرنے والا شفاف ڈرنے کا سا بھرت سیلان الرحم جلن کے ساتھ جو کہ دن میں اور حیض کے بعد زیادہ ہو اور ٹنڈے پانی سے دھونے سے کم۔

جلد خشک ہو، ناخن نازک جو جلد ٹوٹ جائیں۔ رات کو لیٹر پر لیٹے تو بے انتہا کھجلی ہو، یہاں تک کہ کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آئے اور بعد میں درد ہو، ناخن کے اوپر کی کھال اکھڑے۔

زیادتی :- بعد دوپہر، آلو کھانے سے، صبح بیدار ہونے پر، گرم مکان میں۔

کبھی :- کھل ہوا میں، ٹنڈے پانی میں نہانے سے، شام کو اور ہر تیسرے دن مرطوب موسم میں۔

معاون :- برائی ادنا، فیرم۔
مصلح :- برائیو نیا، تھیمفر، کیمپوٹلا، اسپیکاک، پلسا ٹیلا۔
طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اونچی طاقتیں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ یکایک حافظہ کا جتنے رہنا۔
- ۲۔ گالی دینے اور تمسہیں کھانے کی نہ رکھنے والی خواہش۔
- ۳۔ مسلسل وعائیں مانگے۔ (سٹرا مونیم)
- ۴۔ درد سہر جو کھانا کھانے پر جاتا ہے۔
- ۵۔ پانخانہ کی بچہ خواہش لیکن جو نہی پانخانہ جاتے پانخانہ آگے بغیر ہی حاجت جاتی ہے۔

عام استعمال

جب فکر و ترقی کی زیادتی، نسیان اور دماغی کمزوری کے باعث ذہنی فتور واقع ہو تو اس دوا کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ مریضی کا حافظہ کمزور ہو جائے اور وہ معمولی نام بھی یاد نہ کر سکے۔ اسے ہر شے خواب و خیال محسوس ہو۔ مریض خود کو دو خیال کرے یا دو ارادوں کا مالک محسوس کرے جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوں، چلتے وقت خیال کرے کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ بصوت پریت کا خوف ہے۔ نہایت غصیللا اور بدی کی طرف مائل ہو۔ تمسہیں کھاتے اور وہی تباہی کے، زہر آمیزی کا دہم ہو اور وہ کھانے

پینے سے ان کا کرفس۔ مردوں اور قبروں کے لئے خوشنک خواب دیکھا کہ
توبہ دوا کا گرہ اور مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سر میں شدید گہا درد جیسے میخ ٹھونک دی گئی ہے، کھانے پینے
سے افاقہ ہو جائے لیکن دماغی محنت سے پھر عود آئے۔
خانہ چشم میں دبائے والا درد، نزدیک کی چیزیں دور دکھائی دیں بصارت
میں کمزوری۔

سماعت میں فرق آجائے۔ کان میں کوئی شے ٹھونکی ہوئی محسوس ہو۔
قوتِ شامہ یعنی سونگھنے کی صلاحیت جاتی رہے، بار بار پھینکیں آتی
ہیں، نزلہ زکام مع اختلاجِ القلب۔
اختلاجِ قلب یا پرودہ دل متروم ہونے کے باعث متواتر درد کی
ٹیسیں رہتی ہوں توبہ دوا مفید ہوتی ہے۔

معدہ خالی ہو تو پیٹ میں درد رہے لیکن کھانا کھانے پر جاتا ہے۔
مردوں میں خواہشِ جماع کی زیادتی، آلت تناسل کے اندر جھنجھٹا،
عورتوں میں سیلانِ رحم جس کے ساتھ دکھن اور کھجلی ہو۔
جلد میں شدید کھجلی، جلیں جس کے ساتھ دماغی علامات بھی موجود ہوں۔

نار فارسی۔

زیادتی :- گرم پانی لگانے سے
کسی :- کھانا کھانے سے
مصلح :- کالمیا، رسٹاکس

OPIUM

اوپیم

خصوصی علامات

- ۱۔ تمام تکلیفات جن کے ساتھ غنودگی بہت ہو، تمام تکلیفات بغیر درد کے جن میں مرض کسی بات کی ہی شکایت نہ کرے، مریض کچھ نہ چاہے۔
- ۲۔ خراٹے دار سانس کے ساتھ نیند، چہرہ سرخ، آنکھیں آدھی بند۔
- ۳۔ جلد پر گرم پسینہ آئے۔
- ۴۔ بستر اتنا گرم محسوس ہو کہ اس پر لیٹ نہ سکے۔
- ۵۔ پانخانہ سیاہ، متعفن مقعد کے فالج کے ساتھ۔

عام استعمال

دماغی سکے، دماغی جریانِ خون، ہڈیاں خری، قبض، توجیح سیدھا حاد بنار، جن کے ہمراہ غشی ہو، ذیابیطس، بچوں کا بیضہ، پانخانہ کی تے، شدید درد توجیح، انزویوں کا الجھ جانا، خوف یا ڈس کے برے اثرات، بچوں کی لائفری، شہابیوں کی خون کی تے جبکہ چھاتی گرم اور اطراف سرد ہوں، بچوں کا بیضہ، مرقہ بنار کے اسہال، نمونیا اور نوبتی بنار میں حسب علامات مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر لا پروا، گھبراہٹ ہوا، بے چین، دہشت زدہ، چونکے چونکے پڑے۔ یہ خیال کرے کہ گھر میں نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی اور بند بیان کیے، چہرہ سرخ اور پھولا ہوا، بالکل بے ہوش، حافظہ بالکل زائل ہو جائے آدھی آنکھیں کھلی اور آدھی بند، پستیاں سکڑی ہوئی، زور سے خراٹے، گفتگو بے تنگی ہو۔

مریض نشہ کا متوالا معلوم ہو، احمق سا نظر آئے، سر جھکائے، سکتے کی سی حالت، اٹھنے سے جھکے آئے، لیٹ جائے، سر کسا ہوا معلوم ہو، سر کی شریان (رگیں) تکتی ہوئی معلوم ہوں۔

آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی، آنکھیں ٹکٹکی لگی ہوئی، آدھی کھلی آدھی بند اور پکڑی ہوئی نگاہ، پستیاں پھیلی ہوئی، نگاہ وضد۔

چہرہ سرخ، سیاہی مائل، سوجا ہوا، جبرجبرایا ہوا، چہرے کے پنجے (عضلات) خود بخود حرکت کریں۔ چہرہ کی رگیں پھولی ہوئی، نیچے کا جبراً رکھا ہوا۔

منہ میں رال بکثرت ہو، حلق خشک، کچھ نکلانہ جاسکے، زبان مفلوج پیٹ میں درد قوی، تپ اور تشنج، خون کی تپ ہو، منہ سے غلیظ اور پشیا کی سی تپ ہو، پیٹ میں گرانی، جھوک کم۔

بہت پرانی قبض، چھوٹی چھوٹی سیاہ گولیاں سی پاخانہ میں نکلیں، دہشت کے بعد خود بخود پاخانہ ہو جائے، بچوں کا ہیضہ جس کے ساتھ غفلت ہو۔

پیشاب میں رکاوٹ، پیشاب قلیل المقدار ہو۔

سینہ میں تنگی معلوم ہو اور سانس لینے میں تکلیف ہو، آواز بھاری مند

کھول کر خراٹے لے، اکھانسی خشک رات کو، پانی پینے سے کم ہو۔

نیند معلوم ہو مگر سوز سکے، نہایت غنودگی ہو، غنودہ الحواس افراد

کی سی نیند، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند، زور سے خراٹے، سونے میں بہتر

پر کوئی چیز چھنے، سونے میں بھی ذرا کھٹکے سے جاگ پڑے۔

بیمار لڑکے کے ساتھ پیاس کے بغیر، سر گرم اور گہری نیند ہو، نیند میں

سر کے گرد بہت پسینہ۔

زیادتی :- پسینہ سے، رات کو، صبح کو، سونے کے درمیان اور بعد

کسی :- سردی سے، حرکت سے، دن کو اور شام کو

مصلح :- آر جنٹم نائٹرکیم، بیلا ڈونا، کیملفر، کیمو صلا، اسپیکاک، نکس و امیکاک

سلفر، سار سا پیللا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

APIS MELLIFICA

اپیس مہلنیکا

تخصوصی علامات

- ۱۔ آنکھوں کے نیچے تھیل کی سی پھلاوٹ
- ۲۔ درد، جلن دار، ڈونک گھنے سے، پھوٹے کے سے۔
- ۳۔ دست از خود ہر حرکت پر جیسے مفرد کھلی پڑھی ہے۔ (زفا سفور کی)
- ۴۔ نوبت بنجارہ ہمیشہ پیاس کے ساتھ

عام استعمال

اعضار کی سوجن اور پھول جانا، استسقا، سرخ گلابی رنگت، ڈونک مانے کے سے درد، دکھن، گرمی ناقابل برداشت ہو اور دوپہر کے بعد شدت سرخ یاو کی طرح کی سوزش، گردوں کی شدید سوزش جسے چھوتے سے سخت تکلیف ہو یا نام جسمانی تکلیف ایسا معلوم ہو کہ کچھ اندر پھنسا ہوا ہے یا جسم کے اندر کوئی شے پھٹی جا رہی ہے وغیرہ تکالیف میں مشتمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر خیالات میں یکسوئی نہ ہو، چھپک وغیرہ کے دب جانے سے سرسرا ہو گیا جو۔
سر چکرائے، متلی، درد سر، جارجی پن کے ساتھ درد پیشانی اور کھنٹی

میں جو کہ اٹھنے اور بستری گرمی سے زیادہ ہو۔ وہاں سے آرام ملے گا، اگر تڑپ
میں درد جس سے مریض ذقناً چیخ اٹھے، بچوں کے سر میں پانی اتر آئے،
یکایک چیخ ماریں۔

آنکھوں کا آشوب، روشنی برداشت نہ ہو، اوپر کے پھولے سوچے
ہوتے ہوں اور چہرہ زرد ہو۔

ہونٹ سوچے ہوتے ہوں۔ خاص کر اوپر والا ہونٹ۔ حلق میں جلن
میش زنی کا سادرو، حلق کے غدود ورم کئے ہوتے ہوں، زبان خشک
سوچی ہوئی ہو، کوئی چیز نکل نہ سکے، گردن پر کسی چیز کا چھونا برداشت
نہ ہو سکے۔

ورم معدہ جس کے باعث تپ ہو جاتی ہو، معدہ میں گویا آگ جلے
مگر پیاس بالکل نہ ہو۔ سخت درد اور معدہ ذکی الحس ہو جائے۔ پیٹ
میں ایسا عسوس ہو کہ اگر پاخانہ کے لئے زور لگایا جائے گا تو کوئی چیز
جو کسی ہوئی ہے ٹوٹ جائے گی، پیٹ میں دکھن۔

پاخانہ سبزی مائل، زردی مائل، چکنی آؤں یا زرد پانی ایسا بلا درد کے،
اسہال صبح کو زیادہ ہوں۔ اکثر اسہال شام کو بھی ہوتے ہیں۔ خود بخود
پاخانہ بند ہو جائے گویا مبر نہ کھلا تو ہے۔ بواسیر میں نیش زنی کا سادرو،
خروج مقعد یعنی کا پیچ نکلنا۔

پیشاب سیاہ رنگ کا اور کمی کے ساتھ، رات کو پیشاب نہ روک
سکے، خاص کر کھانستے وقت اور خود بخود نکل جائے۔

مردوں کے اعضائے تناسل میں ورم اور ٹیس، عورتوں میں دانے
خصیۃ الرحم میں سوجن، ورم اور پانی اتر آنا۔ تیز کاٹنے والا اور میش زنی

کاسا در دہو۔ (بائیں خصیتہ الرحم میں ورم ہو تو گہرینا ٹیس دوا ہوتی ہے)
 اسقاطِ حمل، ہر قسم کی گرمی سے علامات میں زیادتی، علاوہ بریں چھوٹے
 رکاوٹ سے، دباؤ سے، رات کو یا گھٹنے کی حالت میں زیادتی۔

رطوبات کا جمع ہونا، سینہ میں، وماغ کی جھتی میں، پھیپھڑے کی
 جھتی میں، مفاصل یعنی جوڑوں میں۔

صبح کے وقت آواز بھاری ہو، سینہ میں دکھن، سونے کے بعد کھانسی
 آنا، تیز درد کے ساتھ سانس آتے، لیٹنے سے زیادتی ہو۔

ہاتھ نیلگوں، سردی کی طرف مائل، ٹانگیں سرد، ٹانگوں، گھٹنے اور پیر
 کی سوجن۔

بخار ہمیشہ پیاس کے ساتھ، جو گرم کمرہ میں اور بیرونی گرمی سے زیادہ ہو
 دورہ ۳ بجے سے پہر کو یا ۳ بجے سے ۴ بجے سے پہر تک ہو۔

سینہ میں جلن، مریض بچانے کی کوشش کرے، آگ کی گرمی برداشت
 نہ کر سکے۔

پسینہ ٹھوکانہ ہو۔

جلد پر سرخ چکتے جن میں جلن اور نیش زنی کا سا در دہو۔ ایسے
 چکتے جو مثل بٹر کے پتے کے ہوں، پتی اچھلنے کے سے چکتے۔

زیادتی :- رات کے آخری حصہ میں، دن کے تین بجے، گرم کمرہ میں، گرم
 مشروبات سے لیٹنے سے، چھوٹے سے، دبانے سے، نیند کے بعد دواہی

جانب، تہ ہو جانے سے، ورزش سے، نیز دن کے تین اور پانچ کے دوران
 کبھی :- دن کے وقت، سیدھا بیٹھنے پر، کھلی ہوا میں، سرد غسل سے

بالموم ہر قسم کی سردی سے، نیند کے دبانے، چلنے اور کھٹ مرنے سے۔

معاون :- نیٹرم میوید

مصلح :- ایپس ، اپیکاک ، یکے کس ، لیکک ایڈ ، پائینا ، نک
میٹا تیل ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک ، استثنائی حالتوں میں چھوٹی
طاقتیں ۔

APOCYNUM

ایپوسائٹم

تخصوصی علامات

۱۔ استسقا جس کے ساتھ پیاس ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر استسقا اور پیشاب کی تکالیف خاص کر پیشاب رک
جانے کے عوارض میں مستعمل و مفید ہے۔ شدید عرق الناسار میں بھی تسکین
بخش ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض الجھا ہوا ، پریشان ، پڑمردہ ، مایوس اور کم ہمت ہوتا
ہے۔ بوڑھے تاش بینیوں کی غشتی میں جبکہ دل کا فعل باقاعدہ نہ ہو اور پیٹ

میں بھی شور ہو۔ اس دوا کا استعمال اکثر اچھے نتائج پیدا کرتا ہے، قوت
حافظہ کمزور ہو، ناک میں سوزش ہو، جلد دکام لاحق ہو جاتا ہے۔
جی متلاتے، غنودگی ہو، قے زیادہ ہو، استسقاء اور مقامی دم چلنا
پیشاب شانہ میں اکٹھا ہو، جلد پھول ہوئی اور چمکتی ہوئی، نبض کمزور ہو،
قبض اور نف معدہ میں گراؤٹ محسوس ہو رہی ہو، پیاس شدید ہو، لیکن
پانی پینے کو جی نہ پائے، اگر پی لیا جائے تو فوراً قے ہو جاتے یا درد پیدا کرنے
کا باعث ہو۔ اگر گڑے صحیح سالم ہوں تو استسقاء میں اس کا استعمال شانہ بہ
بصورت دیگر یہ عارضی طور پر ممکن دم ہے۔ ایسے استسقاء میں جبکہ دل کمزور
ہو گیا ہے اور خون کا دباؤ کم ہو یا استسقاء لمبی کے آخری درجوں میں
اس کے استعمال سے حوصلہ افزا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

نونیہ کا آخری درجہ جبکہ سانس میں وقت ہو، دم شش اور دل کمزور
ہو، دم جو پھیپھڑوں میں سو جن کا باعث ہو، خشک کھانسی، مریضی لمبا
سانس لے،

تیلے اسپہال ہوں، مہر زہیں دکھن ہو۔

شانہ پھولا ہوا، درد کا احساس، پیشاب کی نالی میں جلن اور قوت
واضعہ کی کمزوری۔

عورتوں میں قلت حیض، پیٹ پھولا ہوا، کمی خون، کمزوری اور غشی ہو۔
زیادتی :- مرد و موسم میں، سردی اشیا کے استعمال سے یا جسم سے کپڑا اتارنے پر۔
طاقت :- زیادہ تر مدد لکچر ہی مستعمل ہے۔ بعض اوقات دیگر طاقتیں بھی
استعمال ہوتی ہیں۔

ASAFOETIDA

ایسا فوسید

تخصیصی علامات

- ۱۔ ریاحی نفع جس کا رخ نیچے کی بجائے اوپر کی طرف ہو۔
- ۲۔ ہیشیریا کی دوڑے۔

عام استعمال

معدہ درد آنتوں میں ریخ کا اجتماع ہو یا خواتین میں ہیشیریا کے دوڑے ہوں تو اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ برسی آنکھوں اور کانوں کی سوزش تکالیف میں نیز بڈیوں کی بھر بھر سہٹ ہو اور ان میں درد ہو تو ان عوارض میں بھی یہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

معدہ میں ہوا، معدہ پھولا ہوا، انترہیاں ہوا سے بھری ہوئی اور ان کی حرکات میں بے قاعدگی۔ ڈکار آنے میں تکلیف ہو، ڈکار کے ساتھ صلق میں پانی آئے، نف معدہ میں تپکن ہو، پیٹ میں تیز درد ہو، ریاح کی گڑگڑاہٹ جو کہ بعد میں زور کی ڈکار کے ساتھ باہر نکلے۔

آتشک کی وجہ سے ہونے والا آنکھ کی سیاہ تپیل کا درم، آنکھ کا درد جو رات کو زیادہ ہو۔

کان میں درد ہو اور بد بو نکلے ، یا بد بو دار پیپ خارج ہو ، ناک میں آٹھلکے کے مارہ کی وجہ سے نہایت بد بو دار مواد جو اور ساتھ ناک کی بڑی بھی مشابہ بشریہ کے درد سے ، جس سے گلے کی بندش کا احساس ہو ، ایسا عسری ہو کہ کوئی گولہ گلے میں آکر اٹک گیا ہے ۔ اور ایسا احساس ہو کہ انتڑیاں لئے رخ حرکت کر رہی ہیں اور خوراک کی نالی معدہ کی طرف سے کھینچ کر گلے کی طرف آرہی ہے ۔

پیٹ اور معدہ میں ہوا کے اجتماع سے تکلیف ، تنگی اور بے چینی خوراک کا معدہ میں اور پر کی جانب اچھلنا ، تناؤ کے ساتھ معدہ میں دھڑکن کا احساس ، زرد وار ڈکار آئیں ، شدید درد معدہ ، معدہ اور پیٹ دھچکتی کے درمیان کی جھتی میں درد بے چینی ، پیٹ میں ہوا کے چلنے سے آنٹوں میں گرگراہٹ ۔

غیر حاملہ مستورات کے پستانوں میں دودھ کی موجودگی ، حاملہ میں دودھ کی کمی اور ساتھ درد کا احساس ۔

مقعدہ تنی ہونے اور درد والی ، شدید قبض ، سیون میں درد

سینہ میں گھٹن ، ایسا احساس کہ پھیپھڑے پوری طرح پھیلی نہیں رہ سکتے شدت کی دھڑکن ۔

ہڈیوں میں شدید درد اور بھر بھراہٹ ، ہڈیوں کے سرے درد کریں ، سوزش اور پڑھے ہوئے ، ایسے پھوٹے جو ہڈیوں تک پہنچے ہوں اور جن سے رقیق ذرد رنگ کا مواد خارج ہوتا ہو ، گویا کہ میننگ کو پانی میں گھول دیا گیا ہے ۔

جلد خارش کرنے والی ، کھجلائے سے آرام ملے ، پھوٹے جن کے کنارے

شدید طور پر درد کریں اور امراضِ جلد کے مرنے سے پیدا ہونے والے
عصبی عوارض۔

زیادتی :- رات کے وقت، چھونے سے، باتیں پہلو لیٹنے سے، آرام
کرنے سے، گرم ٹیکو سے۔

کسی :- کھلی ہوا میں، حرکت سے، دباؤ سے۔

مصلح :- کمیض، مرکبہ، ریس، کاسٹیکیم، چائنا، پلساٹیل، ولیریانہ۔

طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ تک متعلق ہے۔

ACID PICRIC

ایسڈ پیکریک

خصوصی علامات

۱۔ عصبی نقاہت (نیورسٹینیا) اور اس کے باعث پیدا ہونے والے
عوارض۔

۲۔ دماغی تھکن لکھنے پڑھنے والوں کی۔

۳۔ درد سر گدی یا گردن کے مقام میں جس کی زیادتی ذرا سی دماغی محنت
سے ہو جاتی۔

۴۔ دیر بھ کے ستون کے ساتھ ساتھ جلن

۵۔ تمام جسم میں تھکاوٹ اور بجا نہ تپن۔

عام استعمال

اس دوا سے قرآنے جسمانی جو مضمحل ہو گئے ہوں اور موجودہ دوسرے
 طرز معاشرت کے باعث قوت سلب ہو گئی ہو اور انہیں سر نو اپنی اصل
 حالت پر آجاتے ہیں، خواب بھس جو تبدیلی کا بڑھ رہا ہو، سوزا کہ
 انجری کی طرح متے، شدید عصبی نقاہت اور اس سے متعلقہ عوارض، ضعف
 درد گردہ، اور باؤ گولہ (ہسٹیریا) میں مستعمل و مفید ہے۔ اس کا ایک فیصد
 معمولی خارجی طور پر استعمال کرنا، جل جانے اور احراق کے لئے نافع ہے۔

عمومی علامات

ذرا سی عنایت سے نرکان معلوم ہو، اس کے ساتھ ایسا محسوس ہو کہ
 تمام جسم نلک ہو گیا ہے، کسی سے گفتگو کرنے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں
 چاہتا، ہر ایک امر سے بے توجہی، جسم کے کسی حصہ کا سس اور بے حس
 ہو جانا، جسمانی ریاضت کرنے کی طبیعت نہ چاہے، عقوڑا سا کھنسنے
 پڑھنے سے طبعی ترکان واضح ہو جائے۔ مطالعہ کرنے یا خیالات کو یکسر
 کرنے کی اہلیت معدوم ہو گئی۔ عصبی نقاہت واضح ہو، پٹھے کمزور
 ہوں۔ کھنسنے والوں کا فالج، حافظہ کمزور اور قوت شہواتی بڑھی ہوئی،
 کھی خون جو روز بروز بڑھتا جائے، پیشاب مکمل طور پر بند ہو جانے کے باعث
 پیشاب کا زہر بلایا پیدا ہو جائے۔ دماغی عنایت کی وجہ سے سر درد کرنا
 بیڑھ کے مرض کی وجہ سے ایسا داگ بلا شہوت ہوتی ہو۔ چھوٹے چھوٹے
 چھوٹے جسم کے مختلف مقامات پر نکل آتے ہیں۔ بالخصوص بیرون کان

کی نالی میں، ریڑھ کے ساتھ ساتھ جلن ہو، ریڑھ کے ستون اور گرد میں اڑھ کمزوری ہو، حرام مغز نرم ٹپ گیا ہو، غدہ قدامیہ بڑھ گیا ہو۔
زیادتی :- خفیف محنت سے، خاص کر دماغی محنت سے، سونے کے بعد، مرطوب موسم کے بعد۔

کسی :- ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈے پانی سے، دباقت۔
طاقت :- ۶ نمبر سے ۳۰ طاقت تک عام طور پر مستقل ہے۔

ACID SULPH

ایسڈ سلف

خصوصی علامات

- ۱۔ باوجود نہلانے کے سچے سے کھٹی بو آئے۔
- ۲۔ کھٹی ٹوکاریں جس کے باعث دانست تک کھٹے ہو جائیں (دوبنیا)

عام استعمال

ماضیہ کی کمزوری، ٹھوکہ، غذیہ کھانے کو جی چاہے، ادریشہ، لہرہ، اور عام کمزوری، مریض عام طور پر جلد باز ہوتا ہے، چہرہ پر مرنی جسم میں حرارت کا احساس جس کے بعد پسینہ سے شرابود ہوجائے، چوٹ لگ جانے کے بعد کسی زخم کے مردار ہوجانے کا اندیشہ، سیدہ کا اثرات بد، لکھنے والوں کے ہاتھوں کا ادریشہ یا تشنج وغیرہ عوارض میں عام طور

پر مشتمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مرضی جلد باز ہوتا ہے، سوالات کا جواب دینے کو جی نہ چاہتے۔

سر میں داہنی طرف درد، ایسا احساس کہ سر میں داغ ٹوھیلا ڈھالا ہو گیا ہے۔ اور اوصاف دھڑکنے لگا رہا ہے۔

منہ آیا ہوا، منہ سے بدبو آئے، مسوڑھوں سے خون نکلے۔

معدہ اور سینہ میں جلن، کھٹی ڈکاریں آئیں، دانٹ کھٹے ہو جائیں، شراب

پینے کی خواہش ہو، پانی پینے سے پیٹ میں ٹنڈک ہوتی ہے۔ معدہ

ٹوھیلا ڈھالا معلوم ہو، تہوہ کی بو سے نفرت ہو کھٹی تے ہو، تازہ کھانا کھانے

کو جی چاہتے، پھکیاں آئیں، ایسا محسوس ہو کہ بائیں طرف کی آنت اتر آئے گی

بواسیر میں کچھ رطوبت کا اخراج، ایسا محسوس ہو کہ مقعد میں بڑے

گیند کی طرح کچھ اڑکا ہے۔ اسہال سیاہ، بدبو دار پانخاڑ، اس کے ساتھ

جسم سے کھٹی بو آئے اور پیٹ خالی ہو۔

مستورات میں حیض جلد اور بکثرت آئے، جنن والا اور خراش پیدا

کرنے والا سیلانہ الرحم، اس کے ساتھ اکثر خون آمیز رطوبت کا اخراج

ہو۔ سن رسیدہ عورتوں کے رحم کی گردن میں خراش ہو۔

ناختہ یا بازو میں تشنج ہوا کھنکھنے کے وقت انگلیاں پھڑکیں (سٹینم)

کاشیکیم، سائیکلامن)

جلد پر بیرونی خارش وغیرہ سے تکلیف ہو، سرخی جس پر کھجلی محسوس ہو

کسی مخرج سے سیاہ خون کا اخراج ۔

زیادتی :- زیادہ گرمی یا زیادہ ٹھنڈک سے ، سہ پہر کو اور شام کو ۔
کسی :- گرمی سے اور مقام تکلیف کے پہلو لیٹنے سے ۔

معاون :- پلسا ٹیلا

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک عموماً مستعمل ہے ۔

ACID PHOS.

ایسڈ فاس

خصوصی علامات

- ۱۔ رطوبات زندگی کے ضائع ہوجانے کے باعث کمزوری ۔
- ۲۔ مریض لاپرواہ بنے تو جب زندگی کے کاروبار سے بے پروا ۔
- ۳۔ غم و اہم سے کمزور شدہ مریض ان اشیاء کی طرف سے بھی لاپرواہ اور بے توجہ ہوجائے جن سے قبل ازیں اسے خاص لگاؤ رہا ہو ۔
- ۴۔ چاند پر کھینچنے والا وزن ۔
- ۵۔ دست سفید رنگ کے اور بغیر درد کے جن سے کمزوری پیدا نہ ہو ۔
- ۶۔ پیشاب مقدار میں زیادہ بغیر رنگ کے پانی کا سا خصوصاً ذات کو ۔
- ۷۔ انزال ، بار بار ، مقدار میں زیادہ کمزور کرنے والے ۔
- ۸۔ مریض غمگین اور شفا سے مایوس ہو ۔
- ۹۔ دماغی ٹائیفائیڈ یا مائیفیس میں ممکن لاپرواہی اور غنودگی ۔

عام استعمال

گمزوری، عصبی تکان، خاص کر ایسی گمزوری جو رطوباتِ زندگی کے ضائع ہوجانے کے بعد پیدا ہو، محبت میں مایوسی کے اور غم و اندوہ سے پیدا شدہ خراب نتائج۔ ایسے نوجوان افراد جو بہت جلد تیزی سے بڑھ گئے ہوں اور جسمانی یا دماغی کام بہت کرتے ہوں، شام کے قریب یارات کو پسینہ کی زیادتی، ہڈیوں کے علاض، ہڈیوں کے پردوں کی سوزش، ہڈیوں کا سوکھ جانا، لڑکھڑاتی چال، جلادردا سہاں، سچوں کا درد اور بیمار نظر آنا، محرقہ بخار میں جریان خون کا خطرہ وغیرہ ہوتو اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ جریان، نامردی اور ذیابیطس میں بھی نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر لا پرواہ، گفتگو کرنے کو جی نہ چلے، خاموش اور غمگین ہے، سرسام، غنودگی، غصت، آئندہ کے لئے تشویش ہو۔

بہت زیادہ غمگین ہونے کے بعد چاند میں شدید درد ہو جیسے داغ کچلا گیا ہے۔

آنکھیں متورم، اوپر کے پوٹے پر گوہا بنی، چمکیلی اشیاہ کی طرف دیکھنے سے چکا چوندا، پوٹے اندر کی طرف سرد معلوم ہوں۔ کانوں میں گنگناہٹ ہو، شور برداشت نہ ہو سکے۔

مسوٹھے دانتوں کو چھوڑ دیں، دکھن ہوا اور خون بہتا ہو، دانت کو آگے کے دانتوں میں جلن کا درد، لیسڈار بلغم زبان پر، زبان اور

خلق خشک مگر پیاس نڈارد۔

مدہ میں بوجھ معلوم ہو، ایسا محسوس ہو کہ مدہ اوپر نیچے ہم وزن ہے، حوالی جگہ میں بوجھ۔

پانخانہ کثیر المقدار تپلا پانی کا سا، بلا درد کے اسمہاں جن میں کمزور تپا نہ ہو۔
دودھ کی طرح پیشاب اس میں قوام کی طرح خون آمیز ٹکڑے اور گردہ
میں درد، سات کو کثیر المقدار پیشاب بلا رنگ کا ہو، ذیابیطیس۔
اعضائے تناسل میں کھلی ہو، حشفہ میں، غوطوں میں کھلی گویا کوئی
کاشا ہے، منی کا اخراج خاص کر حلق کے بعد۔

حیض بہت قبل از وقت اور بہت دیر تک قائم رہنے والا،
حیض درد جگر کے ساتھ، رحم کا زخم جس سے کثیر المقدار گندی خون آمیز
پیپ، درد اور کھلی کے ساتھ خارج ہو۔

گلے کا بھاری پن، کھانسی جو کہ گلے اور کوڑی کے پاس خراش
ہونے سے پیدا ہو اور صرف صبح کو بلغم آئے، کھانسی اور اس کے
ساتھ مواد والا بدبو دار بلغم آئے۔

نقیدون کے وقت بہت آئے، رات کو بخوابی، پریشان کن
خوابوں کی کثرت۔

بخار لڑہ کے ساتھ بغیر پیاس کے، اس کے بعد اتنا شدید بخار کہ
مریض بیہوش ہو جاتے، ٹائیفائیڈ بخار، نوبتی بخار جو رات کو آئے،
(باری والا بخار) پسینہ میں پیاس، صبح کو زیادہ پسینہ آئے۔
تمام بدن کی جلد پر چکتے جن میں کھلی کی وجہ سے صلب زیادہ ہو کھاتے
ہوئے زخم ہو جاتے جس سے گندامواد نکلے۔

زیادتی :- دماغی بیماری سے ، رطوبات زندگی خاص کر منی نائل ہونے سے
جملق سے ، کثرت جماع سے ، بات کرنے سے سینہ میں کمزوری
معلوم ہو۔

کسی :- حرکت سے ، گرمی سے ، مرطوب موسم میں ۔

معاون :- چائنا ، پینے ، دست اور کمزوری کی حالت میں قبل
یا بعد ۔

کھانے کے بعد کمزوری کی حالت میں نکس و امیکا کے بعد ۔

ٹائیٹانڈ میں رسٹا کس کے بعد ۔

مصلح :- کیفیر ، سٹانی سگریا ، کافیا ۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر ۔

ACID NITRIC

ایسڈ نائٹرک

خصوصی علامات

- ۱۔ جسم تکلیف دہ اثرات کو بہت جلد قبول کرے ۔
- ۲۔ درد چھینے کے سے ، پھانسی لگنے کے سے ۔
- ۳۔ احساس پھانسی کا ماؤفہ حصص میں ۔

- ۴۔ مقعد میں پاخانہ کے بعد شدید کاٹنے والے درد جو بہت دیر تک قائم رہیں اور پیشینیا، سلسلہ
 ۵۔ پیشاب مقدار میں کم، سیاہی مائل بھورا، بہت تیز بہنے والا۔
 ۶۔ پیشاب خارج ہوتے وقت ٹھنڈا محسوس ہو۔
 ۷۔ زخم میں چائیس کا سا درد۔

عام استعمال

یہ دوا متعدد امراض میں کام آتی ہے۔ پارہ کے اثرات بد ہونے پر دوبارہ
 پیشاب آتا ہو، اور آتشک وغیرہ کے باعث ہونے والے امراض جلد، بلدیوں اور
 غددوں کے عوارض، پرانی سنگرہنی، مسوڑھوں، دانٹوں، زبان اور
 دہن کے عوارض جو پارہ کے غلط استعمال سے لاحق ہوں، ناک کا ڈنمقیر یا
 تپ دق (میں کلکیر یا کارب کے بعد)، خنازیر، شدید خنازیری رمدِ چشم،
 بچوں کا رمدِ چشم، سوزاکی رمدِ چشم، گلیٹیوں کی سوجن، سوزاک، سچیش
 پھیپھڑوں سے جریانِ خون، بلغم خراب، خونی سیال خارج ہوتا ہو،
 تو اس دوا کا استعمال حسب علامات مفید ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض ممکن، رنجیدہ، ناامید، موت سے خوف زدہ
 ہوتا ہے، کام کرنے کی رغبت نہیں ہوتی، حاقطہ کمزور ہوتا ہے۔
 درد سر یا چکر صبح اور شام کو جس کی وجہ سے مجبوراً لیٹنا پڑے۔
 آنکھوں میں ٹھیس، درم، اوپر کے چوٹے کا فالج، آنکھوں کے

سامنے سیاہ دھبے گھومتے محسوس ہوں۔ آنکھوں سے پانی جاری ہو،
 روشنی میں آنکھیں چندھیائیں۔

کانوں میں گھڑ گھڑاہٹ، مواد خارج ہو، بہاؤ، کان بند ہو جائیں
 چھرنے سے، ٹیس اور جلن ہو۔

ناک سے خون جارتا ہو، بدبو دار ہواناک سے نکلے، گندازہ و بلیغم خارج
 ہو، جلن ہو، پیٹریاں پڑیں، بہت شدید زکام ہو۔

چہرے کا رنگ زرد ہو، مہاسے نکلیں، ہونٹوں میں زخم ہو، گال
 کی ہڈی میں درد ہو۔

دانت درد اور ڈھیلے ہوں، تھپکن خاص کمرات کو یا سونے کے
 وقت ہو، بوسیدہ دانتوں میں درد ہو، منہ سے گندہ بدبو نکلے، رال سیاہ
 منہ میں خشکی اور بہت پیاس ہو، موٹھے سیدھے سوجھتے خون میتے
 ہوں، آتشک یا پارہ کی وجہ سے منہ اور حلق میں زخم ہوں، حلق میں ورم،
 اور ایسا درد ہو کہ گویا چھل گیا ہے، گندہ دہن ہو، رال میں خون آتے۔

اکثر متلی اور تے کرنے کو جی چاہے، ذائقہ تلخ اور خاص کر کھانا کھانے
 کے بعد صبح اٹھتے ہی شدید پیاس ہو، کھٹی ٹوکاریں، باضمک خرابی جو کہ
 گاڑی پر سوار ہو کر گھومنے یا چلنے پھرنے سے درست ہو، جگر کے قریب
 درد ہو، ران کی گلیٹیوں میں ورم ہو اور مواد ہو، پیٹ میں زیادہ اور
 بدبو دار جمع ہوں۔

پانچاڑ کبھی کبھار ہی خشک اور سخت ہو، عموماً پتلا، بار بار ہو، مقصد میں
 کھلی، بواسیر کے مستوں میں ورم اور ان سے رطوبت یا خون جاری ہو، مہرنہ
 کے کثرت چٹختے ہوئے، میعاد ہی بخار میں پانچاڑ میں خون آتے، ہمیشہ جس

میں خون آتے اور مروڑ جو۔

پیشاب روکنا دشوار ہو، پیشاب میں گھوٹے کے پیشاب جیسی آقاہ، برداشت بدبو ہو، خون آتے، پیشاب کے سوراخ پر درم ہو، پیشاب کمنے میں درم ہو۔

مردوں پر سپاری پر زخم اور ٹیس کا درد ہو، نوظلون میں درم، ایسا دلگی اور خواہش مباشرت غائب، عورتوں میں حیض جلد اور بکثرت، ایسا معلوم ہو کہ شرمگاہ کے راستے سے ہر ایک چیز باہر نکل پڑے گی، سیلان الرحم سخت بدبو دار اور جوئے رنگ کا ہو، پستان کی مٹھنی میں پھوڑا ہو، فرج کے اندر زخم ہو، سینہ میں چیخ، سانس لینے میں تکلیف، دل کی دھڑکن، خاص کر زینہ چڑھنے پر خشک جھونکنے والی کھانسی، لیٹنے پر سانس لینے میں بھگم کی آواز پیدا ہو۔

بیمار لرزہ کے ساتھ شام کے وقت لیٹنے سے قبل، کپڑا ڈھکنے سے تکلیف زیادہ ہو، پاؤں اور نپڈلیاں گھٹنوں تک سرد جس کے باعث نیند نہ آسکے بیمار میں کپڑا اوڑھنے سے نفرت، گرمی کے دورے، بار بار کسی ایک عضو پر یا کل جسم میں پسینہ، سانس جسم پر کھانا کھانے کے بعد پسینہ، پسینہ کے ساتھ اٹھ ٹھنڈے، ناخن نیلے، پسینہ مثل گھوٹے کے پیشاب کے بدبو دار ہو، تلووں میں پسینہ بکثرت، پاؤں کے انگوٹھے اور ان کے نیچے تلوے دکھنے لگیں، ایسا معلوم ہو کہ سوتیوں پر چلے ہیں۔

جلد پر کھیل ہو، مسامات خشک ہوں، سیاہ جھولے سرخی مائل دھبے زخم جو آسانی سے خون سے دیں، متے — پاؤں میں گھٹے کے باعث

درم۔

زیادتی :- شام کو رات کو چھوٹے سے ، موسم کی تبدیلی سے ، جاگنے سے ، بیٹھے ہوتے اٹھنے سے ۔

کسی :- گاڑی پر سوار ہونے سے (برعکس کا کیوس کے) نیز ڈکاؤ کے سے
 معاون :- آرسینکیم الیم ، کیلڈیم
 مصلح :- کلکیریا ، کونیم ، ہیرپلسٹ ، مرکپورس ، عزیزیم ، پٹیلا ،

سلف

یاد رہے کہ ایکس کے بعد نامٹرک ایڈھرگزا استعمال نہ کرنا چاہیے ۔

ACID

HYDROCYANIC

ایسڈ ہائڈروسیانک

خصوصی علامات

- ۱۔ ہسٹیریا اور مرگی کے سے دوہنے ۔
- ۲۔ اعصاب کا نعل معطل ہو (فالج)
- ۳۔ غشی ہو کہ پھیپھڑوں کے تعطل کا باعث ہو ۔
- ۴۔ بیضہ کی سی علامات (آرسینکیم الیم ، ورٹیم)

عام استعمال

گلے کی بندش ، چھاتی کی تنگی ، دل کی دھڑکن ، سبض کی کمزوری اور

بے قاعدگی وغیرہ کے ساتھ ہونے والے عوارض میں حسب علامات مستعمل مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر غشی اور بے ہوشی کا میلان، سرسام، خیالی تکالیف کا خوف، ہر ایک چیز سے خطرے کا احساس، گھوڑوں اور گاڑیوں سے ڈر، مکان کے گر جانے کا اندیشہ، موت کی دہشت۔

سر میں شدید درد، احساس جیسے داغ میں آگ لگ رہی ہے، آنکھ کی پتلیوں میں حرکت مفقود یا پتلیاں چھٹی ہوتی، کن ٹیویوں کے پاس شدید درد اور ان کے آس پاس چہرہ سرخ۔

جہڑوں کا دوروں کی صورت میں بڑھ جانا، منہ سے جھاگ کا اخراج، ہنٹ زردی مائل نیلے، زبان سرخ۔

پانی پینے پر نذا کی نالی میں، گلے میں اور معدہ میں گرگڑا مہٹ پیدا ہو۔ معدہ میں درد، جو معدہ خالی ہو تو شدید صورت اختیار کر لے، چھاتی اور معدہ کے درمیان شدید دھڑکن والی درد۔

سانس تیز، زبردست اور شور کرنے والا، خشک گلانہ کیرنوال شدید کھانسی، دمہ جس سے گلے میں بندش کا احساس ہو، کالی کھانسی، پھیپھڑوں کا نالی، پھیپھڑوں کی سوجن، دمہ، کالی کھانسی۔

شدید دھڑکن، نبض کمزور اور بے قاعدہ، ماتھ اور پاؤں ٹھنڈے، چھاتی میں شدید درد، شدید ویر قلب (سپائی جیلیا، آگڑا کب ایٹلم) مصلح :- کمیض، کاپنیا، اپیکاک، نکس و امیکا، اوپیم، ویرا ٹرم البم۔

طاقت :- عام طور پر ۳۰ یا ۳۰ تا ۳۰ طاقت ہی مستعمل اور مفید ہے
بڑی طاقتیں بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ خارش اور چھپاکی میں
خارجی طور پر استعمال کی جائے۔

AESCULUS HIPPI. ایسکیولس ہیب

خصوصی علامات

- ۱۔ مختلف حصص میں بھراؤ کا احساس۔
- ۲۔ بے حد چڑچڑاہٹ (کیمولا)
- ۳۔ مہرز میں خشکی اور حدت محسوس ہو جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھرنے میں۔
- ۴۔ قبض جس کے ساتھ گھبراہٹ میں شدید درد ہو۔
- ۵۔ پانخانہ کے بعد مہرز میں بوجھ، بھراؤ اور شدید درد، جو گھنٹوں قائم رہے (ایلو، اگنیشیا، میوریکک ایسڈ، سلفر)
- ۶۔ گھر کی بڈیوں کے جوڑوں میں شدید درد۔
- ۷۔ بحالت عمل محسوس ہو جیسے گھبراہٹ کے گئی ہے۔

عام استعمال

خصوصی طور پر ہیب کے معالجہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

متواتر میٹھا میٹھا کمر کا درد، کولہے اور نشست گاہ کی ہڈی تک ہوا جو چلنے یا بھگنے سے زیادہ ہو۔

مقعد لکڑی کے ٹکڑے، بھرے ہوئے محسوس ہوں، مقعد میں کانٹے چھیں، مقعد میں ریت بھری ہوئی معلوم ہو (کالین سویا)

دل کی ایسی دھڑکن جس کی تپکن ہاتھ پیروں تک ہو اور سوتے میں اور دن کو بھی سنائی دے۔ دماغی چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے۔ پسا ٹیلا اور کالی کارب کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے والا درد، پھاڑنے والا درد پھاڑنے والا درد بھی اس دوا کے خواص میں ہے۔

سر کے پیچھے یعنی گہری میں درد ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر کچلا جائے گا۔ سر اور ہاتھ میں بھراؤ محسوس ہو۔

مقعد کی رگوں میں انجماد خون (بواسیر)، آنکھوں کی رگوں میں خون کا انجماد جس سے آنکھیں سرخ ہوں، آنسو آتے ہوں، جلن ہوتی ہو، ان کے ساتھ درد خواہ ہوتا ہو خواہ نہ ہوتا ہو۔

ماضیہ کی نرابی جیسے ہی مریض کھانا کھا چکے ویسے ہی پسینہ میں جلن اور کھانا منہ کو آنے لگے جس طرح کہ فاسفورس، فیرم اور آرسینکیم میں ہوتا ہے۔ کمر میں درد جو کہ کولہے اور نشست گاہ کی ہڈی تک جاتے خاص کر وضع حمل کے بعد کے فوراً دنوں میں (زمانہ حمل میں ایسا درد ہوتا بھی یہ دوا مفید

ہوتی ہے)

گوشیا (بال کادریں) جو کہ شانے سے ہاتھ تک ہو۔

مقعد اور پیڑ میں تاد اور خشکی۔

بواسیر کے متے بڑے، نیگیوں اور ایسے پھولے ہوتے کہ پانخانہ کے راستہ کو بندھے ہوئے ہوں۔ ان میں سخت برجھی مارنے یا کاٹنے کا سادہ ہو جو کہ اور پر آنت تک چڑھ جاتا ہو، مقعد میں رکاوٹ، بھرا معلوم ہونا، درد، خشکی، کھجلی، چھینٹنے والی، اینٹھن، کاخچ باہر نکلنا، درد اس قدر زیادہ کہ مریض نہ لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے، ایسا محسوس ہو کہ کوئی اور صراہر مچا تو چلا رہا ہے۔ انتہائی درد والی بواسیر۔

زیادتی :- صبح کو بیدار ہونے پر، حرکت سے، پانخانہ کرتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، شام کے وقت، کھڑا ہوتے وقت۔

کسی :- تازہ کھل ہوا میں۔

مصلح :- نکس و امیکا، بواسیری علامات میں۔

طاقت :- در ٹیکچر نیز ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک۔

ACONITE

ایکونائٹ

خصوصی علامات

- ۱۔ عاوارہ تازہ تکلیفیت خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں جن کے اندر خون کی زیادتی ہو اور جو زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرتی ہوں۔
- ۲۔ تکلیفیت جو ٹھنڈی خشک ہوا سے پیدا ہوں۔

۳۔ ڈر، خوف اور قلبی پریشانی

۴۔ چہرے پر خوف، زندگی خوف کے باعث وبال بن جائے۔

۵۔ دماغی اور جسمانی پریشانی اور بے چینی۔

۶۔ نوجوان موٹائی تازی لڑکیوں میں میٹھن تک رک جائے خوف کھا جانے

کے بعد۔

۷۔ بنجار میں جلد گرم اور خشک ہو۔

۸۔ بنجار میں جلن دار پیاس، ٹھنڈے پانی کی زیادہ مقدار کے لئے۔

۹۔ بنجار میں از حد اعصاب لہا بے چینی، جان کشی کی سی حالت میں ادھر ادھر

کروٹھیں بیٹے۔

۱۰۔ کھانسی سانس باہر نہ کانے پر (کاسٹیکم)

۱۱۔ کھانسی ٹھنڈی خشک ہواؤں سے یا سولہ کے جھونکے سے۔

عام استعمال

حاد اور شدید اچانک حملہ کرنے والے قریباً سبھی امراض میں یہ فوری

اور پہلی دوا ہوتی ہے بشرطیکہ جسمانی اور دماغی مخصوص علامات موجود

ہوں۔ مثلاً بے چینی، فکر، تشویش اور گھبراہٹ دماغی اور جسمانی

جس کی وجہ سے تڑپ، ٹھنڈی سانسیں بھرنا، پہلو بدلنا، موت کا ڈر

موت کے دن کی پیش گوئی، ذرا سی تکلیف میں بھی گھبراہٹ موجود

ہو، کسی طرح تسکین نہ ہو۔

ایگزائیٹ ہر بنجار میں اندھا دھند دنیا بہت غلط ہے، یہ درم

والے بنجار میں دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ گھبراہٹ ضرور ہو۔

ٹائیٹاڈ بنجار کے آواز میں ایچونا ٹائیٹ ہمیشہ مضر ہوتا ہے بشرطیکہ
بنجار میں کوئی تحریک کن جذبہ ساق نہ ہو۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض خوف زدہ ہو، شدید بے چینی، اعصابی تکلیف
موت کا ڈر ہے چینی، گھبراہٹ، تڑپ، درد برداشت نہ کر سکتا ہو،
چھوٹے کی برداشت نہ ہونا، کپڑے کو آواز برداشت نہ کر سکے، کبھی زنا
کبھی گانا، سرسام، خاص کر سات کو دماغ میں چکڑے، ایسا محسوس ہو کہ کوئی
ادھر ادھر ہلائے جا رہا ہے۔ خاص کر بیٹھے بیٹھے ایک دم اٹھنے سے سردی
کے ماسے پٹا پڑے، خیالات پر آگندہ، موت کا ڈر، حافظہ کمزور،
سر میں درد تپکن کے ساتھ، کن پٹی میں بھاری پن، اندر سے بھرا
باہر کو پٹا پڑے، خاص تمام پر درد مثلاً پیشانی میں یا کن پٹی میں یا آنکھوں
میں یا اوپر کے جھڑے میں، سردی ہلنے سے یا جھکنے سے یا شور و غل سے
زیادہ ہو، آرام کرنے سے کم ہو، سر اور چہرہ گرم، خاص کر اندر اور اوپر
گرم پسینہ نکلے۔

حادی آشوب چشم، آنکھوں میں جلن اور درد ہو، جھوٹی پت بھاری پن
آفتاب کو روشنی سے گھبرائے، پچھوٹوں کا دم شدید اور سرخی مائل۔
کانوں میں سخت درد دم اور بھاری پن کے ساتھ
ناک سے خون جاری ہونا، صونگھنے کی طاقت تیز ہو
چہرہ سوجا ہوا، سرخ اور گرم، اٹھنے پر چہرے سرخی زردی میں بدل
جاتے، بائیں طرف چہرہ کا درد۔

ہونٹ خشک ہو جے ہوتے ، منہ اور زبان خشک ، پیاس زیادہ آتی
کوٹھنڈی ہوا سے تکلیف ، حلق میں سناہر کے ساتھ دم ۔

پانی کے علاوہ ہر چیز کا فائدہ کم ہو ، بھوک نہ ہو ، شدید
پیاس جو سبجہ ذکے ، ٹھنڈے پانی کی خواہش ، قہقہ اور تے ۔

معدہ میں کھانے کے بعد سخت درد ، دم جگر ، حوالی بگڑ میں بھاری
پن ، کوڑی کے پاس سرد پتھر رکھا ہوا محسوس ہو (کا لچکیم) پیٹ میں
جلن ، پیڑو چھونے اور دبانے کو برداشت نہ کر سکے ۔

پانخانہ پانی جیسا پیلا ، بعض دفعہ سبز رنگ کا ، درد اور نفخ کے ساتھ
قبض ، بعض اوقات چھیش میں کم پانخانہ مروڑ کے ساتھ ، مقعد کے ساتھ
ایسا محسوس ہو کہ گویا گرم پانی خالص ہوتا ہے ۔

پیشاب کم ہونا ، سرخ ہونا ، گردہ میں اینٹھن ، مثانہ کی گردن میں جلن
اور مروڑ ۔

مردوں کے فوطوں میں درد ، پیشاب کرتے وقت درد ہو ، عورتوں میں
خصیۃ الرحم کا دم اور حیض کثرت سے اور زیادہ دنوں تک آئے یا پھر
ڈرکے درجے سے حیض بند ہو جاتے ۔

نورخہ کا دم ، ذات الجنب کا پہلا درجہ ، خشک کھانسی یا خشک
سانس ، چھینکنے میں زور سے آواز نکلے ، کھانسی کے دورے میں سچہ اپنا
گلا پھڑکے (کیونکہ درد ہوتا ہے) ذات الصدہ (نمونیا) یا ذات الجنب
مع سناہر کے زیادہ پیاس ، خشک کھانسی اور گھبراہٹ کے ساتھ پھیپھڑوں
میں گگ ، سینہ میں چھین ، دل و صرکنا اور گھبراہٹ ۔

نسیب کا نہ آنا ، نہایت بے چینی ، یا پھر نیند بے مگر سونے کے

ڈراؤنے خواب نظر آئیں، بے چینی، کبھی سردی، کبھی گرمی لگنا، پیاز اور سببج۔

سناہ میں نبض تیز اور بھری ہوتی، کبھی سردی کبھی گرمی، گرم خشک جلد، درد، جلن اور جھنجھناہٹ کے ساتھ جلد کی خشکی اور کھوٹا زیادتی۔ شام کے وقت یارات کو درد ناقابل برداشت، گرم کر میں، بستر سے اٹھنے پر، تکلیف والے پہلو کو رٹ لینے پر کبھی:- دن میں، کھلی ہوا میں، آرام کرنے سے (بستر میں نہیں پسینہ کے بعد۔

معاون :- ایٹیک ایسڈ، بیلا ٹوننا، بربرس ونگ، سلفر مصلح :- آرنیکا (آنکھوں میں چوٹوں یا خراشوں کی صورت میں) طاقت :- ۳ سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

AGNUS CASTUS

ایگنس کاسٹس

خصوصی علامات

- ۱- دماغ غیر حاضر، سوچنے کی اہلیت میں کمی
- ۲- قبل از وقت بڑھاپا
- ۳- مکمل نامردی

۴- لیگوریا (سیلان الرحم) جس میں رطوبت غیر محسوس طور پر ڈھیلے

وہاں اعضائے متعلقہ سے نکلا کرے۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر آلات تناسل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مردوں اور عورتوں پر اس کا اثر یکساں ہے، مگر مردوں میں زیادہ وضاحت سے ہوتا ہے، کثرتِ جماع کی وجہ سے مریض قبل از وقت بوڑھا نظر آئے سوزناک کئی بار ہو چکنے کی وجہ سے نامردی کا عارضہ ہو، مویج آجانے، جوڑ اتر جانے کے لئے بھی موثر دوا ہے، جسم کے تمام حصوں میں کالنے والی کھجلی ہو، بالخصوص آنکھوں میں تو یہ دوا موثر و مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

مالغویا، موت کا خوف، ننگین کے ہمراہ جلد مر جانے کا خیال ہو، خالی الذہن، جلد بھول جائے، ارادے پست ہوں، مریض سے کستوری یا ہیرنگ مچھلی کی بو آتی ہے، طبیعت گرم گرمی اور اس ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل ہوئی، آنکھوں میں غارش، روشنی ناقابل برداشت تلی میں سو جن اور دکھن، پانے نرم ہوں اور بدقت خارج ہوں، اندر کی طرف لوٹ جاتے محسوس ہوں، گہرا اشتقاق مقعد، اباکٹیوں کے ہمراہ ایسا محسوس ہو کہ انتہی دریاں نیچے کود رہی ہیں۔ آنٹوں کے پھلے حصہ کو کچڑنا چاہے۔

مردوں میں پیشاب کی نالی سے زرد رطوبت خارج ہو، ایسا دل بالکل نہ ہو، نامردی، عضو ٹھنڈا اور سکڑا ہوا، خواہش مفقود، سیلینیم،

کوئیم، سیبل سیولانا

علا ایستادگی مقوڑی سی منی خاسج ہو جاتی ہو، قرچہ ہو، خصیے ٹورے
ہوں، سوچے ہوئے سخت ہوں اور درد کریں۔

عورتوں میں حیض مقدار میں کم، جماع سے سخت نفرت ہو، اندام
نہانی سکڑی ہوتی اور سیلان الرحم ہو، مچھاتیوں میں دو دھن ہو، غمگین
رہتی ہو، بانجھ ہو، زور دگانے پر شفاف سیلان الرحم جاری ہو۔
معاون :- آلات تناسل کی کمزوری یا نامروری میں انگیس کا سٹس کے
بعد کیلیڈیم اور سیلیم بہتر کام کرتے ہیں۔

طاقت :- ۲x سے ۱۲x تک اور ۲۰ طاقت۔

ALOE

ایلو

خصوصی علامات

- ۱۔ لیٹی کے سے بلغم کے ٹکڑے حلق یا مبرزہ سے گریں یا ان میں پیدا ہو
جائیں۔
- ۲۔ دست جس کے لئے کھانے اور پینے کے فوراً بعد پانخانہ کو بھانگنا
پڑے (کروئن ٹنگ)
- ۳۔ مبرزہ کی نالی پر بالکل اعتبار نہ ہو، صبح سویرے بستر سے اجابت
کے لئے بھانگنا پڑے (سورہینم، ریومیکیس، سلف)

- ۴۔ درد شکم پانخانہ سے پہلے اور اس کے دوران ۔
 ۵۔ درد شکم اور مروڑ کے دوروں سے قبل قبض کی شکایت ہو۔
 ۶۔ پانخانہ سے قبل مبرز میں بھاری پن محسوس ہو۔

عام استعمال

یہ دوا جسمانی طاقتوں کو بحال کرنے کے لئے، جبکہ کثرت استعمال ادویہ کی وجہ سے دوا اور مرض کی علامات مل جلی ہوں، نہایت اعلیٰ ہے اس سے بڑھ کر دوسری کوئی ایسی دوا نہیں جس میں جگر کی طرف خون لے جانے والی دویوں میں اجتماع خون کی اس قدر علامات ہوں اور اس قدر عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہوں، اسی لئے بوا سیر کی بہترین ادویہ میں یہ دوا بھی شامل ہے۔ مبرز اور پانخانہ کے دیگر عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

پانخانہ زرد خون ملا ہوا یا شفاف توام کی طرح آؤں مل جوتی۔ بعض اوقات آؤں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نو قعرے غیر محسوس طور پر مقعد سے نکل پڑتے ہیں۔ بعض اوقات پیشاب کرتے وقت یا ریح خارج کرتے وقت خود بخود پانخانہ ہو جاتا ہے، بوا سیر میں انگوڑ کے لچے کی طرح سے متے نکل آئیں اور ان کو سرد پانی سے آرام ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ مقعد کے اوپر کسی بھاری چیز کا بوجھ ہے اور اگر مقعد کو سکونہ اجائے تو گر پڑے۔
 سیاح کے ساتھ پانخانہ ہو جانار آلینڈر، میورٹیک ایٹڈ
 پیٹ میں پانخانہ کے قبل بہت گرگرا مہٹ ہونا اور پیڑ اور مقعد

میں بوجھ معلوم ہونا، انگور کے گھچوں کی طرح کا پانچ نکل آنا، سرد پانی سے آرام ہونا (میوہ مالک ایسڈ میں گرم پانی سے آرام ملتا ہے)

ایو اور میوہ مالک ایسڈ دونوں میں بوا سیر ہوتی ہے۔ ایو میں کھانے پینے ہوتے ہیں لیکن میوہ مالک ایسڈ میں دکن زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ لیٹر سے اور چھوٹے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایو میں بوا سیر کے متے انگور کے گچوں کی طرح باہر نکل آتے ہیں اور ان کو سرد پانی سے آرام ہوتا ہے۔ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ مبرز کی کمزوری تھیں میں بھی معلوم ہوتی ہے اور بستہ پانخانہ بھی خود بخود نکل جاتا ہے۔ پانخانہ کی خصوصیت یہ ہے کہ علی الصبح قریب پانچ بجے کے حاجت کی وجہ سے جاگ پڑے اور شب بھر تمام جلدی سے پانخانہ جاسکے۔ ایسی حالت میں سلفر، فٹو جا اور برائیونیا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

کروٹن مالک میں بھی صبح کو دست آتے ہیں، ہلکا زرد پتلا پانی کا ایسا بلا درد کے اور کثیر مقدار میں ایک دم زور سے پانخانہ ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے نہایت کمزوری ہو۔ سلفر کے دست میں آؤں والا پانخانہ پتلا بلا درد کے یا غیر منہضم نذا پانخانہ میں خارج ہو اور مریض اٹھ کر صبح کو پانخانہ جانے کے لئے جاگے۔ فٹو جا میں زرد پانخانہ زبردستی نکل پڑے، اس کے ساتھ ریاخ بھی خارج ہوں۔ برائیونیا میں سیاہ اور گندا سترے بوٹے پنیر کی طرح بدبو دار پانخانہ ہو اور کچھ دور چلنے کے بعد پانخانہ زور کرے یعنی سوکر اٹھنے کے فوراً بعد نہیں آتا ہے بلکہ کچھ دیر کے بعد۔ لیکن ایوز میں ایک عجیب حالت معلوم ہوتی ہے کہ گویا مقعد میں شدید کمزوری ہے خاص کر مبرز میں اور مریض محسوس کرتا ہے کہ باوجود

رکن کے بھی پانخانہ نکل پڑے گا۔ حتیٰ کہ مریضی پانخانہ نکل جانے کے اندیشہ سے پیشاب کرنے اور ریاح نکالنے کر سچے سے بھی ڈرتا ہے ایسا عکس اس ہو کہ اعضائے تناسل اور مقعد کے درمیان کسی نے کسی عکس نہ دیکھی ہے
(پیرسلف، قنوجا، کاسیکیم)

پیشاب میں خارا اور سرخ لہجہ اور بھاری پن کے ساتھ، پیشانی سے لیکر ناک کی جڑ تک ہوا جس کی وجہ سے مریض آنکھیں بند رکھنا چاہے اور اپنے خیال کو بیکسو نہ قائم کر سکے۔

ایسا اور سرد سرخائے کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اور دست گرمی کے موسم میں بجائے کے موسم کی ترابیاں، کلابودیک، سبڈویلا، سلفر اور نکس نامیکیا میں بھی ہوتی ہیں۔

ضعیف افراد کا پیشاب نہ رک سکنا بھی ایسے درست ہوتا ہے۔ زیادتی۔ علی الصبح گرم خشک موسم میں، کھانے یا پینے کے بعد کسی درد گھنڈک سے بکھل جوائیں۔

معادن :- سلفر

مصلح :- اچیم

طاعت :- پیشاب طاعت سے ۶ طاعت تک

ALLIUM CEPA

ایلیوم سیپا

خصوصی علامات

- ۱- ناک، مقدر میں زیادہ پانی کا سا اور ناک سے تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبت۔
- ۲- نزلادی جنجوعے کے درم سے کھانسی، ایسا محسوس ہو کہ کھانسی لگے کو پھاڑ ڈالے گی۔
- ۳- پاؤں میں رگڑ سے پھوٹے کا سادرو ہو۔

عام استعمال

ناک یا آنکھ سے پانی کی سی خراش پیدا کرنے والی رطوبتوں کے اخراج ہوں تو یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

نکام جس کے ساتھ درد سر ہو خاص کر پیشانی میں، گرم کمرہ میں اور شام کو زیادہ، چہرہ میں دود کی لگی کے ماتہ درد ہو۔
آنکھ یا ناک پر سہنجی اور جلن، آنسو بہیں، روشنی کی طرف دیکھنے سے تکلیف ہو، چھینکیں آئیں، خاص کر گرم کمرہ میں آنے سے ناک سے بہت پانی ہے، ناک کی جڑ پر کوئی چیز اٹکی ہوئی معلوم ہو زور کا

کابھتا ہوا زکام، درد سر، کھانسی، آواز بجاری۔

معدہ میں ریاح کی گڑگڑاہٹ، بدبودار ریاح خارج ہونے سے پہلے
نہایت بدبودار۔

آواز بجاری، ٹھنڈی ہوا کی سانس لینے میں بہک بہک کرنے والی
کی نسی آئے، حلق میں خراش، ایسا معلوم ہو کہ حلق چھل گیا ہے۔ سانس
لینے میں تکلیف۔

زیادتی :- شام کو، گرم کمرے میں

کھلی ہوئی اور ٹھنڈے کمرے میں

معاون :- فاسفورس، پلسا ٹیلا، سارسا پریلا، تھوجا

مصلح :- آرنیکا، کمیومیلا، کانیا، نکس دامیکا، تھوجا، وریبرم

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

AMBRA GRISEA

ایمبر گریسیا

خصوصی علامات

۱۔ دوسروں کی موجودگی میں تک کہ نرس کی موجودگی میں پانخانہ نہ
کر سکے۔

۲۔ سیلان الرحم (سیکھدیا) گاڑھا، سبزی مائل سفید آؤں کا سا۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر نازک مزاج اور بیمار صورتہ اشخاص پر ہوتا ہے، جن کو ٹھنڈا سانی سے لگ جاتی ہو۔ یعنی ایسے بچوں یا جوان لڑکیوں پر جو کہ عصبی طبیعت کے ہوں اور کمزور ہوں اور جن کو جلدی طیش آجاتا ہو یا ان عمر رسیدہ مردوں پر جن کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں اور جن کو چکر آتے ہوں، سخت تعب ہو اور جو کہ ہر کام جلد بازی سے کرتے ہوں اور ان کے خیالات میں وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا ہو۔ کھانسی میں بھی یہ دوا مفید ہے جو کہ عصبی اور تشنجی قسم کی ہو، کھانسی کے ساتھ گلا بھی بیٹھا گیا ہو۔ دیگر اشخاص کی موجودگی میں یا گفتگو کرنے اور پڑھنے سے کھانسی کا زور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھاتے لگی ہوئی ہے۔

یہ دوا اس وقت بھی منظر ہوا کرتا ہے جبکہ نحیف سی بات پر مثلاً لمبا سفر کرنے یا سخت پاخانہ کے آنے سے خون عیض جا رہی ہو جاتا ہو، حیض قبل از وقت آتے ہوں اور دوران وقفہ کے لیکچر یا (سیلان الرحم) بزرگ نیگیوں آیا کرتا ہو۔ اندام نہانی میں دکھن اور سوجن ہو اور ساتھ ہی غارش بھی ہوتی ہو۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض مردم بیزار ہوتا ہے، تنہا رہنا چاہتا ہے۔ گانا سننے سے دونا آئے، مایوسی، زندگی سے نفرت، شرمیلا ہونا بے چین ہے اور

وای تباہی کئے۔

سر جکڑتے، سر میں کمزوری، دماغ کے اردپ کے نصف حصہ میں پھانسنے والا درد ہو، گمانا سننے کے وقت دماغ کی طرف دوران خون ہو، سنا کی کم قسم صبح کو کیسی ہے۔

ڈکاریا آئیں، اس کے ساتھ تشنجی کھانسی، سینہ میں جلن، آدھی رات کے بعد پیٹ اور پیڑ پیول جاتے، پیٹ میں ٹھنڈک معلوم ہو، اعصابی تشنجی کھانسی، اس کے ساتھ آواز بجاری اور ڈکاریا جو کہ صبح کو چلنے پر آئیں دوسرے کے ساتھ تکلیف زیادہ ہو۔ تشنجی جھونکنے والی کھانسی، دھڑکن موہ سینہ کے بوجھ کے، ایسا معلوم ہو کہ سینہ میں کچھ اڑا ہے، اپنی نبض خود معلوم ہوتی ہو، کھل ہوا میں دل دھڑکے۔

مثانہ اور متعدد میں ساتھ ساتھ درد اور جلن، پیشاب میں ایسا معلوم ہو کہ چند قطرے پیشاب کے رک گئے ہیں، پیشاب کرنے کے وقت پیشاب کی نالی میں جلن اور کھجلی، پیشاب کی دھار بھی گندی معلوم ہو۔ عورتوں کو کثرتِ جماعت، مراق، عورتوں کے پیشاب اور پاخانہ کے مقام کے درمیان سوجن، دکھن اور کھجلی، حیض بہت جلد، کثیر المقدار نیگیوں، رات کو سیلان الرحم زیادہ ہو۔ ایام حیض کے درمیان ذرا سی کچھ بات ہونے پر بھی خون جاری ہو جاتے۔

نورٹوں میں سخت کھجلی ہو، گوا پر سے سن ہوں لیکن اندر جان ہو بہت زور سے ایسا دگی ہو۔

اتھ، پیر، انگلیوں اور ٹانگوں میں تشنج ہو، تفکر کی وجہ سے نیند آتے، اٹھ کر بیٹھنا پڑے، متوحش خواب دیکھے، جلد میں کھجلی اور دکھن

خاص کر اعضاء تناسل میں۔

زیادتی: گرم اشیا کے پینے سے، گرم کمرہ میں، موسیقی سے، لیٹنے سے پڑنے سے یا باوانہ بلند بولنے سے، دیگر اشخاص کی موجودگی میں جاگنے سے۔

کبھی بہ کھانا کھانے کے بعد، ٹھنڈی ہوا میں، ٹھنڈی خود آگ سے، ٹھنڈی اشیا پینے سے، بستر پر اٹھ کر کھڑے ہونے سے۔
مصالح: کیسٹو، کافیا، نکس و امیکا، پلسا ٹیلا، سٹاف سگیریا۔

AMMONIUM CARB.

ایمونیم کارب

خصوصی علامات

۱۔ نکسیر جب صبح کو منہ ماتہ دھوتا ہو (آرنیکا، میگنیشیا کارب)

۲۔ نکسیر کھانا کھانے کے بعد

۳۔ ناک کا بند ہو جانا، خونخوارات کے وقت، منہ کے راستے سانس لینا پڑے۔

۴۔ ذہنی تغیر یا میں بچے سو نہ سکیں کیونکہ بندش کے باعث ناک کے ذریعے سانس نہ آئے۔

۵۔ سینے کے آغاز پر سفیدگی کی علامت (لبوسا، وریٹیرم)

۶۔ حینہ کے دوران تھکاوٹ محسوس ہو

عام استعمال

یہ مضبوط اور گھٹیلے بدن والی عورتوں کی خاص دوا ہے۔ بشرطیکہ وہ جلدی ٹھک جاتی ہوں، جلدی زکام قبول کر لیتی ہوں، اور ایام ماہواری سے قبل ان میں ہیضہ کے مشابہ علامات پائی جائیں۔ اور عام طور پر بیٹھنے کی عادی ہوں۔ چلتی پھرتی کم ہوں اور ان کا دل کمزور ہو اور عام امونیا سونگھنے کی عادی ہوں۔ جنہیں ایام ماہواری قبل از وقت اور زیادہ مقدار میں آتے ہوں۔ اس دوا کا اثر تھلتی اور آلات تنفس پر خاص طور پر ہوتا ہے۔

موٹے آدمی جن کے دل کمزور ہوں، سانس تنگی سے آتے اور گلے کی بندش محسوس کریں صبح معشوں میں اس دوا کے مریض ہوتے ہیں، ایسے افراد کو ٹھنڈی ہوا میں جلتے ہی زکام لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو انیونیوں کی طرح پانی سے ڈر لگتا ہے اور اس کو ہاتھ دگانے سے بھی کانپتے ہیں اور اس کی شکل سے ہی دور بھاگتے ہیں۔ خون میں پیشاب کے ذہر کا سراپت کر جانا، تمام اعضاء میں بھاری پن۔ اس کا مریض گندی عادتوں والا اور گندہ رہنے والا ہوتا ہے، جسم کے کسی عضو میں سوجن، غدودوں کی سوجن اور تیزابی مواد کا اخراج بھی اس دوا کے ذریعہ آتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بد مزاج، چڑچڑا، زرد منج اور بہت جلد بھول جانے والا ہوتا ہے۔ اس میں فاسد مادوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ خاص کر طوفانی موسم میں یہ علامات زیادہ واضح ہوتی ہیں۔

داغ میں دم ہو، جسم سرد اور نبض کمزور ہو، ماتھے میں دھمکن ہو،
آنکھوں کے لئے روشنی ناقابل برداشت ہو، جلن ہو، زیادہ دیر
تک نظر جھا کر نہ دیکھ سکے۔

نزلا جس میں ناک بند ہو اور مریض دم گھٹنے کے باعث بیدار ہو
جاتے۔ سوزش نزلا جس کے ہمراہ حلق میں جلن ہو، منہ دھونے وقت تکمیر
چھوٹے۔

چہرہ پر پھینسیاں ہوں، جن میں دکھن اور جلن محسوس ہو، منہ خشک،
دانتوں میں درد ہو، زبان پر آبلے ہوں، ذائقہ کڑوا ہو، ہونٹ نیگیوں ہوں
خشک کھانسی، سینہ میں جلن، شدید اختلاج قلب ہو، دم گھٹ
کہ آئے اور حرکت سے غشی لاحق ہو۔

پریٹ میں درد اور گرگڑا ہٹ، مقعد میں خارش ہو، بواسیر اپنے
دوسے کے وقت نہایت تکلیف دہ ہو، بواسیر کے متے باہر نکلتے رہتے
ہوں، پیشاب کی بار بار حاجت ہو،
جلد پر شدید خارش، جلن دار آبلے، بالخصوص اعضاء تشلل اور
دھڑکے قریب۔

زیادتی :- سرد و مرطوب موسم میں، تیز شیار کھانے سے ۳ بجے سے
۴ بجے صبح تک، ایام حیض میں اور نہانے سے۔
کبھی :- شام کے وقت، معدہ کے بل لیٹنے سے، داہنی کروٹ
پر لیٹنے سے، ماؤفہ کروٹ لیٹنے سے، بیرونی دباؤ سے، گرم
کمرے میں، خشک ہوا میں۔
مخالف :- یکے کے

مصلح :- آرنیکا، کیمفر
طاقت :- چھوٹی ہی طاقتیں زیادہ تر مستعمل و مفید ہیں۔

ANTIMONIUM TART. ایسٹیمونیم ٹارٹ

خصوصی علامات

- ۱۔ جب مریض کھاتا ہو تو چھپیٹے کی نالیوں میں بلغم کی بہت بڑی مقدار جمع معلوم ہوتی ہے۔
- ۲۔ چہرہ، ٹھنڈا، نیلا، پیلا، ٹھنڈے پسینہ میں تر (ٹوئیگم)
- ۳۔ سب کھانے کی غیر معمولی خواہش۔
- ۴۔ تپ کے بعد غنودگی اور تھامت۔
- ۵۔ دم گھٹنے، غنودگی اور بے ہوشی کے ساتھ سجدہ نمینہ یا نمینہ کی نہ لکنے والی خواہش۔

عام استعمال

اس کا استعمال آلات تنفس کے امراض میں اکیسٹریاٹ ہوتا ہے۔ بلغم کا چھاتی میں خورخراہٹ اور کثرت سے خارج ہونا اس کی مخصوص علامات ہیں۔ غنودگی، کمزوری اور پسینہ آنا ایسی علامات ہیں کہ جہاں پر یہ دوائی استعمال کی جائے وہ کم و بیش ضرور موجود ہونی

چاہئیں، شاربوں کی اور تقریبی افراد کے فتورہ انہضام، بیضہ، رنگوں میں سردی محسوس ہونا، تمام بدن کا تپنا، سخت کمزوری، غشی اور دروگر کے لئے بہت مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض میں ہذیان کی کیفیت ہو، اپنے آپ ہی باتیں کرے، اکیلا رہنے کا خوف، ذرا ذرا سی بات سے خائف ہو، شام کے وقت کچھ زیادہ ہی خوشی طاری ہو، طبیعت سست، خائف اور بے قرار بڑھتا ہے بغیر کسی کو اپنا آپ چھونے نہ دے۔

زبان سفید ہو، جس پر موٹا میل ہو، کنا سے سرخ، بعض دفعہ بھڑی بیچ میں سرخ اور خشک۔

چہرہ سرد اور نیگیوں، زرد، چہرہ پر سرد پیٹھ، ٹھوڑی اور نیچے کا جہڑا متواتر کا پتتا ہوا۔

رقیق چیز آسانی سے حلق سے نہ اتر سکے، بجز دامنی کروٹ لیٹنے سے کسی دوسرے پہلو لیٹنے پرتے ہو جائے۔ مثل، ابکائی اور تے خاص کر کھانا کھانے کے بعد، تے آنے کے بعد غشی ہو، ٹھنڈے پانی کی زیادہ پیاس۔

سینہ میں بغم آواز دے، کھنکھانے سے بہت کم نکلے سینہ میں جلن جو حلق تک پہنچے، پانی تھوڑا اور بار بار پئے، تہنہ تھوڑی ریا کی زیادتی، پیٹ میں دباؤ، خاص کر آگے جھکنے سے، بیضہ، ضیق النفس (سانس کی تکلیف)، جلد جلد سانس لے، سانس لینے

میں تکلیف، ایسا معلوم ہو کہ دم گھٹ جائے گا۔ اعلیٰ کر بیٹھنا پڑے
دم بدم کھانسی اور سانس کے لئے منہ پھیلاتے، پھیپھڑوں، ہوا کی نالیوں
میں بلغم خوب جبراً ہوا، کھانے سے کھانسی زیادہ ہو اور سینہ اور حلق میں
درد ہو، پھیپھڑوں کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو، دھڑکن اور سینہ میں
گرمی، نبض تیز اور کمزور۔

گھر میں سخت درد، خفیف حرکت کرنے سے (بلنے سے) بھی متلی
ہو اور سر و پسینہ آئے، نشست گاہ کی ٹہری میں بوجھ ہو اور معلوم ہو
کہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔

چمپک ہو، مواد بھرتے ہوئے دانے نکلیں اور ان کے اچھے
ہونے پر سرخ اور نیگیوں نشان بن جائیں۔
ہر تکلیف میں سید غفلت اور غنودگی کی کیفیت ہو، بہت
مہینہ معلوم ہو۔

بہار میں جس میں پیاس بھی زیادہ ہو اور پسینہ بھی زیادہ ہو
اور مہین پر غفلت طاری ہے۔

زیادتی، رات کے وقت، رات کو لیٹنے سے، گرمی سے، مرطوب
شڈے موسم سے۔ تمام کھٹی چیزوں اور دودھ سے۔
کبھی۔۔ سیدھا بیٹھنے سے، دیباہ اور بلغم کے اخراج سے۔
کھل ہوا میں دامن کروٹ لیٹنے سے۔

معاون :- فاسفورس

مصلح :- ایسا نوٹیا، کوکوس انڈیکا، چائنا، کونیم، رشاکس،
اپیکاک، لارڈ سیرکس، مرکپورسین، اوسیم، پلساٹیل، سپیا۔

طاقت :- ۲ سے ۳ طاقت تک .
(نوٹ :- چھوٹی طاقتیں تکالیف کو ٹہراتی ہیں)

ANTIMONIUM CRUD.

اینٹی مونیئم کرویڈ

تخصیصی علامات

- ۱۔ بخور اور نوجوان افراد میں موٹا ہونے کا میلان .
- ۲۔ سچے چڑچڑے ، چھچھو جانایا اپنی طرف دیکھنا جانا برداشت نہ کر سکیں .
- ۳۔ ہمد غلیظی
- ۴۔ اضمہ کی تکالیف زیادہ کھانے سے
- ۵۔ زبان پر موٹی وردہ کی سی سفید میں کی تہ (یہ نشان اس دوا کا نہایت قیمتی ہے ۔)
- ۶۔ بلغمی خلوت متعدد سے تیز سوزش پیدا کرتی ہوتی رہتی ہے ۔
- ۷۔ بائیں بوا سیر ہو ۔
- ۸۔ پاؤں کے تلووں میں بڑے بڑے گٹے جو چلتے وقت بہت درد کریں ۔
- ۹۔ سوجن کی گسی برداشت نہ ہو سکے ۔
- ۱۰۔ موسم گرما میں تھکا ہوا اور کمزور ہوسوں کرے ۔

عام استعمال

معدہ اور آنتوں کے امراض کے لئے مفید ہے (خاص طور پر بچوں میں)۔
 تیز سم کی کھانسی مع کالی کھانسی کے ابتدائی مرحلے میں مستعمل ہے، جبکہ ساتھ زبان
 پر سفید میل بھی ہو رہا ہو۔ مضمی اور بسیار خوردگی سے ہونے والی تھکے کے لئے
 خاص دوا ہے۔ بچوں کے خنثی، اسہال، آنتوں کے کٹیب اور دودھ
 اٹھنے کے عوارض میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ گرم خوردہ و آنتوں کے درد
 میں بھی نافع ہے۔ پرانے آتشک میں جو بڑھئیوں تک سرایت کر چکا ہو
 یہ خاص دوا ہے۔ خنثی سے منہ کے کنارے یا نتھنے پھٹے ہوئے ہوں اور
 دکھیں یا نامن کٹھے پھٹے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھیں تو یہ دوا مفید
 ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض زود رنج ہو، پاگل پن کی طرف مائل نظر آئے، زندگی سے
 نفرت ہو، جی چاہے کہ اپنا سر پھوڑ کر بھیجا نکال ڈالے یا ڈوب سے
 بچو یہ زبرداشت کرے کہ کوئی اس کو چھوتے یا اس کی طرف دیکھے اس
 سے بات کرنے پر چینی (سدیشیا) یا اگر مھپو اجبتے تو چلائے (سانا، ستانی
 سیگ یا کیو میلا نکس و امیکا)
 سر میں الجھن، متوالا پن، چکر اور اس کے ساتھ قتل ہو، نہانے سے
 درد ہر ہو جاتے، سر میں اجتماع خون سے نکسیر ہے، معدہ کے رگاڑے
 درد ہر۔

آنکھ کے پھوٹے سرخ، سوجے ہوئے، آشوبِ چشم، ان میں بھلا لٹنے کا سادرو ہو۔ کورن میں کیچڑ ہو۔

کان میں بھجنناہٹ، کم سنائی ہے، ایسا معلوم ہو کہ کان پر کسی نے پٹی باندھ دی ہے۔

نقنوں کا کٹا پٹنا اور پھولا ہوا ہونا، سانس لینے میں ناک سرد معلوم ہو، دردِ سر کے بعد ناک سے خون بہنا، نقنوں میں پیڑھی جمی ہوئی ہو۔
منہ کے گوشے چٹھے ہوئے اور دکھن، سرے ہوئے دانتوں میں درد، دانتوں میں کیڑے لگ جائیں، دانتوں اور مسوڑھوں سے خون نکلے، دانت کا درد، ٹنڈی سانس لینے سے زیادہ ہو، منہ خشک، زبان پر سفید دھبے یا میل جما ہوا، ذائقہ کڑوا۔

پیٹ پھولا ہوا اور جرا ہوا معلوم ہو، خاص کر کھانا کھانے کے بعد، ڈکار میں کھانے کا ذائقہ معلوم ہو، زیادہ کھانے کی وجہ سے بگاڑ۔ نم معدہ میں سروڑ کا درد اور پیٹ میں کاٹنے والا درد، سخت متلی اور صفراوی تھی ہو، معدہ خالی ہو، ایسی زبردست متلی ہو کہ کسی چیمیر سے نہ لے سکے، پیٹ میں ہرج جمع ہوں جن کی وجہ سے گڑ گڑاہٹ ہو۔

پانخانہ سخت ہو اور وقت سے خارج ہوا پھر تپلا پانخانہ پانی کا سا اس کے ساتھ پینے میں درد، پانخانہ میں درد آوں نکلے، ایسا معلوم ہو کہ بہت پانخانہ ہو گا مگر صرف ریاح خارج ہو اور آخر میں سخت پانخانہ ہو۔ پیشاب اکثر بکثرت ہو، پیشاب میں جلن، کھانے میں بے اختیار پیشاب نچا ہو جاتے۔

لڑکے کے ساتھ بنجار جس میں پاپس نہ ہو، لڑکے کے بعد پسینہ ہو اور

پینے کے بعد سجاد ہوا اور کسی حالت میں پیاس نہ ہو۔

منہ کے کنارے یا انگلیوں کے ناخن کٹے بیٹھے۔

بواسیر جس سے متواتر رطوبت خارج ہوا کرتی ہے۔

زیادتی :- شام کو کھانے کے بعد، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، آگ

یا دھوپ کی گرمی سے، زیادہ سردی یا گرمی سے۔

کسی بہ آرام سے، کھل ہوا میں، مرطوب گرمی سے یا گرم پانی کے

ساتھ نہانے سے۔

معاون :- سکویلا۔

مصلح :- کلکیریا، ہیرپلٹیف، مرکوریس۔

طانت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر

BAPTISIA

پیشیا

خصوصی علامات

۱۔ تمام رطوبات اور اخراج متعفن ہوں۔

۲۔ مرضی صندھ ترقیق اشیاء ننگی کے (بریشا کارب)

۳۔ طلق کا پینا بغیر درد کے، گلے کے غدودوں کا متورم ہونا۔

۴۔ مرضی جس وضع سے بھی لیٹے اور جس کرڈٹ بھی دراز ہو وہ تھکی

ہوئی محسوس ہوا اور مرد کے (پائرو جینیم اور آرنیکا سے مقابلہ کریں)

عام استعمال

اس دوا کا جسمانی کمزوری، مسلسل ہلکے سہاروں، خون کی زہریلی کیفیت، غیر یا کے زہر اور صدمے زیادہ نقابہت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جسم کے تمام حصوں پر دوا کا ناقابلِ برداشت ہو، جس جانب مریض لیٹے وہ درد کرتے ہیں۔ تمام اختلاج نہایت بدبودار ہوتے ہیں مثلاً سانس، پاخانہ، پیشاب، پسینہ وغیرہ، دوائیں جانب زیادہ مآؤف ہوتی ہے۔

انفلوئنزا، سچوں کی مزمن سمیت جیکے پاخانے اور ٹوکا بدبودار کرتے ہوں تو یہ دوا مستعمل ہے۔ لیکن طاقت میں یہ دوا تپ محرقہ کے جراثیم کو قتل کرتی ہے اور مریض کے جسم میں ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اگر ٹائیفائیڈ وکسین کا ٹیکہ لگانے پر شیوکے بد اثرات ظاہر ہوتے ہوں تو اس دوا کو نہ بھوننا چاہیے۔ تپ محرقہ کے مریض کے اچھا ہونے پر بھی یہ دوا کچھ دیر دیتے رہنا چاہیے تاکہ جراثیم پورے طور پر ختم ہو جائیں اور دوسروں تک نہ پھیلنے پائیں۔

عورتوں میں پر سوت کے سہار کے لئے بھی بپ ٹیٹہ ایک لاجواب

دوا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کے خیالات میں الجھن ہوتی ہے، غفلت اور سرسام، خاص کر رات کو کسی چیز پر خیال زخم سکے۔

سر سبت بھاری معلوم ہو، میٹھا میٹھا درد ہوا تپکن کا درد ہو ایسا

معلوم ہو کہ سر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے کسی نے بکیر دیا اور وہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

چہرہ گرم جلتا ہوا اور تھمٹایا ہوا۔

زبان، ایسا محسوس ہو کہ کھری دی گئی ہے، اس کے اوپر پھوڑا، خشک میل ہو، خاص کر بیچ میں، خناق جس میں کہ زخم سیاہی مائل ہو اور سانس میں بدل ہو۔

پانچا نہایت بدبو دار اور کمزور کرنیوالا، اسہال، پانچا سیاہ اور تپلا، پیش میں پانچا، یا تو بالکل خون یا آؤں ملا ہوا۔ پانچا کے قبل تو بیخ کا درد ہو اور درمیان اور بعد میں مروڑ ہو۔

پھیپھڑوں میں بغم کا انجماد اور تنگی نفس (ضیق النفس)، بستر پر اٹھ کر بیٹھنے سے آرام نہ ہو، بلکہ تازہ ہوا کی غرض سے کھڑکی کے قریب جانا پڑے۔ آلات تنفس میں اس حد تک کمزوری کہ جی بھر کے سانس نہ لے سکے، سینہ میں رکاوٹ، داہنے پھیپھڑے میں درد اور ایسا معلوم ہو کہ سینہ بھر میں دل ہی دل ہے۔

جوڑوں میں جکڑن، ایسا معلوم ہو کہ موچ آگتی ہے، ایسا معلوم ہو کہ ہاتھ لمبے ہو گئے ہیں، پنڈلیوں میں کھنچاؤ کا درد، عضو کمزور ہو جائیں اور کانپیں۔

جسم کو دن بھر سردی محسوس ہوتی ہے، سارے جسم میں دکھن ہو، سجادہ کی حالت میں تمام جسم گرم اور خشک، اس کے بعد پسینہ، بدبو دار مگر زیادہ نہ ہو، ٹائیفائیڈ سجادہ، اس کے ساتھ سرسامی غفلت ہو کہ سر کے ٹکڑے اور اصر بکرتے محسوس ہوں جن کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔

زیادتی :- حرکت سے ، مرطوب گرمی سے ، مکرہ کے اندر ، شور و فغاں سے ،
دائیں جانب جھکنے سے ۔

کسی :- آرام سے ، کھلی ہوا میں ۔

معاون :- فائٹولیکا ، سینگونیریا ، نیزا اور از خون میں اس کے بعد کورنٹ

بیا میس ، نائٹریک ایسڈ ، پائروجن اور شیریں بنتھنا مفید ہوتے ہیں ۔

مخالف :- ایس ، آرنیکا ، برائی ادنیا ، جلیسی میم ، ہائیوس پیاس ، کال

کارب ، یکے کس ، مرکوریس ، میوڈامک ایسڈ ، نائٹریک ایسڈ ،

نکس و امیکا ، اوپیم اور رساکس ۔

طاقت :- در ٹیکچر سے ۱۲ طاقت تک ۔

اس دوا کی چھوٹی طاقتیں ہی مفید و موثر ہوتی ہیں ۔ خصوصاً ٹائیفاؤڈ
میں ۳ طاقت سے اونچی طاقت استعمال کرنا نا حاصل ہے ۔

BRYONIA

برائیونیا

تخصوصی علامات

- ۱- گھٹیا دی یا بانی کے مزاج والے افراد جن کو صفر کے دوسے ہوتے رہتے ہوں
- ۲- درد ، جن میں زیادتی حرکت سے ، اندر سانس لینے سے ، کھانسنے سے اور کسی بالکل چپ چاپ پڑے رہنے سے اور دھو والی جانب
- یٹھنے سے ہوا ٹیٹلا ، پیسا ٹیٹلا

۲۔ بے حد خشکی تمام جسم کی بلغمی جھلیوں میں۔

۳۔ کھانسی خشک، سخت اور طویل۔

۵۔ پیاس شدید۔

۶۔ حیف کے دنوں میں شرمگاہ کی بجائے نکسیر کی صورت میں ناک سے خون

آئے (ناسفورس)

۷۔ غصہ سے پیدا شدہ تکالیف۔

۸۔ غصہ کے بعد جاڑا محسوس ہو۔

۹۔ شکایات و تکالیف موسم گرما میں سردی لگ جانے سے یا گرم ہوجانے سے

۱۰۔ تکلیف کا بڑھ جانا کسی حرکت سے اور سکون بالکل آرام سے چاہے

وہ داخلی ہو یا جسمانی۔

۱۱۔ بے حد پیاس، زیادہ مقدار میں پانی پینے لیکن لمبے وقفہ کے بعد۔

۱۲۔ درد سر کپڑوں کو اتتری کرنے سے یا ایسا ہی کوئی تیش والا کام کرنے

سے (سیپا)

۱۳۔ قبض آنتوں میں سستی اور کاہلی یا پانخانہ کی بالکل رغبت نہ ہو، پانخانہ

بڑا، سخت، سیاہ، خشک، جیسے جلا ہوا۔

۱۴۔ دست، موسم کی شدید گرمی سے۔

۱۵۔ پستان جھاری ہوں، پستانوں کو سہارا دینا پڑے (فائٹولیکا)

۱۶۔ کھانسی، ابلکائی اور تھے کے ساتھ (کالی کارب)

۱۷۔ کھانسی، گرم کرہ میں داخل ہونے پر۔

عام استعمال

امراض شش میں ایکنائٹ کے بعد اس کا درجہ ہے، کھانسی، ہوا کی مالیوں کی کھانسی، پلورمونیا، تپ محرقہ، پستانوں کے ورم، تپ مفصل، شقاق کاذب، ورم پردہ لمبے ویاغ، قبض، خون کی حیض کی بجائے نکسیر پھوٹنا، جیش نمونیا، ذات الجنب صادق، خسرہ، وجع المفاصل، انفلوئنزا، دمہ، سرخ بنجار، نوزہ باضمہ، نمرلی بنجاروں، سوزش باریلوں اور آنتوں کی سوزش وغیرہ میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بہت زیادہ غصیل ہوتا ہے، ہر بات پر غصہ آئے، سرسام کے باعث رات کو اپنے کام کا ج کے باسے میں بڑھتا ہے، بستر پر سے اٹھ کر بھاگنا چاہے، کسی چیز کی خواہش کرنا مگر جیب دی جائے تب نہ لینا، کوئی بھی تکلیف ہو، اس میں صبح کو بیدار ہونے کے کچھ دیر بعد اصرار دہر چلنے پھرنے پر زیادتی ہو جاتی ہے (نکس و امیکا، نیورم میور، پاڈوفالیم، نقد جا) سر چکراتے، منک، غش اٹھنے پر، سر میں بھاری پن، بیٹھنے سے اٹھنے پر چکر، مجبوراً پھر بیٹھ جائے، درد کی وجہ سے سر میٹا پٹے، درد حرکت سے بھگنے سے، آنکھیں کھولنے سے زیادہ ہوا، دہانے سے کم ہو، درد سر صبح کو چلنے سے چاڑتا ہوا اور کن پٹی سے لے کر گال کی ہڈی اور نیچے کے جبڑے تک، درد سر پیشانی سے لے کر گدی تک۔

آنکھوں کے پورے سوجے ہوئے (ایڈیٹا) دہانے آنکھ میں عموماً تکلیف

مہولی قاعدے کے خلاف برائٹو نیا میں گرمی سے آنکھ کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔
 نکسیر پہنا، بعض دفعہ حیض کی بجائے ناک سے خون جاری ہو۔
 چہرہ زرد یا سرخ، گرم اور سو جا ہوا۔

ہونٹ خشک، سوکھے ہوتے، چٹھے ہوتے، منہ، حلق اور زبان میں
 خشکی، منہ میں آبیے پڑتا، زبان پر سفید یا زرد میل، زبان کھرکھری چٹختی ہوتی،
 جھوری، سیاہی مائل، دانت کا درد، منہ میں گرم چیز لینے سے زیادہ ہوا
 (مکھڑے پانی سے آرام) (پسا ٹیلا) معلوم ہو
 کہ دانت لمبے ہو گئے ہیں۔

جھوک زیادہ، کئی مرتبہ کھانا کھاتے، ذائقہ معلوم ہو، تاک کھانا پینا
 کوزہ معلوم ہو، ذائقہ خراب، پانی زیادہ مقدار میں اور زیادہ دیر میں پیا جاتے
 کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد بعد اس کے فم معدہ میں اکوٹری کے پاس
 اور پھرتے ہو جاتے۔ حرکت کرنے سے درد زیادہ ہو، پت اور پانی کی
 تہ ہو، حوالی جگر میں درد، جلن، دم اور کھن۔ جگر میں کونچن جو کہ دبانے،
 کھانسنے، سانس لینے سے زیادہ ہو۔

قبض ہے، پانچاڑ خشک اور بہت سخت، موسم گرم یا میں اسہال
 آئیں۔

پیشاب سرخ، عبور اور کم مقدار میں، سفید اور نیچے بیٹھ جاتے۔ پیشاب
 کرتے وقت پیشاب کی نالی میں سوجن۔

عورتوں میں حیض جلد اور مقدار میں زیادہ، یا پھر حیض کا رک جانا،
 جس کے ساتھ شدید درد ہر ہو۔ عورت کے پستان پتھر کی مانند
 سخت ہوں۔

بلغم کے باعث سینہ میں گرد گڑا ہٹ، کھل ہوا میں کھانے پینے کے بعد کھانسی زیادہ ہوتے ہو جاتے (ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہو اور اسپرٹ ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہو) کا سٹیکیم، کیوریم، رات کو بستر پر کھانسی کی وجہ سے مجبوراً سیدھا کھڑا ہونا پڑے، رات کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑے، سینہ کو پکڑنا پڑے (نیٹروم سلف) کھانسی مع سینہ کی چھین کے، لیسڈار، سرخی مائل بلغم نکلے، سینہ کی کوچن کی وجہ سے جلد جلد گھبراہٹ کے ساتھ مشکل سے سانس ل جائے۔ ذرا سی جی حرکت سے زیادہ ہو، کھانتے وقت انسان اپنے سینہ کی بیچ کی ہڈی کو پکڑے، سینہ میں کوچن کی وجہ سے درد کے خوف سے سینہ کو پھیلا نہ سکے۔

کمر میں جکڑن درد سر کے ساتھ، شانوں کی دونوں ہڈیوں کے بیچوں بیچ صبن۔

ہاتھ اور پیروں پر چھپکار سرخی، وجع المفاصل والی سوجن، بازو کے اوپر کے حصے میں کوچن، پیر میں سوجن، گھٹنے میں درد اور جکڑن۔

بہار، لرزہ کے ساتھ، پیاس زیادہ مقدار میں ٹھنڈے پانی کے لئے خواہش اور اس سے آرام ملے، کھانسی خشک مع سینہ کی کوچن کے، لرزہ بعض اوقات صرف فاسنی جانب، بعض دفعہ ہونٹ، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے سرے پر سردی لگے، تپ مع پیاس اور کوچن کے۔ اعضاء میں درد حرکت سے زیادہ ہو، اندرونی گرمی گھبرا گئیں جلد دہی ہو اور ان میں خون مثل پگھلائے ہوئے سیسہ کے دوڑ رہے۔ گرمی سے زیادہ کھل ہوا سے آرام، بالکل خاموشی بلا حرکت کے پڑے رہنے کو

جی چاہے۔

پہونزد، جلد زرد، بیتقان، جوڑوں کا زہر باؤ۔

زیادتی :- حرکت سے، مشقت سے، چھوٹنے سے، گرمی سے، گرم

کھانا کھانے سے، لذت کو، اخراج کو بند ہوجانے سے۔

کسی :- لیٹنے سے، خاص کر درد والے پہلو کی طرف دبانے سے، آرام

سے، ٹنڈک سے، ٹنڈی چیزوں سے، دبانے سے، پسینہ سے۔

معاون :- الیومنا، رسٹاکس، کالی کارب اور نیٹیم میوید۔

مخالف :- کلکیریا۔

مصالح :- ایجونائٹ، الیومنا، کیفرا، اینیم ٹارٹ، چیلیٹو نیٹیم، کمیوید

کلیمیس، کانیا، انکیشیا، نکس و امیکا، میوراٹک ایسٹ، پلسٹیل

رسٹاکس۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک

BERBERIS VULGARIS

بربریس و لگرس

تخصوصی علامات

۱۔ گردوں کے مقام میں جلندار اور بھوٹے کا سادرد

۲۔ پتھر میں پتھری کے باعث درد

۳۔ بائیں گریں سے سونیاں چھیننے کے سے درد گریں کی نالی میں سے

ہوتے ہوتے مٹانے اور شانہ کی نالی تک جائیں (ٹوہیکم) دابنے گروس
میں (لائیکوپورڈیم)

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر گردوں اور شانہ کے عوارض میں مستعمل و مفید ہے
علاوہ بریں پتہ، جگر اور بلغمی جھٹی پر بھی اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔

عمومی علامات

حوالی گردہ میں چیمن اور پٹین، بزور دبانے سے درد زیادہ ہو، کیونکہ گردہ
کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ یہ چائے والادرد پیٹ میں ہو کر پیشاب کی
نالی میں ہوتا ہوا پیڑوں کے اندر شانہ تک آتا ہے۔ ایک خاص قسم کی جگر
چیمن، جھنجھنی گروس میں معلوم ہوتی ہے۔ پیشاب زرد اور گدلا اور بعض
اوقات سفید تلچھٹ نیچے بیٹھ جاتے جو کہ بعد میں سرخ ہو جاتے، مقدار
مہرز میں جلن، دکھن، پاخانہ کی بار بار حاجت معلوم ہو۔ یہ حالت اکثر
بواسیر میں ہوا کرتی ہے۔

بواسیر میں سلیشیا، سلفر، اگنیشیا، کلکیر یا اور کلکیر یا فاس کا مقابلہ
کرنا چاہیے۔

ایک خاص علامت بریں کی یہ ہے کہ جلد کے اوپر بلبلے اٹھتے معلوم
ہوتے ہیں۔ جگر سے بیکر گردہ تک پسلی کے نیچے نیچے درد ہوتا ہے
جس سے کہ پتھری کا احتمال ہوتا ہے۔
زیادتی:۔ حرکت سے، کھڑے ہونے سے

معادن :- گلابے گلابے لائیو پوٹیم کی ایک خوراک اس کے اثر کو تیز کر دیتی ہے ۔

مصلح :- بیلا ڈونا ، کمیولا ، کیمفر ۔

طاقت :- مدھنکچر سے ۳۰ طاقت تک ۔

BARYTA CARB

برہٹیا کارب

خصوصی علامات

- ۱۔ حافظہ کمزور ۔
- ۲۔ بچے جسمانی اور دماغی ہر طور سے کمزور ہوں ۔
- ۳۔ دیرینہ خنازیری مزاج خصوصاً جبکہ مریض فریب ہو ۔
- ۴۔ پوڑھے افراد کی تکالیف ۔
- ۵۔ خردوں خصوصاً گردن اور گلہریوں کے ورم اور سختی یا سینے کا آغانہ
- ۶۔ ایڑیوں میں متعفن پسینہ ، پاؤں کے پسینے کے رک جانے سے بعد ۔

عام استعمال

یہ دوا بچوں اور بوڑھوں کے لئے مخصوص ہے ۔ ایسے بچے جو اپنی اصل عمر سے بہت بڑے معلوم ہوں اور ایسا معلوم ہو کہ ان کی نشرو نما مکمل رہ گئی ہے یا پھر ایسے بوڑھے افراد جو کچھ زیادہ ہی

عمر رسیدہ معلوم ہوں اور تقابہت ، عقلت اور بے خبری کے عالم میں
پڑے رہتے ہوں ان کے لئے یہ دوا سود مند ہوتی ہے ۔

عمومی علامات

بچوں کے جسم لاغر ، چہرہ پر چھتریاں ، بونے دکھائی دیں ، حافظہ کمزور
ہو ، توجہ نہ دے سکیں اور احمق معلوم ہوں ، جلد کھینا یا چپنا نہ سکیں تو
یہ دوا کارگر ہوتی ہے ۔

غدرہوں کے عوارض جبکہ غدرہ بڑھے ہوئے اور متورم ہوں ، گردن اور
کنج ران کے غدرہ میں پیپ پٹنے کا اندیشہ ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے اور
لوڑھن کے باعث اگر کان میں بھی ورم ہو گیا ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے ۔
بوٹھے افراد استہائی پتھرورہ انتہائی پسند ہوں ، حافظہ کمزور ہو ، غافل پڑ
رہیں ، دماغ سے خون گرنے کے بعد فالج ہو جائے ، نبض کمزور ہو ، قوت
گویائی نہ آئی ہو گئی ہو ، خصیتیں سخت ہو گئے ہوں اور قوت مردی پیش از
وقت جاتی ہے تو یہ دوا نافع ہوتی ہے

زیادتی :- سوچنے ، نہانے سے ، درد والی کروشٹیشن سے
کسی : کھل ہوا میں چپنے سے

معاون : ڈاکامارا ، سلفر

مخالف : کلکیریا

مصلح :- اینٹی مونیم ٹارٹ ، بیلادونا ، کیمر ، ڈاکامارا ، مرکوریس ، زنگ
طاقت : ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر

خصوصی علامات

۱۔ دم کشی

عام استعمال

خاص طور پر دم کے لئے مستعمل و مفید ہے۔ علاوہ یہیں دق اور سل کی کھانسی اور سانس کی تنگی کے لئے بھی تافع ہے۔

عمومی علامات

دمہ کا عارضہ ہو، یا عام کھانسی سے دم گھٹتا ہو۔ دق یا سل کی کھانسی سے دم کشی کی کیفیت ہو یا سانس کی نالیوں کی اندر نئی جھلیوں کی سوزش سے ہونے والی کھانسی ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ خاص طور پر دم کے لئے یہ دوا اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ موٹے اور تندرست تنومند افراد پر اس دوا کا اثر نہایت واضح ہوتا ہے۔

طاقت :- اس دوا کی چھوٹی طاقتیں مثلاً مدہ ٹنکچر یا ۲x وغیرہ حملہ کے دوران اور اونچی طاقتیں مثلاً ۳ طاقت اس کے بعد مناسب وقفوں سے دینا ساقی

BORAX

بوریکس

خصوصی علامات

- ۱- قریب قریب تمام تکلیف میں نیچے کی جانب حرکت سے خوف ہو۔
- ۲- پریشانی زینہ اترتے وقت یا پہاڑی سے نیچے اترتے وقت۔
- ۳- بے حد اعصابی
- ۴- نوجوان مستورات میں ناک مسخ ہے۔
- ۵- منہ آنے کا عارضہ

عام استعمال

آنٹوں کی سوزش، منہ سے زیادہ لعاب کا اخراج، تسلی، تفس، قوی بلخ، اسہال، غشی، پیشاب میں البیومین کا اخراج، مہمانہ کے اندر انہیٹن اور مرگی ایسے امراض میں جن میں یہ دوا مفید پائی گئی ہے۔ خاص طور پر مذکورہ اندر دل جھین کی سوزش میں نافع ہے۔

عمومی علامات

منہ میں سفید آلیے ہوں، منہ میں بہت گرمی اور خشکی ہوتی ہے، دودھ پیتے وقت بچہ روتا ہے اور پستان کو چھوٹہ دیتا ہے، اسہال زبردی

مال اور آبی نیز آؤں ملے آتے ہوں۔

مستورات میں بانجھ پن ہو، فم لحم و اندام نہانی میں آبلے ہوں اور بگ چھلی ہوتی ہو، سیلان الرحم جس میں انڈے کی سفیدی کی مانند طوبت کا اخراج ہو، حیض وقت اور تکلیف سے آنا ہو۔

زیادتی :- بیچھ کی جانب حرکت کرنے سے، شومس سے، تمباکو نوشی

سے، موسم گرما میں، حیض کے بعد

کسی نہ دبانے سے، شام کو، ٹھنڈے موسم میں

مصلح :- کمیوٹلا، کانیا

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک

BELLADONNA

بیلادونا

تخصوصی علامات

- ۱۔ احساسات اور حرکات میں تیزی ہو۔
- ۲۔ درد عموماً چھوٹے چھوٹے دوروں کی صورت میں، جو چہرہ اور آنکھوں میں سرخی پیدا کریں۔
- ۳۔ خون کا زیادہ دہلان سر اور چہرہ کی طرف
- ۴۔ درد سروری، چہرہ پر سرخی، دماغ اور گردن کی شریانوں میں تپکن کے ساتھ (علی لوئس)

عام استعمال

متعدداً امراض میں کام آنے والی دوا ہے۔ دماغ اور اس کے پردوں کی سوزش، دماغی شرانگن کی سوزش خواہ کسی سبب سے ہو، نظامِ عصبی کے متور، تشنجی درد، نڈیائی درد، دیوانگی اور پاگل پن، مرگی اور بیوتنی بنجار، تشنج، سر کے عصبی درد، اجتماعِ خون، آنکھوں کی سوزش، خراشِ شانہ، شب کو پیشاب نکل جانا اور سوزش، سرخباد و موی، بنجار، پتنگ جن میں آکسیجن بکثرت خارج ہوتی ہو، ایکنائٹ اثر نہ کرتا ہو اور آرتھک کی ضرورت نہ ہو تو بیلا ڈونا کام آتا ہے، گرنے کی وجہ سے نظامِ عصبی کو چوٹ آجائے، دماغی بنجاروں، چیچک، تپ محرقہ اور پیوست کا بنجار، خراشِ حلق، ورم لوزین، رحم سے جریانِ خون، وجعِ المفاصل کھانسی، پھیپھڑوں کو پیپ ٹینے سے پہلے اچھا کرنے کے لئے، خجروہ کی سوزش، اختناقِ الرحم، غذا کی نالی کی سوزش، شدید درد گردہ سوزش پستان، رحم کا پستان، قولنج اور بچوں کے اسہال، سکتے دماغی وغیرہ میں متعلد و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض تندرستی کی حالت میں خوش مزاج اور زندہ دل ہوتے ہیں اور بیماری کے دوران نہایت غصیلے اور اکثر نڈیائی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔

کھاتے ، تو کتے ، مانے اور چیزوں کو ٹوٹے پھوٹے دینے کی رغبت
 ہنسی کے دوسے اور دانت سے ، تمار داروں کو کاٹنا اور مارتا
 چاہے (سٹرا مونیم) جاک جالے کی کوشش کرے (ہیلن بوس)
 توہات ، خیال کرے کہ وہ جن ، بھوت ، خوف ناک شکلیں اور
 مختلف کیڑے (سٹرا مونیم) سیاہ جانور ، کتے اور بیڑے وغیرہ دیکھتا
 سر میں جاری پن کے ساتھ پیشانی میں درد جو تھوڑی دیر تک کہ چھ
 اور زیادہ شدت سے آتے ، درد کے ساتھ ۳ بجے سے پہلے کو آنے
 والے اعصابی درد سر۔

آنکھوں کا آشوب ، آنکھیں نہایت سرخ ، سخت درد کے ساتھ۔
 آنکھوں میں جلن ، خشکی اور بعد میں خود بخود آنسو بہنا ، صبح کو
 چوڑے کیڑے سے بند ہو جاتیں۔

کانوں کے اندر اور باہر روم ، کوجن اور ہیرا پن ، مواد آنا
 صبح و شام نکسیر بہنا ، ناک کا سرخ ہو جانا۔

چہرہ تھمیا ہوا ، سرخ یا یا شکل زدہ ، اوپہ کا ہونٹ سوجا ہوا۔ نمٹ
 پردانہ لگنا ، اس پر پیڑی جم جائے سخت درد ہو۔

دانت میں درد ، جو کان سے دانت تک ہوتا ہو۔ منہ خشک
 بغیر ہیال کے ، مگر زبان تر ، زبان گرم ، کنا سے سرخ اور درمیان میں
 سفید ، حلق میں جلن ، غدد میں روم اور خشکی۔

کھانا بد ذائقہ محسوس ہو ، انٹریلیوں میں دکھن ، پیٹ میں ہرڈ
 کا درد ، ناف کے گرد درد ، گویا گولہ بن رہا ہے ، سیدھی بڑی آنت
 کا پھول جانا۔

پانچاں پیتل سبز آؤں اور ورد کے ساتھ، بعض اوقات آؤں اور خون والی پچیس، بعض اوقات زرد یا سفید کھڑیا کے مانند مع زیادہ پشیاں اور پسینہ۔

پشیاں کی حاجت زیادہ ہونا، مثلاً میں انہیٹن، پشیاں کم، بالکل بند، قطرہ قطرہ ہونا، خود بخود سوتے میں ہوجانا، زرد، صفات سرخ، تلخ، نیچے بیٹھ جائے۔

ورم فوطی، فوطی سخت اور اوپر کو چڑھے ہوتے، ورم خصیۃ الرحم سخت بوجھ، اعضائے تناسل کی طرف تو یا نکل پٹے گا، احتیام ہو جانا، شہوت نلارو، حیض جلد اور کثرت سے، اندام نہانی کی سرخی اور خشکی، سفید رنگ کی رطوبت مستورات کی اندام نہانی سے خارج ہو۔

نہجہ اور جوا کی نالی میں ورم، کھانسی کالی، سانس دقت سے آئے۔

شانہ کی بڑی اور بیڑھ کی بڑی کے درمیان جکڑن
بخار، لوزہ کے ساتھ، پیاس نہ ہو، لیٹنے سے چہرہ زرد و اور
اٹھنے پر سرخ۔ پاؤں برف کی مانند سرد، گرم نہ ہو سکیں۔ یا پھر بخار
سخت پیاس کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کی خواہش، پسینہ صرف
سر پہ۔

جلد چمک دار سرخ، نہر باد، جلد اتنی گرم کہ ہاتھ کو چلتی ہوئی
معلوم ہو۔

زیادتی: سہ پہر کو، تین چار بجے، چھوٹے سے حرکت سے

شور و غل سے، ہوا کے تیز جھونکے سے، چمکدار چیز کی طرف
دیکھنے سے، آدھی رات کو، پانی پینے سے، کپڑا اتارنے سے، گرمی
میں، لیٹنے سے، بستر کے لمس سے۔
کسھی :- آرام سے، سیدھے بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے، گرم
کمرہ میں۔

معاون :- کلکیریا اور ٹیوبیرکولوسیس اکثر شفا کی تکمیل کی راہ میں مدد
دیتے ہیں۔

مصلح :- کانیا، ہیرسلف، ہائیوسیامس، اوسیم، پلساٹیلہ
مخالف :- ڈرکامارہ

طاقت :- درمسن کچر سے ۳۰ تک نیز ۲۰۰ طاقت تک
متعمل ہے۔

PODOPHYLLUM

پادوفالیم

خصوصی علامات

- ۱۔ ہیضہ، درد شکم اور معدہ کی تکلیف کے بغیر
- ۲۔ بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں سرگرم ہو اور بچہ سر کو ادھر ادھر
گھماتا ہے۔ (بیلادونا)
- ۳۔ دست جو صبح سویرے ہوں۔

۴۔ بچوں کو دست آئیں جب ان کو نہلایا جا رہا ہو۔

۵۔ بچوں کو دست گندے پانی کے سے جو پوتھڑے کے آدے پائے ہو جائیں
(بزرگ ایڈ)

۶۔ پانخانہ، پانی کا سا اور متعفن۔

۷۔ رحم کا اپنی جگہ سے گرنا، بوجھ اٹھانے یا زور لگانے سے۔

۸۔ مریض مسلسل جگر کے مقام کو ہلانا اور ہاتھ سے ملتا ہے۔

۹۔ بخار کا دورہ، صبح صبح جاڑے اور گرمی کے دوران ہمید
باتونی پن کے ساتھ۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر جگر، امعاء، بارہ انگشتی آنت، صفراوی مزاجوں،
حاملہ عورتوں، دانت نکلنے والے بچوں، رحم کے عوارض اور مہیضہ پر ہوتا
ہے علاوہ برسی بوا سیر ہو، یرقان ہو، ویدیں چھولی ہوئی ہوں تو بھی یہ دوا
بہید نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہن طور پر مریض بہت مضطرب ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ موت
آنے والی ہے۔

سر چکراتا ہے، صبح کے وقت درد سر ہوتا ہے، چہرہ تمٹایا رہتا
ہے، دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ اپنا سر ادھر ادھر مارتا ہے، سر تکیہ
میں گھساٹے (ایپس، بیلا ڈونا) سر جھٹکاٹے کرتے تکیہ سے اٹھالے

(سٹرا موٹیم)

منہ سے رال بہے، سانس بدبودار، زبان پر سفید میل، ذائقہ گندہ، حلق میں درد، دانتوں کی جانب سے شروع ہوا (یہ لیکے سس کے برعکس ہے اور لائیکو پوٹیم کے مشابہ ہے)۔ دانت کو دانت کشکٹ سے اگلے میں بنغم کھڑکھڑائے۔

ڈکار کے ساتھ غذا منہ کو آئے، جھوک زیادہ مگر تھوڑا کھانا کھانے سے طبیعت بھیر جلتے اور اس کے بعد متلی، تپ اور پیاس ہو معده یا پیٹ میں جلن اور تپکن، کھٹی ڈکاریں آنا اور اس کے بعد تپ۔ پیٹ اور سیدھی آنت میں درد جو ۳ بجے صبح کے وقت ہو اس کے بعد دست آئے۔ ڈکاریں گرم اور خشک، جگر کے اطراف میں بوجھ اور درد۔

دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں میں اسہال، جگر کی خرابی کے ساتھ اسہال، مزمن اسہال جو صبح کو زیادہ ہوں۔ سبز پانی کا سا دھار کی طرح نکلنے والا اسہال، بعض دفعہ کھڑیا مٹی کی طرح نہایت بدبودار دست پیاس کے ساتھ تپ کم ابکائیاں زیادہ۔

بیمار لڑکے کے ساتھ پیاس کے بغیر، بہت باتیں کرے، مگر الفاظ بھول جائے یا پھر بیمار پیاس کے ساتھ، شدید درد سر، پسینہ کی کثرت، پسینہ میں نیند آئے، بیمار کی شدت میں مریض بے ہوشی کی نیند سو جائے۔ زیادتی بہ علی الصبح، گرمی کے موسم میں، دانت نکلنے کے زمانہ میں کسھی بہ شام کے وقت، بیرونی گرمی سے، دباؤ سے۔
معاون: سلفر، ایکسک، ہیکس و امیکا اور کلکیریا۔

مصلح :- کالوسنتو، لیکک ایڈ، لینڈیا، نکس و امیکا۔
 طاقت :- در شکر سے ۶ طاقت تک بچوں کے دستوں میں ۲۰۰
 اور ۱۰۰۰ بہترین ثابت ہوتی ہے۔

PETROLEUM

پٹرولیم

تخصوصی علامات

- ۱۔ مریض دوران نیند خیال کرے کہ کوئی دوسرا آدمی اسی کے بستر
 میں اس کے ساتھ لیٹا ہے (ویلیریانہ)۔
- ۲۔ چکر خاص کر گدی میں۔
- ۳۔ چکر سبھی سفر میں ہونے والے چکر جیسا۔
- ۴۔ درد سر گدی میں سبب جیسے بھاری پن کے ساتھ۔
- ۵۔ درد شکم، جب معدہ خالی ہو، سکون ہو مسلسل کھانے سے
 (اناکارڈیم، پیلیڈونیم، سپیا)
- ۶۔ دست، ہمیشہ دن کے وقت۔
- ۷۔ ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں کھردری، ہر موسم سرما میں۔

عام استعمال

یہ دوا ایگزینیا اور مچھیسوں میں کام آتی ہے، خاص کر کانوں، ایشیت

سر اور ہاتھوں پر یہ پھینسیاں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ مقام ماؤف پھیل کر کچا اور آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے گاڑھا لیس دار مواد نکلتا ہے۔ شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ علاوہ بریں بالوں کی جڑیں سوچ جاتیں اور متورم ہو کر سخت ہو جاتیں، سمندری سفر کی باریک ایام حمل کی مستی اور تھے، بغل اور پاؤں کے بدبودار پسینہ میں بھی مستحق اور نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چلنے میں راستہ بھول جاتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ بستر میں کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ یا یہ کہ موت قریب ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصا آتا ہے۔ سر میں ٹھنڈی ہوا بری معلوم ہوتی ہے، گدی ایسی بھاری ہو جیسے سیہ، اٹھنے پر ایسا جھکے آئے جیسا کہ جہانہ پر چڑھنے سے ہوتا ہے، چاند پر تہ دلانے جو کہ کان پر اور اس کے چھپے زیادہ ہوں۔ آنکھوں کی علیگیں گرہ پڑی ہوں، نگاہ دھندلی، نپتونوں میں زخم، نتھنے چٹخنے ہوئے اور حلبیں، ناک کی ٹوک پر کھلبلی، ناک سے مواد نکلے۔

پاخانہ جانے کے فوراً بعد مہوگ لگے، معدہ خالی ہونے پر پیٹ میں درد ہو، اور کھانے سے آرام ہو، اسہال جو کہ صرف دن میں زیادہ ہوں۔ بند گو بھی کھانے سے اسہال ہوں۔

ہمیشہ جاٹے کے موسم میں انگلیوں کے سرے کھڑے اور چٹخنے ہوتے ہوں، جلد خشک اور بہت کھردری، موٹی سبز پٹری جس میں

جلن، کھجلی اور سرخی ہو۔

اس دور کے جلد کے علامات گریفا ٹیسس سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ پٹرولیم کی بیماریاں عموماً جاڑے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات کسی دوسری دوا میں نہیں ہوتی۔ جاڑے کے موسم میں لہو کی کھال ادھرنے کے لئے یا لوانی کے لئے پٹرولیم نہایت مفید ہے۔ زیادتی :- نمی سے قبل، طوفان کے درمیان، گاڑی پر چڑھنے سے جاڑے کے موسم میں۔

کسبھی :- گرم ہوا سے۔

معاون :- سپیا۔

مصلح :- نکس و امیکا۔

طاقت :- عموماً ۲۰ طاقت متعل ہے۔ البتہ پرانی تکالیف میں ۲۰۰ طاقت بھی استعمال ہوتی ہے۔

PLATINA

پلاٹینا

خصوصی علامات

- ۱- اعضاء تناسل حد سے زیادہ ذکی الحس، اعضاء پرہ کیڑے کا چھونا بھی برداشت نہ ہو۔
- ۲- جنسی نشوونما حد سے زیادہ۔

۳۔ حیض سیاہ لوتھڑے دار ہو۔

۴۔ قبض جس میں پانچ تا چھپن مٹی کی طرح مبرزا اور مقعد سے چپک جائے
(الیونما)

عام استعمال

رہی نساد سے پیدا ہونے والے ذہنی اختلال نیز مروانہ اور زمانہ
جنسی اعضاء کی بڑھی ہوئی حس سے پیدا شدہ عوارض میں یہ دوا عام طور پر
استعمال ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بے حد مغرور ہوتا ہے۔ ہر چیز اور ہر شخص کو
اپنے مقابلہ میں ناچیز اور حقیر سمجھے، چیزیں معمولی قدر سے چھوٹی نظر آتی
(غزور کی علامت لائیکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے) چیزیں زیادہ قدرتی
معلوم ہوں، سمجھوت پریت وغیرہ کا وہم، مکان کے اندر جانے پر عورت
کو چیزیں عجیب طرح کی معلوم ہوں، مریضہ کبھی بہت ٹھگین اور بعض
وقت سننے اور چہنچے۔

حیض جلد، بکثرت خون ٹوٹے کا سا، لوتھڑے اور اس کے ساتھ درد
اور رجم پر بوجھ معلوم ہو۔ کدو کس میں بھی سیاہ خون کے لوتھڑے اسقاط
حاصل کی وجہ سے یا بلا اسقاطِ حمل کے نکلتے ہی۔ لیکن اس میں ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ پیٹ میں کچھ چلتا ہے یا سچہ پھیر کتاب ہے، کمیو ملا میں سیاہ لوتھڑے
بکثرت نکلتے ہیں لیکن اس کے دائمی علامات مختلف ہوتے ہیں۔

مردوں میں سن بلوغت سے قبل جلق لگانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً لٹھکوں کی آنکھوں میں بزدلی کی جھلک ہو، آنکھیں دھنسی ہوتی اور زرد ہوں، عضو کھینچے ہوئے اور سستے ہوئے ہوں۔ پلائینا میں سخت قبض، ایسا ہوتا ہے کہ یا تو پاخانہ ہوتا ہی نہیں یا پھیر چینی مٹی کی طرح مبرز سے چھٹنے والا پاخانہ ہوتا ہے۔

یہ دوا درم رحم میں بھی کار آمد ہے۔

زیادتی :- بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، شام کے وقت۔ کبھی :- چلنے سے۔

معاون :- سیلیٹیم۔

مصلح :- بیلا ڈونا، پلسا ٹیلا، کالیپیکم

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک استعمال ہوتی ہے۔

PULSATILLA

پلسا ٹیلا

خصوصی علامات

- ۱- مریضہ میں روینے کا بہت زیادہ میلان۔
- ۲- مستورات میں فریبی کا میلان، مقدار میں کم اور زیادہ دن تک رہنے والے حیض کے ساتھ (گمر نیفاٹیس)
- ۳- تمام بلغمی حملیوں سے رطوبتیں گارھی، ملائم اور زردی مائل سبز۔

(کالی سلف، نیٹرم سلف)

- ۴۔ علامات ہمیشہ تبدیل ہوتی رہیں، ایک ہی جیسے حالات میں۔
- ۵۔ درد جو جلد جلد مقام تبدیل کریں یعنی ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں پہنچ جائیں (کالی بائیکریم، لیک کینٹنم، مینگنم ایسیٹ)
- ۶۔ قریب قریب ہر تکلیف میں پائس نادر۔
- ۷۔ دست صرف یا عموماً رات کے وقت، جن کی کیفیت میں رد و بدل ہوتا ہے۔

- ۸۔ حیض بہت دیر میں، کبھی رک جائے، کبھی بہنے لگے۔
- ۹۔ خون حیض دن کے وقت زیادہ ہے۔
- ۱۰۔ گولہ نمبیاں، مرغن گوشت یا غذاؤں کے استعمال سے ہوں۔

عام استعمال

عورتوں کے عوارض خاص کر حیض کی بےقاعدگیوں میں یہ دوا بہت زیادہ مستعمل ہے، بچوں کے مرض خسرہ کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ علاوہ بریں دیگر متعدد امراض میں حسب علامات مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض روحینے کی طرف مائل رہتا ہے، مایوسی اور چڑچڑاہٹ میں مریض میں پایا جاتا ہے۔

سر میں چکر خاص کر تھکنے سے، آنکھ اور پاٹھانے سے، کھانے

کے بعد یا بیٹھنے اٹھنے پر، آدھے سر کا درد، ایسا درد سر جس کو دبانے سے آرام ہو۔

آنکھوں کے پوٹے سوچے ہوتے، ان سے پانی بہے۔

کانوں میں کھجلی، سخت درد، ہیرا پن، مواد بہنا (اس کے لئے عجیب دوا ہے) کانوں میں مکھیوں کی مٹھنا ہٹ۔

ناک سے نکسیر بہنا، خشک ناک، سبز یا بدبو دار رطوبت نکلے۔

زبان پر لیس دار بغم اور سفید میل کی تہ جھی ہوئی۔ ندرتہ حلق کی جڑ میں جھی ہوئی (مرکبوریس) دانت کا درد جو ہر یاد کھانے سے زیادہ ہوا خاص کر کوئی گرم چیز منہ میں ڈالنے پر، ٹھنڈے پانی سے افاتہ ہو۔

زیادہ ثقیل اور مرغن چیزیں کھانے سے معدہ اور پیٹ کی خرابیاں ناف کے قریب شنجی درد۔ پاخانہ یا تو کثیف کم مقدار میں آئے یا پستلا دست، رات کو آؤں اور خون پیمچش میں، سبز آؤں کے دست رات کو۔ بادی بولاسیر کھجلی، درد اور دکھن کے ساتھ۔

پیشاب کرنے میں تکلیف (کنیتھرکس)۔ مثانہ پر بوجھ، خود سنجہ و قطرہ قطرہ پیشاب رات کو کھانسنے میں زور کرنے پر ہو جائے۔ پیشاب بعض دفعہ صاف اور بکثرت اور بعض دفعہ کم اور سرخ، اس کے نیچے سرخ رنگ کا تھچٹ بیٹھ جائے۔

حشہ کے ادھکی کھال میں اور فوطہ میں کھجلی، فوطے سوچے ہوئے اور لگے ہوئے ہوں اور درد کریں، تناؤ کے ساتھ پیشاب کی نالی سے مواد نکلے اور پیشاب کرنے میں جلبن ہو۔ خواہش جماع زیادہ ہو۔ نسیق و فوطہ میں پانی آنا اور سوزا کی آد کالٹس (فوطہ کا درم) (رڈو و نیٹرون کھیمٹس)۔

سپانجیا، آرم، بیلارڈونا) پیشاب میں خون آئے۔

حیض و دیگر کو مشکل سے کم مقدار میں یا بالکل غائب اور پروں میں اینڈجن (کوئیم، ڈسکارا، ناسفورس، سلفر) بہت جلد اور بہت کم مقدار میں (کوئیم) نیٹرم میوڈ، ناسفورس، سلیشیا، بہت جلد اور بہت زیادہ مقدار میں (کاسٹیکم، آئیوڈیم) حیض کارک جانا ٹنڈرکے۔ رحم سے بجائے حیض کے سفید پانی جاری ہو، بے قاعدہ ہو، کبھی ٹھیک وقت پر نہ ہو، خون کے سیاہ لوتھڑے بدبودار نکلیں۔ حیض کا درد نہایت تیز، سیلان الرحم گاڑی رطوبت مثل بالائی کے یا سفید گاڑھی رطوبت۔

حلق میں خشکی اور خراش، خشک کھانسی، خصوصاً رات کی وقت۔ لہزہ کے ساتھ سنجار کبھی پیاس کے ساتھ اور کبھی پیاس کے بغیر پسینہ صرف ایک جانب بائیں طرف یا دائیں طرف۔ چہرہ کا پسینہ رات کو زیادہ ہوتا ہے اور صبح جاگنے پر بند ہو جاتا ہے۔

خسرہ (چھوٹی چیچک) اور اس کے باعث دوسری نکالیف نہ رہا ہو زیادتی :- گرم بند کمرے میں، شام کو بائیں طرف، جدھر درد نہ ہو، دیرینہ مرغن اغدیہ سے، حرکت کے آغاز پر، گرمی سے اور گرم چیزیں لگانے سے۔

کسہی :- کھل ہوا میں، درد کے عضو کی طرف لیٹنے سے، ٹنڈرکے کمرے میں، ٹنڈی چیز کھانے سے، ٹنڈی چیز لگانے سے۔
معاون :- کالی میوڈ، لائیکوپوڈیم، سلیشیا، سلفیورک ایڈ کالی بائیکرام، سپیا۔

مصلح :- کیموٹا، کانیا، اگنیشیا، نکس و امیکا، سیٹنم۔

طاقت :- عموماً ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے ۔ البتہ
جب ضرورت ۲۰۰ طاقت اور اس سے اونچی طاقتیں بھی استعمال
ہوتی ہیں ۔

PLUMBUM METALLICUM

پلمبم مٹیلکیم

خصوصی علامات

- ۱۔ بے حد اور بہت تیزی سے لاغری ۔
- ۲۔ چہرہ پیلا ، رنگ فق ، راکھ کے رنگ کا ، مردہ کا سا ، رخسار اندر
دھنسے ہوئے ۔
- ۳۔ مسوڑوں کے کناروں کے ساتھ نمایاں نیلی لکیر ۔
- ۴۔ شکم میں شدید درد جو جسم کے تمام حصوں میں جاتے ۔
- ۵۔ شدید درد تو بخ ، احساس جیسے کہ شکم کی دیواریں ایک دوسری سے
دیرھلکی ہڈی کے ساتھ کھینچ دی گئی ہیں ۔
- ۶۔ قبض ، پاخانہ سخت ، بڑا سیاہ ، بگری کی منیگنی کی طرح
(چلیڈونیم)
- ۷۔ متعدد میں تشخیصی درد ۔

عام استعمال

الحاقی ریشہ جات کے اندر دل اور ام، تونج، اطراف شکم اور آنتوں میں سخت کھپاؤٹ ہو اور سخت قبض ہو، مریض کو ہر شے میٹھی معلوم ہو، مزمن و دم گردہ، خصیوں میں تناؤ، ضعفِ باہ، عورتوں میں پستانوں کا دم ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض نکل ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ خاموشی والا مایوسگیا، ہر بات دیر میں سمجھے، حافظہ کمزور، توہماتِ داخلی کاموں سے نفرت، کبھی سر میں درد ہو اور کبھی پیٹ میں، ایسا محسوس ہو کہ ایک گولا گلے سے اٹھ کر داغ کی طرف جاتا ہے۔ آنکھیں زرد، تیلیاں سکڑی ہوئی۔

مسوڑھے سوچے ہوئے درد، مسوڑوں کے کناروں پر نیلی لکیر ہو زبان کے کناروں پر سرخی اور زبان کانپتی ہو۔

پیٹ، بڑھ صفاق اور معدہ میں سکڑن، پیٹ میں درد، جو کہ نام جسم میں پھیلے۔ ایسا معلوم ہو کہ معدہ کی دیوار سے لے کر بڑھ تک ایک دسی لگی ہوئی ہے، ایک آنت کا حصہ کسی دوسری آنت میں چلا جائے۔ ریاح رک جانے سے سخت درد ہو۔

قبض، پاخانہ سخت، مبرز میں اینٹیٹن ہو، مقعد میں اینٹیٹن، ایسا معلوم ہو کہ مقعد کا وارٹ کی وجہ سے اوپر کو کھینچتی ہے۔

پیشاب بار بار جس میں البیومین ہو، پیشاب کا وزن مخصوص کم ہو مرن
 ورم گردہ، پیشاب تبدیل المقدر۔

مردوں میں ضعف باہ، فوطے اوپر کو کھینچے ہوتے، مستورات میں
 فرج کا سخت درد اور پستانوں میں ورم، سینہ میں کونچن اور جلن متواتر
 احتیاطِ حمل۔

کسی ایک عضو کا فالج، عضلات میں درد، پیروں کی سوجن۔
 زیادتی :- رات کے وقت اور حرکت کرنے سے۔
 کمی :- نلنے سے، دباؤ ڈالنے سے اور جسمانی مشقت سے۔
 مصلح :- پلانٹینیم، ایلم، پیٹرولیم۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

THUJA

تھوجا

تھوجا کی خصوصی علامات

- ۱- چکر، جب مریض آنکھیں بند کرے (مخترین، ایسے کسے)
- ۲- آنکھوں کے پوپٹوں پر بڑے بڑے دانے مسوں یا آبلوں کی
 طرح۔
- ۳- تبص، پاخانہ تھوجا سا باہر نکل کر پھرانڈ کو چلا جائے (سینی کولا
 سلیشیا)

۳۔ بوایری متے متورم ، درد شدید جب بیٹھا ہو ۔

۵۔ دست اگر گراہٹ کی آواز کے ساتھ جیسے مشک سے پانی خارج ہو

۶۔ دہا سے بڑے بیج کے سے جلد سے اٹھے ہوتے (شان سیکریا)

۷۔ پیشاب کے اختتام پر شدید گھٹن (سارسا پیلٹا)

۸۔ سینہ صحت ان حصص پر جو ڈھانپے نہ ہوں ، یا تمام جسم پر سوائے

سر کے (بریکس سلیشیا) جب سوتا ہو پینہ آئے اور جاگنے پر رک

جاتے (بریکس سمبوکس)

۹۔ احساس جیسے جسم خصوصاً اعضاء شیشہ کے بنے ہیں اور جلد ٹوٹ

جاتی ہے ۔

۱۰۔ دبا ہوا سوزاک جس کے باعث گھٹیا وجع النفاصل ہو ۔

عام استعمال

یہ سوزاک اور چھپک کی خاص دوا ہے ، پرانے اور بے ہوشے سوزاک

اور اس کے اثرات کے لئے عام طور پر مستعمل ہے ۔ علامہ بریں یہ دوا جلد

خون ، معدہ ، آنتوں ، گردوں اور دماغ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت

رکھتی ہے ، اس کا خاص اثر جلد ، آلات بول اور بالخصوص پیشاب کی

نال پر ہوتا ہے ، جلد یا جھلیوں پر مستوں کا پیدا ہونا بھی اس دوا کا

مقتضی ہوتا ہے ۔ اس دوا کا مریض چاندنی میں بے چین ہو جاتا ہے ۔

بیشتر علامات دائیں طرف ہوتی ہیں ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض یا کسی اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے، خیالات میں یکسوئی کا فقدان ہوتا ہے، بات چیت کے وقت مشکل الفاظ سوج پاتا ہے۔

سر میں اٹھ کر کھڑے ہونے پر چکر محسوس ہوتا ہے، داغ کا فالج صبح کے وقت درد سر، عادی پن صبح کو خاص کر جاگنے کے بعد، سر میں ایسا درد جیسے کسی نے کیل ٹھونک دی ہو (اگنیتیا، اناکارڈیم، آنکھوں میں بوجھ اور صلبن، نگاہ دھندلی اور کمزور، کان میں سخت کوئین اور جبین اور دھکنے والا درد، خشک زکام، ناک میں پیٹریاں، چہرہ پر گرمی محسوس ہو، ہونٹوں میں اینٹیٹن، گال کی بڈیوں میں ایسا معلوم ہو کہ کوئی کھریچ کر سوراخ کر رہا ہے۔

منہ آجانا، نگہ روی بدل ہے، آواز آہستہ آہستہ نکلے، کھانا کھانے جوئے حلق میں خراش، ذائقہ بیٹھا، حرفت کو یا صبح کو پاس ہو۔ کھانا کھانے کے بعد غذا منہ کو آئے، پیٹ میں اینٹیٹن، کمر میں بوجھ، نفع، ان کی گھٹیوں میں درم۔

قبض جو کئی دن تک قائم رہے، پاخانہ ذقت سے ہو۔ سخت لمبا ستہ، خون میں لپٹا ہوا، مبرز سگری جاتے اور درد کرے۔

پیشاب کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ ابھی کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں بہ رہا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں صلبن۔ مردوں میں عضو تناسل چھوٹا، سوزاگت، سپادی اور حشفہ پر مہتہ،

استادگی دیدہ میں ہو، احتلام ہو۔

مستورات میں حیض قلیل، رحم کے سوراخ پر مہر ہو، سیلان الرحم۔
کھانسی میں زرد بلغم نکلے، سینہ میں جھنجھٹا ہٹ اور درد، کوئی سرد
چیز پینے کے بعد بہت شدید دھڑکن جو کہ باہر سناؤں ہے۔

پہیٹھ میں زہریلا چھوڑا، سردی کے ایام میں صبح کے وقت انگلیوں
میں درم اور درد ہو جائے، انگلیوں کے سروں میں سوجن۔

جلد پر پتے۔ یہ دو خصوصاً ملائم اور ریشہ دار کھڑے ہوتے
شکل گو بھی کے پھول کے متوں میں مستعمل ہے۔

زیادتی :- رات کو بستر کی گرمی سے، تین بجے صبح اور ۳
بجے سردی ہو، سرد اور مرطوب ہوا سے اور نشہ آور چیزوں سے،
کسبھی :- ہاتھس کرنے سے، کھلانے سے۔

معاون :- آرسینکیم البوم، میڈورینیم، نیریم سلف، اسبائنا، سلیشیا۔
مصلح :- کیفیر، کمیوٹا، کوکوس، کالیکیم، مرکبوریس، نکس و امیکا،
پٹاسیلا، سلفر، سٹانی سیکیا۔

طاقت :- ڈرائسنگر سے ۳ طاقت تک نیز ۲۰۰ طاقت اور اوپر

TUBERCULINUM

ٹوبرکولینم

خصوصی علامات

- ۱- جب خاندان میں وقتی کہ ہسٹری ہو اور کسی مرض میں بہترین منتخب دوا سکون دینے یا مکمل طور پر شفا دینے سے قاصر ہے۔
- ۲- علامات ہمیشہ تبدیل ہوتی رہیں (پسا ٹیلا)
- ۳- زکام بہت جلد جلد حاصل کرے بغیر جانے بوجھے اس امر کے کہ کہاں اور کس طرح سے ہوا۔
- ۴- لاغری جلد جلد اور نمایاں طور پر آئے۔
- ۵- چھوٹے چھوٹے پھوٹوں کی فصلیں جن سے سبز اور شفقن مواد خارج ہوا سیکل کارا

عام استعمال

مرض سل کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت زیادہ مستعمل و مفید ہے نیز ایسے افراد کے لئے سوزوں ہوتی ہے جو کہ لمبے اور لمبے ہوں، جن کی چھاتی چینی اور تنگ ہو، جن کے خاندان میں سل کا مادہ موجود ہو۔ علاوہ بری مرگی اور عصبی ضعف میں بھی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض تشک مزاج ہوتا ہے خصوصاً جاگنے پر، لپٹ بہت کتوں اور جانوروں سے خوف زدہ ہو، بد زبان ہو، بہت قسمیں کھائے۔
سر میں گہاورد خصوصاً عصبی نوعیت کا، سرسام۔
کان کے پردہ میں سوراخ ہو، کان متواتر تپتا ہے۔
معدہ مہو کے مائے ڈوبتا محسوس ہو، گوشت سے نفرت، ٹھنڈے دودھ کی رغبت۔

علی الصبح یکا یک دست آتے (سلفز) یا پاخانے بزرگ سیاہ، براؤن بدبودار اور بہت زور کے ساتھ خارج ہوں، سہل بطنی ہو۔
پستانوں میں رسولیاں، حیض کثیر مقدار میں وقت سے پہلے آتے اور دیر تک آتا ہے۔ یا پھر عسر و سکن ہو، خون حیض کے جاری ہونے کے ساتھ وردی تیز ہو جائیں۔

سخت خشک کھانسی نیند کے دوران ہوتی ہو، موٹی بغم باسانی حاج ہو، سانس چھوٹا ہو، تازہ ہوا کی بہتات کے باوجود دم گستا ہو، ٹھنڈی ہوا کی خواہش ہو۔

گروں اور حرام مغز کا شپلا حصہ تنا ہوا، کندھوں کے درمیانی تمام میں یا گھر کے اوپر کے حصہ میں ٹھنڈک ہو۔

جلد جسم پر پانی پھنسیاں، خارش شدید ہو، وھر ہو، نیز خسرہ اور حنظل میں بھی مستعمل ہے۔

زیادتی، حرکت کرنے سے، رگ زنگ سے، ظفران سے پیلے

کڑے مٹنے سے اترتی ہے، ہوا کے جھونکے سے، علی الصبح اور

نیند کے بعد۔

کھلی ہوا میں۔

معاون :- کلکیریا، کلکیریا آئیرو ڈائیڈ، کلکیریا ٹاکس، ہائیڈروکسیٹیکس، ٹاکس

پیسٹیل، فوجا۔

مصلح :- ٹیکس و امیکا

طاقت :- ۲۰۰ سے بہت اور پتھک

TABACUM

ٹوبیکم

خصوصی علامات

۱۔ جسم کی جلد پر ٹنڈا پسینہ۔

۲۔ چکر جسم کے ساتھ مردہ کا سا پیلان ہو۔

۳۔ چکر آنکھیں کھولنے پر۔

۴۔ تپ، شدید ٹنڈے پسینے کے ساتھ، جوں ہی حرکت کرنا شروع کرے۔

۵۔ بھری تپ جس میں کہ جہاز کے بالکل بالائی سمت پر یعنی کھلی، تازہ اور

ٹنڈی ہوا میں ہو۔

۶۔ نم معدہ میں کمزور، کلیجہ ڈوبنے کا شدید احساس۔

۷۔ بچہ اپنا پیٹ تنگ رکھنا چاہے۔

۸۔ دست، مثل، تے، کمزوری اور ٹھنڈے پسینے کے ساتھ۔

عام استعمال

یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جبکہ ابلیسیاں غضب کی آتی ہوں اور تے بھی ساتھ ہو، جسم سرد اور پسینے آتے ہوں، نبض رک رک کر چلتی ہو، دل کے مقام میں تکلیف محسوس ہوتی ہو۔

سندری سترکی بیماری (چکڑ، مثل اور تے) میں بھی یہ دوا مستعمل و

منید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض اپنے کو بد قسمت تصور کرتا ہے، مایوسی، نسیان، طبیعت میں قناعت نہ ہو، آنکھیں کھولنے میں چکڑ معلوم ہو، صبح کو درد سر سخت مثل، یکایک درد سر جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں۔

نظر و عندلی ہو، مورتیا بند، چہرہ زرد، نیلیوں، چہرہ پر سرد پسینہ، حلق اور ناک کے درمیان راستہ میں دم، صبح کو کھانسی ہو، لیکر دینے والوں کی کھانسی۔

متواتر مثلی ہو، تمباکو کی بور سے زیادہ ہو، خفیف حرکت کرنے پر بھی تے ہو جائے۔ حمل کے زمانہ میں مثل اور تے، تھوک بہت آئے، کوڑھی کے پاں ایسا معلوم ہو کہ دھسا جاتا ہے۔ دل کے قریب درد رابطہ کر بائیں بازو تک آئے۔ پیڑو ٹھنڈا، پیڑو کو ڈھک نہ سکے، کیونکہ کھلا رکھنے سے مثل اور تے میں کمی ہوتی ہے۔

قبض، مقعد مفلوج، خروچ مقعد، یکایک تنہا اسہال، ہشمل اور تھک
 ٹھنڈا پسینہ، درد گردہ، پیشاب کی اس نالی میں درد جو گردہ سے باہر
 طرف آتا ہے۔

ہائیں کرڈٹ لینے سے دھڑکن، نبض بے قاعدہ اور کمزور، سانس لینے
 میں تکلیف، کھانسی ٹھٹھک، تکلیف وہ گھونٹ بھریانی پینے کی ضرورت
 ہو سانس کی تکلیف اس کے ساتھ باہیں کرڈٹ لیٹنے میں بائیں بازو میں
 جھنجھٹا ہٹ ہو۔

ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد، اعضاء میں لغزش، سکتے کے بعد
 فالج، دل پھیل جانے کی وجہ سے نیند نہ آئے، سرد اور چیچھا پسینہ اور
 گھبراہٹ۔

زیادتی، آنکھیں کھولنے سے، شام کے وقت، انتہائی گرمی اور سردی سے
 کتھی، کپڑا اتار ڈالنے سے، کھل تازہ ہوا میں
 مخالف:- آگنیشیا

مصلح:- آر سیگم البوم، آگنیشیا، سیپیا، لائیگو پوڈیم، بکس و امریکا،
 کھاڈیم، پلانٹیگو، فانسورس، جلیس میم، اسپیک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ بے چینی، کسی بھی وضع میں آرام سے نہ رہ سکے۔
- ۲۔ چلنے پھرنے کی بہت رغبت لیکن اس سے تکلیفات بڑھ جائیں،
(بریکس رشاکس، روٹا)
- ۳۔ ڈنبل، جس میں ماؤفہ حصص نیلگوں رنگ کے ہوں (لیکے کس)، اور
شدید جلندار درد (انسٹراکسین، آریٹیکیم البم)
- ۴۔ بسہری کا درد نزع کی سہی کیفیت طاری کرے۔
- ۵۔ درد سہر جس میں زیادتی شوہ سے، چھوٹے سے اور تیز روشنی
سے ہو۔

عام استعمال

یہ دوا استہتی امراض میں کام آتی ہے جبکہ تقاضت شدید ہو، متاثرہ
مقات کارنگ ارغوانی ہو اور ان میں جلن و جھنک مارنے کا سادرد ہو۔
کارنگبل میں بھی یہ دوا سود مند ہوتی ہے جبکہ ماؤفہ مقامات ارغوانی رنگ
کے ہوں، ان میں سڑاند پیدا ہوگئی ہو اور جلن وار ڈنبل مارنے کا سادرد ہو۔
موت کے آخری لمحوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے یہ دوا بہت

خفاق وہائی کی یہ ایک اعلیٰ دوا ہے۔ آلات تناسل کے آس پاس کھانے کے لئے بھی نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریضیں بیدار اعضاء کی طبیعت والا ہوتا ہے، بھید و کھٹکھٹاؤں فراسی تکلیف سے غصہ آجاتے، جس کے بعد بے حد ٹھگنی ہو۔

درد سر، شدید، جیسے دماغ میں لاکھوں سوئیاں چھبوتی جا رہی ہوں یا عصبی درد سر جس میں زیادتی شور سے، چھونے سے اور تیز روشنی سے ہو اور کئی سہلانے سے اور سر کو تکیہ پر رکھنے سے۔

دیڑھ کے ستون کو ذرا سا چھو دینے سے سینہ اور قلب کے مقام پر اینٹھن والے درد۔

صفاوی تکلیف جن کے ساتھ تمام جسم یا دہنا بازو اور بائیں ٹانگ ماؤٹ ہوا بائیں بازو اور دایہنی ٹانگ میں یہ علامت الگ الگ کی ہے، مسلسل حرکات ٹانگوں کی، بازوؤں کی، اوپری حصہ جسم کی، کسی بھی کام کے کرنے کی نا اہلیت کے ساتھ جھٹکے اور عضلات میں اینٹھن ہر حیض پر حلق، منہ اور زبان پر بے حد خشکی خصوصاً جب مریض سوئی ہوئی ہو (مخس موسکاٹا)

شہدہ سخریک دیوانی کی حد تک، رحم میں درد، فرج پر ناقابل بیان خارش۔

ذہلی، پھوٹے، بسہریاں
فاسد زخم، سرطان، کلائیبل، فاسد پھوٹے۔

زیادہ تر علامات نوجوبی ہوں۔

زیادتی :- حرکت سے، چھوٹنے سے، ماؤذ حصہ کو کسی کے ساتھ لگنے سے، شعد سے، موسم کی تبدیلی سے۔
 کسی :- کھل ہوا میں، گانے سے، ماؤذ حصص کو سہلانے سے۔
 مصلح :- بورسٹا، کار بورسج، چلیڈونیم، کیوریم ٹیلکیم، پیاٹیل، جلیسی میم، ہاکس، میگنیشیا کارب۔
 طاقت :- ۳۰ طاقت اور اونچی طاقتیں۔

TEREBINTHINA

ٹیری بنتھینا

تخصوصی علامات

- ۱- پیشاب میں نمفش کے پتے ہوتے جو شانہ کی سی ہوتے۔
- ۲- زبان ہموار، چمکیلی اور سرخ۔
- ۳- پیٹ میں بے حد تناؤ۔
- ۴- دست بار بار، مقدار میں زیادہ، متعفن اور خون آمیز، جلن کے ساتھ۔
- ۵- پاخانہ کے بعد کمزوری اور غشی کی ہی کیفیت۔
- ۶- پیشاب میں خون اچھی طرح ملا ہوا۔
- ۷- پیشاب بادل کے سے رنگ کا، دھوئیں کا سا، البیومن ملا، مقدار

میں زیادہ، گہرے رنگ کا یا سیاہ، بے درد کا۔

۸۔ جریان خون آنتوں سے۔

۹۔ گردہ، مثانہ اور پیشاب کی نالی میں شدید جلن وارہ اور کھینچنے والے درد (بریس، کینالس، کینتھرس)

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر گردہ، مثانہ اور پیشاب کی نالی کے اورام میں جن کے ساتھ تقطیر بول ندالی یا پیشاب میں رکاوٹ موجود ہو یا جیب پیشاب خون آمیز آئے، اکثر مفید ہوتی ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور گہرے سرخ رنگ کا ہو، پیٹ میں نفع ہو، اعمار سے خون جاری ہو یا ان میں خراش پائی جاسے تو یہی یہ دوا مستعمل ہے اور نافع ہوتی ہے۔

عمومی علامات

زبان چمک دار، سرخ اور چکن ہو، منہ آگ کے جلے اور دکھن ہو، پیٹ میں ہمیشہ سار، آنتوں میں زخم اور ان سے جریان خون ہو، رقیق متعفن خون آمیز اور سبزی مائل اسہال آئیں، گرم شکم اور ہر پانچانہ کے بعد غشی لاحق ہو، کمزوری انتہائی درجہ کی نمایاں ہو، مقعد و مبرز میں جلن ہو، مزمن اسہال رکھنے کے لاجواب دوا ہے۔

پیشاب کی نالی کا ورم، تقطیر بول، خون آمیز پیشاب رک رک کر آئے۔

دھم میں ورم اور سخت جلن ہو، کثرت حیض، ورم مثانہ

نبض کمزور، باریک اور بے قاعدہ ہو، تنفس کی تنگی، پھیپھڑوں سے خون آتے، پھیپھڑے پھولے جوتے محسوس ہوں۔
گروے متورم ہوں اور ان کے گرد در و اور جلن کا احساس ہو اور یہ درد کو لہجے تک جاتے۔

جلد پر خارش، نیلا مہٹ نمودار ہو، لال بنجار۔
سر سامی بنجار میں نفع ہو، شدت کی گرمی اور پیاس محسوس ہو، ٹنڈا لیس دار اسپینہ بجزرت آتے، مریض بے ہوش ہو، سر سام کی علامات واضح ہوں۔

زیادتی :- چھوٹے سے، بائیں طرف لیٹنے سے، بیٹھنے سے، حرکت سے، کھل ہوا میں چلنے سے، رات کے وقت، ایک سے تین بجے صبح تک، مرطوب جگہ لیٹنے سے۔
کئی :- جھکنے سے، ریاح کے اخراج سے۔
مصلح :- ناسفوس

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

خصوصی علامات

- ۱- دمہ
- ۲- کالی کھانسی

عام استعمال

یہ دوا خاص طور پر سینہ کے بلغمی امراض یا مخصوص دمہ اور کھالی کھانسی میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض چڑچڑا ہوتا ہے، سر گرم، بھاری زکام کے ساتھ آنسو بہیں، چھینکیں آئیں، سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے، زکام کے ساتھ کھانسی، حلق اور منہ خشک، قھوک نکلنے میں درد، سینہ میں خشک بلغم، آواز بھاری، درد کے ساتھ کھانسی۔

ضیق النفس (دمہ) سینہ میں رکاوٹ، دمہ کے دوروں میں کالی کھانسی یہ دوا ایلم سیپا اور یوفریشیا کی درمیانی حالت کے لئے مستعمل و نافع ہے۔ کھانسی یا دمہ جو بہت تر ہو اس کو خشک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ دوا پلاسٹیل کی نسبت زیادہ مفید ہوتی ہے۔

پیشانی سے بلغم اگرچہ خشک ہو جاتا ہے لیکن نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اور
تنفس زیادہ ہوتا ہے اس کے برعکس جب پیشانی سے تنفس کی تکلیف دور
ہو جاتی ہے۔

زیادتی :- گرم کرہ میں، بند کرہ میں۔
کسی :- کھل ہوا میں۔

طاقت :- در ٹنچہ یا ۳ x یا ۶ x تک (بڑی حالتیں شافووناور ہی
استعمال ہوتی ہیں)

GELSEMIUM

جیلیسی میم

خصوصی علامات

- ۱۔ دھوپ یا موسم گرما سے پیداشدہ عام کمزوری۔
- ۲۔ کمزوری اور لرزہ کسی عضو کا یا پورے جسم کا۔
- ۳۔ چمک گدی سے شروع ہو (سایشیا)
- ۴۔ عضلات میں ہم آہنگی اور توازن نہ ہو، توازن منتشر ہو جائے۔
- ۵۔ در دہرہ، گردن کی پشت میں ریڑھ سے شروع ہو۔
- ۶۔ خنڈک کمر میں تیزی سے لہر کی طرح کمر سے گدی تک نیچے اوپر
آئے جائے۔

عام استعمال

اس لرنے والی دوا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ تمام عضلاتی نظام (ارگ اور پٹھے) ایسے کمزور ہو جاتیں کہ قابو میں نہ رہیں اور اعضاء حسب مرضی کام کرنے سے جواب دے جاتیں مثلاً چلنے کی کوشش پر ٹانگیں، لاکھ، زبان سب کانپیں اور کانپنے کی یہ کیفیت کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے۔ علاوہ بریں حسب علامات مختلف قسم کے سبجروں، انفلوئنزا، فم رجم کی سختی، پرسوتی تشنج، وقت حیض، کس ایک عضو کا فالج، جوڑوں کے درد، زمانہ حمل یا زچگی کے عوارض، بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف وغیرہ میں بھی نافع ہے۔ خمرہ میں اجاروں کو باہر نکالنے میں بھی مدد ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض الجھن کا شکار ہوتا ہے، خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ مریض نہایت غصیلا ہوتا ہے۔ اولِ حستی و تیزی اور بعد میں پست ہمتی ہوتی ہے۔

سر میں چکر جس کے ساتھ نشہ والوں کی سی لٹکھڑا ہٹ ہو، چہرہ میں گرمی ہو اور رگیں خون سے بھر جائیں۔ کھانے کے بعد گدی میں میٹھا میٹھا درد ہو، سر لانے اور جھکانے سے درد زیادہ ہو، دردِ سر، چکر، غشی اور گردن کے درد کے ساتھ ہو۔

پوٹوں میں ایسی گران معلوم ہو کہ جس سے آنکھیں جھکی رہیں، آنکھیں کھولنے میں وقت ہو، وندلاین، تیلیاں پھیلی ہوں، روشنی سے نفرت ہو

ہونے خشک گرم اور زبان پر سفید مائل بہ زردی میں چاہو، سانس سے بدبو آتی ہو، منہ میں ایسی جلن جو بڑھ کر حلق اور پیٹ تک جاتی ہو ایسا معلوم ہو کہ حلق کے اندر کچھ انکاؤبے، حلق بھرا ہوا معلوم ہو۔
 کھٹی ٹوکاریں آئیں (ناٹھرک ایسٹا معدہ خالی معلوم ہو اور چپکائے پانخانہ نرم بھی مشکل سے خارج ہو، ایسا معلوم ہو کہ مبرز سکڑ گیا ہے ذقنہ ظرف، رشح، خراب چیز سے دست آنے لگیں (یہ حالت آگنیشیا، اوپیم اور پلپاٹیل میں بھی ہوتی ہے) پانخانہ زرد و صفراوی یا سفید، مبرز کا معذوح ہو جانا۔

مردوں میں بلا ایستادگی خورد و سجد منی خارج ہو جائے جس سے نہایت سختی اور کمزوری معلوم ہو۔

مستورات میں رحم کی گرانی، جس، حیض تشنج کے ساتھ، ایام محض میں رحم میں سخت درد ہو، پھر سختی آجائے۔

حلق میں ایسا تشنج ہو کہ جس سے دم گھٹنے کا اندیشہ، حلق میں خراش ایسی معلوم ہو کہ زخم پڑ گئے ہیں۔ سینہ کے نیچے کے حصہ میں رکاوٹ معلوم ہو، حوالی دل میں کوشین ہو، ایسا معلوم ہو کہ اگر چلنا پھرنا بند ہو جائے گا تو دل کی حرکت بند ہو کر موت ہو جائے گی۔ ڈیجیٹلس میں خفیف حرکت کرنے سے دل میں کمزوری معلوم ہوتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے مگر جلیبی میم میں حرکت کرنے سے راحت ہوتی ہے۔
 بخار لرزہ کے ساتھ پیاس کے بغیر، سردی پیر سے لے کر حرام مغز پر ہوتی ہوئی اور پوکو چڑھے اور گردن تک جاتے۔ بخار بغیر پیاس کے جین نہایت زیادہ ہو، سینہ مع پیاس کے، ایسینہ آنے سے آرام ہو۔

زیادتی۔ تر موسم میں، بادل کی گرج سے قبل، دفعتاً جذبہ بار سے
خراب چیز سے، تمباکو پینے سے، اپنی بیماری کے خیال سے، اپنے
نقصان کے ذکر سے۔

کسھی، - ٹھنڈی کھل ہوا میں۔

معاون، - بپ ٹیشیا، اسپیک۔

مصلح، - چائنا، کافیا، نیٹرم میور۔

طاقت، - مدر ششکپور سے ۳۰ طاقت تک ہی عام طور پر مستقل ہے۔

CHINA

چائنا

خصوصی علامات

- ۱- مریض مردہ دل، لاپرواہ، کم سخن (نفا سفورک ایٹڈ)
- ۲- تکلیفات، رطوبات، زندگی کے ضائع ہو جانے سے، خصوصاً خون
کے اخراج سے، یا زیادہ وقت تک دودھ پکانے سے یا زیادہ
پیپ بہہ جانے سے (چائنا سلف)
- ۳- درد سر، جیسے کھوپڑی پھٹ جائے گی۔
- ۴- درد سر، سیلابی خون یا کثرت جماع کے بعد۔
- ۵- بے حد کمزوری، ذکی الحس چھونے سے، درد سے، ہوا کے
چھونکوں سے۔

۶۔ سیلانِ خون بہت مدت کا یا بہت عرصہ تک جاری رہے ۔
۷۔ لڑتی بخار جو حرارت کے وقت نہ ہو ۔

عام استعمال

یہ دوا خون اور رطوبات کے زائل کرنے سے لاحق ہونے والی کمزوری کے علاوہ کمی خون، جریانِ خون، جگر اور تھل کے عوارض، یرقان، بنیر درد کے اسپان، مختلف قسم کے بخاروں، تپِ دق، بچوں میں باض کے عوارض و فتور وغیرہ میں حسب علامات مستعمل و مفید ہے ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم ہمت اور ہر قسم کی مشقت سے عادی ہوتا ہے، داغ اور سر کمزور، سر میں بخاری پن، چکر، سر اٹھانے پر تنکین کا درد، سر جو ہر اسے یا ذرا سا بھی چھونے سے زیادہ ہو مگر زیادہ زور سے دبانے سے کم ہو۔

پڑھتے وقت الفاظ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہونے نظر آتے، سر میں گرمی اور صلب، کان میں گڑگڑاہٹ، سننا ہٹ، بطنِ جراثیم، کونچن، ہر پن، زکام، بحسیر، سہا، چہرہ زرد، کمزور، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑے ہوتے، چہرہ کا درد، چھونے سے زیادہ ہو۔

دانت کا درد چھونے سے زیادہ ہو، دبانے سے آرام ہو، زبان پر موٹا گندلا میل، ہونٹ خشک۔

دباج کی وجہ سے کل معدہ میں ابھار، نفخ، کھانے کے بعد معدہ پھولا ہوا۔

جگر میں دم اور درہم نمز کمزور دودھ سے بندہ خراب ہو جائے
کھانے کے بعد کڑوی ٹوکار۔

دست غیر مضتم شدہ پانی جیسے سفید، زرد یا سیاہی مائل، نہایت
کمزور کرنے والا نرم پاخانہ جسے مشکل سے خارج ہو، پیشاب گندہ کم
مقدار میں، پیشاب کی نالی میں کونچین۔

چلنے میں اعضائے تناسل میں بیماری پن، جلق کی وجہ سے احتلام
حیض کثیر المقدار (زیادہ) سیاہ لونٹری، استقامت حمل کے بعد اور رخن
کمزور کرنیوالا، قبل حیض سفید رطوبت خارج ہو۔

کھانسی گویا گلے میں دھواں بھرا ہوا ہے، سہنے بولنے یا پینے
سے زیادہ ہوا پھیپھڑے سے خون آنا، لیٹنے سے سینہ میں بوجھ معلوم ہوا
دانت گھٹنے کا گرم دم، پیر کا دم، ایک ہاتھ سرد اور دوسرا گرم

ایک پیر گرم اور دوسرا ٹنڈا (لائیکو پوٹیم، چلیڈو نیم اور ڈیجیٹلس)

نہار لڑھکے ساتھ اور پیاس کے بغیر، لڑھکے آتے ہی پیاس بند ہو جائے
کل جسم میں سردی، پانی پینے سے زیادہ ہوا سردی اور لڑھکے کھلی ہوا ہیں،

۵ بجے شام کو، کمرہ میں آنے سے غائب ہو جائے۔ پیاس لڑھکے سے پہلے

یا بعد مگر دوران لڑھکے نہ ہو، بخار بغیر پیاس کے، کل جسم گرم ہو اور درہم

کپڑا کھولنے کی خواہش، لیکن کپڑا ہٹانے سے سردی لگے، عرصہ تک قائم

رہنے والا بخار، بخار جس میں نیند آجائے، پسینہ کے ساتھ، پسینہ بکڑ

کمزور کرنے والا، کھل ہوا میں چلنے سے بھی پسینہ آئے۔

زیادتی، پینے سے، حرکت سے، عضو کو پھیلانے سے، ذرا

چھونے سے، ہوا کے جھونکے سے، ہر دوسرے دن، رطوبت زندگی

سے ضائع ہو جانے سے، رات کو کھانے کے بعد، چمکنے سے۔
کبھی :- ودھرا ہو جانے سے، زور سے دلینے سے، کھل ہوا میں
گرمی میں۔

معاویہ :- فیم ٹیکم، کلکیر یا فاس

مخالف :- ڈیسی فیس، کریا زوٹ، سینٹیم، ٹیم۔

مصلح :- آر سینکم البم، آرنیکا، بیلا ڈونا، کار بوڈیج، اپیکاک

مرکیوریس، پلسا ٹیلا، سپیا، سلفر۔

طاقت :- مدد ٹیکور سے ۳۰ طاقت تک نیز ۲۰۰ طاقت بھی مستعمل ہے۔

CHININUM SULPH.

چینی نم سلف

خصوصی علامات

- ۱۔ سردی سے لرزہ اور اس کے دوران کسی رگوں کا درد کرنا اور پھول جانا۔
- ۲۔ لرزہ گرم کمرہ میں بھی کم نہ ہو۔
- ۳۔ غنم کے سرخ ذرات میں کمی۔
- ۴۔ پیشاب کا نہ زیادہ مقدار میں آنا اور البسومین کا اخراج۔

عام استعمال

یہ دوا طیبریا کے قبے ہوئے مادے کو ابھانے کے لئے بہت کارگر

ہے علاوہ برسی و جمع المفاسل، گنٹھیا اور مزمن درم گروہ میں بھی مستعمل ہے۔
اس کا زیادہ تر استعمال بلیر یا بنجار کے لئے ہوتا ہے۔

عمومی علامات

پیشانی پر، سینوں کے اوپر اور کنب پٹیوں پر درد جو کہ دوپہر کے وقت
بڑھے، اس کی ابتدا بلیر یا بنجار سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی سر چکرانا اور کنب
جو کہ بائیں جانب شدید صورت میں ہو، مریض کو چکر آئیں، کھڑا نہ ہو سکے
کانوں میں زور کی آوازوں کا آنا، کانوں کا بجننا اور سننے کی قوت
میں کمی۔

آنکھوں کے نیچے نشوں کا درد شروع ہو کر اور گرد پھیل جائے، درد باقاعدہ
دوروں کی صورت میں آئے، دباؤ سے تسکین ہو۔

بیٹھنے کے مہروں کا شدید طور پر درد کرتا، وہانے سے درد میں
زیادتی، یہ درد گزرن اور سر کی طرف رخ کرتا ہے۔

پیشاب خون آمیز، گاڑھا، مٹی کے رنگ کا اور اس کے نیچے زہنی
تلیخت کا جمع ہو جانا، پیشاب زیادہ مقدار میں آئے اور اس کے ساتھ
البیومن کا اخراج۔

جلد پر خارش، سرخ پھسیاں، چھپاکی، یرقان، آبلے، پھوٹے
اور ہر قسم کی سوزش درد کرنے والی، جھریوں والی جلد۔

بنجار سردی اور لرزہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کئی مگروں کا درد کرنا
اور پھول جانا، گرم گروہ میں بھی کانپے جانا، بے چینی، پسینہ آنا اور ساتھ
کانپنا، اعضاء میں شدید لرزہ، نبض کمزور، درجہ حرارت بھی زیادہ

بعض حالتوں میں نارمل سے بھی کم ہو۔

طاقت :- عام طور پر ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور بعض اوقات اس سے اونچی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں۔

CHELIDONIUM

چیلیدونیم

تخصیصی علامات

۱۔ مسلسل درد دانے نیچے شانہ کے زاویہ کے نیچے اکال کلاب،

مرکبہ (۱)۔

۲۔ نہایت گرم اشیا پر پینے کی خواہش۔ نفیسی چھینروں کی خواہش

۳۔ آنکھوں کے گوشوں کا نوبتی اعصابی درد جس میں آنسو پنا کے کی طرح بہیں (رشاکس)۔

۴۔ قبض، پاخانہ سخت گول سدوں کی صورت میں۔

۵۔ جلد کا رنگ سیٹی مائل زرد، جلد بے آب۔

عام استعمال

یہ دائیں طرف کی دواسہے، جگر کی خرابی میں عام استعمال ہوتی ہے۔

خاص کر صفراوی امراض یرقان، پتہ کی پتھری، توخ، صفراوی پتھری، درد جگر، ورم جگر، جگر کی خرابی سے پیدا ہونے والے نسوں اور پھٹوں

کے پاؤں پر درد نیز کالی کھانسی، دورہ والی کھانسی، صفراوی نمونیا
بچوں کی کھانسی اور بلانکا ٹیسٹس وغیرہ عوارض اس کے زیر اثر آتے
ہیں۔ اس دوا کے درد بلانکونیا سے مشابہ ہوتا ہے، البتہ پاخانہ بلانکونیا
میں سخت اور صورا ہوتا ہے اور چیلڈرونیٹم میں مٹی کے رنگ کا مہرہ

عمومی علامات

دورانِ سر جو بستر سے اٹھنے، بیٹھنے، آنکھ بند کرنے سے زیادہ
ہو اور مریض کو ایسا معلوم ہو کہ وہ آگے کی طرف گر پڑے گا، ایسے
دورانِ سر میں عموماً یرقان اور صفراوی تے بھی موجود ہوتے ہیں۔ سر کے
دائیں جانب درد، دائیں رخسار، کان، آنکھ اور جگر میں ناخوشگوار
احساس اور درد ہو، گردن اکڑی ہوئی۔

دردِ شکم، زبان چوڑی اور میل آلود ہو، نوائفہ کڑوا اور طبیعت میں
متلی ہو، بعض دفعہ تے بھی ہو جاتے، درد پیٹھ اور شانہ کی ہڈی تک
جائے، کھانے سے عارضی فائدہ ہو، یرقان، آنتوں کا فعل سست
ہو، جگر کا بڑھ جانا، صفراوی پتھری، زرد و اسہال، صفراوی تے۔

بلانکا ٹیسٹس (سانس کی نالیوں کی اندرونی مجلیوں کی سوزش)،
بلانکونیا، کھانسی شدت سے ہو، سینہ میں بغم کھڑکھڑائے اگال
کھانسی، کثیر بغم آئے، لیکن اس کا اخراج مشکل سے ہو، کھانسی کے
ہمراہ مقامِ جگر میں کسیدنے والا درد ہو، سانس کی تنگی۔

گردوں میں سوزش ہو، پیشاب کف دار، کثیر المقدار اور زرد
مائل گدلا۔

جگر کی خرابی کے باعث گھٹنوں میں مفصلی درد، گولہوں اور انوں میں درد، ایڑیاں سخت اور مفلوج ہوں، عضلات میں سختی۔

زیادتی: دائیں جانب حرکت سے، تبدیلی موسم سے، صبح سویرے کھڑی، شام کے وقت، گرم اشیا پر پینے سے، خصوصاً اور پینے کی بہت خواہش ہو۔

معاون: لائیو پوڈیم، براہیونیا۔

مصلحہ: کیپولا

طاقت: چھوٹی طاقتیں زیادہ تر مستعمل ہیں۔

CHIONANTHUS

چونانٹھس

خصوصی علامات

- ۱۔ ماتھے پر آنکھوں سے اوپر درد۔
- ۲۔ ناک کی جڑ پر دباؤ کا احساس۔
- ۳۔ یرقان جس کے ساتھ ایام ماہواری بھی بند ہو جائیں۔
- ۴۔ ورود کی صورت میں آنے والا درد معدہ و شکم۔

عام استعمال

یہ جگر کے لئے ایک خاص دوا ہے، صفراوی امراض میں عام طور پر

تستعمل ہے۔ درد سر، درد شقیقہ، دیگر اعصابی درد، قبض، یرقان، تلی کا بڑھ جانا، پتہ کی پتھری، ذیابیطس شکرسی وغیرہ عوارض اس کے زیر اثر آتے ہیں۔

عمومی علامات

سر بھاری، بے چینی، ماتھے پر آنکھوں سے اوپر شدید اعصابی درد جو کہ خاص طور پر ناک کی جڑ کے اوپر ہوا اور کن ٹیٹیوں تک پہنچتا ہوا درد بھگنے پر یا حرکت سے بڑھتا ہے۔ آنکھ کا سفید حصہ زرد ہو جائے یرقان۔

منہ میں خشکی کا احساس جو کہ پانی پینے سے بھی دور نہ ہو، علاوہ بڑی لعاب و مہن کی کثرت کے باوجود منہ کی خشکی کا قائم رہنا۔

ناٹ کے مقام پر درد اور بھاری پن، معدہ پر بندش کا احساس گویا کہ رسی سے بانڈھ دیا گیا ہے اور اسے کسمبی ڈھیلا کیا جاتا ہے اور کسمبی کس دیا جاتا ہے۔ پیٹ درد کرنے والا، پھولا ہوا، ساتھ یرقان اور قبض، جگر کی بندش اور خون میں صفرا کی ملاوٹ، پاخانہ کا رنگ سفید، بعض دفعہ تپلا، زرد، چمکتے والا پاخانہ۔ زبان پر میل کی بھاری تہ، جھوک کی کمی، صفراوی قولنج، جگر کے مقام پر درد۔

پیشاب گاڑھا اور بھاری مقدار میں، بار بار پیشاب کرنے کی حاجت، پیشاب میں صفرا اور شکر، پیشاب کا رنگ سیاہی مائل۔ جلد نم دار اور زرد، یرقانی۔

طاقت ۱۔ مدد نیکو کے ۲ طاقت تک عام طور پر استعمال ہے۔

DIOSCOREA

ڈاٹسکوریا

تخصّوصی علامات

۱۔ درد تو لہج جو آگے کی طرف جھکنے سے اور لیٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔

عام استعمال

درد تو لہج میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ احتلام اور لہری میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ چیزوں کے نام غلط سہل لیتا ہے۔

سر کی دونوں کن پٹیوں میں تیز کاٹنے والے درد، دبانے سے اس میں افاتہ ہو مگر بعد میں پھرتیزی اختیار کر جاتا ہے۔ سر میں آوازوں کا آنا۔ معدے سے بدبودار گیس کے ٹوکاڑوں کا آنا، معدہ کا درد، معدہ میں نیچے کی طرف دباؤ کا احساس، پچاتی کے درمیان درد، جو کہ بازوؤں تک پہنچتا ہو، کھٹی اور کڑوی ٹوکاڑوں کا آنا اور ساتھ ہی کھٹی، نم معدہ میں شدید درد جو کہ کھڑا ہونے سے افاتہ پاتے۔

پریت میں درد جو اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ پیٹ سے چل کر جسم کے دوسرے اعضا میں نمودار ہوا اور
 ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے پنجے تک جاتا ہو، پیٹ میں گرد گرمی
 پیٹ سے ہوا کا اخراج، سرور اور معدہ دامعاری میں وقفہ وقفہ سے
 آنے والا درد، تو لہج جس میں چلنے سے افاقہ ہو۔ درد پیٹ سے چل کر
 کمر چھاتی اور بازوؤں تک پہنچتا ہے، جو کہ آگے بھگنے اور لیٹنے
 سے شدت اختیار کرتا ہے۔ پتہ کا درد، جگر کے مقام پر شدید درد
 جو کہ پستانوں تک پہنچتا ہو۔ پتہ سے درد شروع ہو کر چھاتی تک
 پہنچتا ہو، کمر اور بازوؤں تک جاتا ہو، گردوں کا درد جو کہ ٹانگوں اور
 بازوؤں تک جاتا ہو۔

بواسیر جس کے ساتھ جگر میں بھی شدید درد ہو، بواسیر کے متھے جو
 انگوٹھ کے گچھوں کی طرح ہوں اور پانخانہ کے بعد مقعد سے باہر نکل آئیں
 اور ساتھ ہی مقعد میں درد ہو، اسہال جو کہ صبح کے وقت شدت اختیار
 کریں، اسہال زرد جن کے بعد شدید کمزوری لاحق ہو، گرم مہیج اور گرم
 پانخانہ کا اخراج۔

دل میں درد، چھاتی کے کچھلی طرف درد جو کمر تک پہنچتا ہو اور
 بازوؤں تک جاتا ہو، سانس کی تنگی سے آئے، دل کمزور ہو، خاص طور
 پر دل پر ہوا کے زور کے باعث اور ساتھ چھاتی میں درد۔

مردانہ اعضاءے تناسل ڈھیلے، مقعد اور گردوں سے درد شروع ہو کر
 خصیوں تک چلتے، نلوں اور خصیوں پر تیز بو وار پسینہ، منی کا حالت
 خواب میں خارج ہو جانا، گھٹنوں میں شدید درد۔

مستورات میں رحم کے اندر درد، رحم سے درد شروع ہو کر دوسرے

اعضار میں جائیں، خوابوں کا آنا۔

تمام چپاتی پر گھٹن اور دباؤ کا احساس، خاص طور پر بھکنے کی صورت میں اور سانس لیتے وقت ایسا محسوس ہو کہ سینہ پھوٹتا نہیں، سانس چھوٹنا چھوٹا آتا ہے۔

کمر کے اندر درد اور لٹکھڑانا، جو کہ بھکنے سے زیادہ شدت اختیار کرے، نسون اور پٹھوں کا درد جو کہ راتوں تک پہنچتا ہو اور دائیں طرف شدت سے ہو اور آرام کی صورت میں تکلیف پاتا ہو۔
ناخن بھرے، ماتھے کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں میں تشنج زیادتی :- شام کو رات کے وقت، ایٹنے سے، آگے کی طرف بھکنے سے۔

کسھی :- سیدھا کھڑا ہونے سے، کھلی ہوا میں پھرنے سے، دباؤ سے۔

مصلح :- کیمپلا، کیمپفر،
طاقت :- مرٹنکچریا یا ۳x زیادہ تر مستعمل ہے۔

DROSER

ڈروئسرا

خصوصی علامات

- ۱۔ کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے کے بعد آدھی رات کے بعد ہو۔
- ۲۔ کال کھانسی
- ۳۔ حنجرہ کی سل جو کالی کھانسی کے بعد ہوتی ہو۔
- ۴۔ نوجوانوں کی سل میں شب کی کھانسی کے ہمراہ خونری یا سٹیاں
بلغم آتی ہو۔

عام استعمال

ڈروئسرا کال کھانسی کی مخصوص ترین دوا ہے۔ اس کے باقی میں
 ٹائمن اپنے "میٹریامیڈیکا پویا" میں ترم طراز میں:
 "اس دوا کی ۳۰ طاقت کی صرف ایک ہی خوراک و بائی کال
 کھانسی کے لئے شفا کے کلی کی ضمانت ہوتی ہے۔ سات یا آٹھ
 روز میں مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پہلی خوراک کے فوراً
 بعد دوسری خوراک ہرگز نہ دیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ
 پہلی خوراک کے عمل میں رختہ پڑے گا بلکہ دوسری خوراک
 الٹی مضر بھی ثابت ہوگی۔"

کال کھانسی کے علاوہ یہ دوا حشرہ، برازکائی ٹیس رسانس کی نالی کی

اندرونی جھتیوں کی سوزش) سے پیدا شدہ کھانسی، تشنہ پی، کھانسی، حنجرہ کی
 نل، سہل ریوی وغیرہ میں بھی مفید و مستعمل ہے۔
 سہل کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا درمیکچر کی صورت میں چارہ سے بیس نظر
 تک چوبیس گھنٹوں میں دینا مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بے خیالی کا شکار ہوتا ہے، جب کتاب پڑھتا ہے
 تو کسیوں سے ایک مضمون کی طرف راغب نہیں رہتا، کبھی ایک کتبہ
 دوسرا دیکھتا جائے، حیران اور احمق نظر آتا ہے۔ حافظہ خراب ہوتا ہے۔
 کھل ہوا میں چلنے سے سر پکڑائے، آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا
 دشوار ہوا جیسے پیچھے کی جانب گر پڑے گا۔
 آنکھوں کی تیلیں پھیل جاتی ہوں یا سگری ہوئی ہوں، بائیں آنکھ کے ٹیے
 کے نیچے جلن اور جھپن ہو۔

چہرہ گرم اور سرخ، پھولا ہوا اور فوق، چہرہ گرم اور ہاتھ سرد ہوں۔
 منہ چھوٹا گول، زبان کے درمیان بلاور و سوجن ہو، زبان کے نیچے کھل
 ہوتی ہو۔ بائیں رخسار میں ایسا محسوس ہو جیسے سرخ مریچ کھا لی ہوئی ہو،
 شوک پانی کی طرح بہت زیادہ۔
 حلق میں خراش اور کھردرا پن، تالو اور حلق میں خشکی کا احساس ہو
 جس کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جائے۔

جی متلائے، تیزابی اشیاء سے نفرت اور نقصان ہو، مریض غذاؤں
 سے جی خراب ہو، آدھی رات سے لے کر صبح تک تکلیف زیادہ ہوتی رہے۔

غذا کے بعد پیٹ درد کرتا ہو۔

پاخانے نرم، سیاہ، سفید مٹیالے پانی کی طرح بغیر بو کے، پیشاب بغیر بو کے ہو، پاخانہ کے بعد بھی لگاتار پاخانے کی حاجت ہے۔

پیشاب کے لئے بار بار زور لگانا پڑے، پیشاب تھوڑی مقدار میں آئے، متواتر ایک ایک قطرہ ہو کر یا بار بار زیادہ مقدار میں پیشاب آتا ہو۔

تشنگی کھانسی خشک کالی کھانسی کی طرح، دوسے ایک دوسرے کے بعد بہت جلدی جلدی آتے ہوں، مشکل سے سانس لے سکے۔ دم گھٹتا ہو، کھانسی بہت کھردری اور گہری، آدھی رات کو زیادہ ہو، زرد بلغم خارج ہو، نکسیر پھوٹے اور منہ سے خون آئے، جی منٹلائے، آواز جھارنا اور گہری ہو، گلا بیٹھ گیا ہو، سپوزشس حنجرہ، تالو اور حلقوم میں کھردراہٹ اور پھیل جانے کا احساس ہو۔ حنجرہ میں کوئی شے رہتی ہوئی محسوس ہو جس کے باعث کھانسی شروع ہو جاتی۔ معلوم ہو کہ حلق میں کوئی نرم شے رکھی ہے، کھانسی شب کو ہو۔ شام کو فوراً لیٹنے پر، دو بجے صبح کو مریض جاگ پڑے، کھانسی کے ہمراہ سیاہ یا خونئی بلغم آتی ہو حنجرہ کی سہل کے ہمراہ کھردری بہت ہو۔ حلق خشک ہو۔ آواز جھارنا ہو، زرد لگا کر بات کر سکے۔ جیب بات کر کے تو دم کشنی کی شکایت ہو جب کوئی نقطہ نکلے تو حلق سگڑ جاتا ہو، سینہ کے عضلات میں چھین ہو جسے دبانے سے آرام آتا ہو۔

کولہے اور جنگاسے کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہو، پاؤں کے جوڑ سخت ہوں۔

تمام بازو مفلوح اور بستر سخت معلوم ہو۔

جلد میں کھجلی اور چھین کی سی شکایت ہو جسے کھیلانے سے اٹنے سے یا سہلانے سے آرام محسوس ہو۔ خسرہ کی طرح کے ابقار نکل آئیں ابقار کے ساتھ درد ہو اور ڈنک مارنے کی تکلیف ہوتی ہو۔

مریض کو متواتر جمائیاں آتی ہوں، نیند سے بار بار چونک پرتا ہو،

بیخوابی ہو۔

بخار میں جسم کے اندر ککچی ہو، چہرہ کی گرمی کے ہمراہ ککچی، ہاتھ سرد ہوں اور پیاس نہ ہو، بستر میں بھی سردی محسوس ہوتی ہو۔

زیادتی :- آدھی رات کے بعد لیٹنے پر، بستر میں گرم ہونے پر، پانی پینے سے، گانے سے اور سننے سے۔

کھی :- جھکنے سے، سر کو ہاتھوں پر رکھنے سے، چھونے سے،

معاون :- نکس و امیکا، کلکیر یا کارب، نیفالیسم، ویدیشرا البوم،

پسا ٹیلا۔

مصلح :- کیمفر

طاقت :- بالعموم ۱x یا ۲x سادہ کھانسی میں مستعمل ہے اور کالی

کھانسی میں ۳۰ طاقت کی صرف ایک خوراک۔

خصوصی علامات

- ۱- پیشاب کی تڑوش کا بند ہو جانا ، ٹنڈے سے پانی میں ننگے پاؤں گھومنے سے۔
- ۲- پیشاب از خود نکل جائے ، پیشاب پر قابو نہ ہو۔
- ۳- موسم درجہ حرارت کی یکدم تبدیلی سے لاحق ہونے والی یا شدت اختیار کرنے والی تکالیف۔

عام استعمال

موسم کی تبدیلی سے جسم کو لاحق ہونے والے عوارض ، چھپک اور نار فادسی ، اسہال ، نزلہ ، موسم خزاں کے عوارض ، واو مزین عضلاتی بالی کے درد ، تھلج ، بوڑھوں کی کھانسی ، پارہ کی وجہ سے قصوک بکثرت آنا ، کثرت شہوت ، پیسی پٹروں کے منطوح ہو جانے کا خوف ، گردوں کے درد جو سرخ بنجامہ ، ملیریا یا کسی اور شدید مرض کے بعد ہو گئے ہوں ، مریض کو سردی لگ جاتی ہو ، سردی لگ جانے کی وجہ سے مزین پیش و غیر عوارض اس دوا کے ذریعہ آتے ہیں۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض جھگڑاؤ ہوتا ہے اور غصہ کے بغیر بھی دوسروں کو لعنت علامت کرتا رہتا ہے۔

سر میں پراگندگی ہو، گردن کے سر سے اوپر کی جانب پھیلی طرف درد ہو، درد سر، سر کے پھلے حصہ میں کپکپی اور دکھن ہو، سرد موسم میں کھوپری میں داد ہو، سر گنجا ہو، موٹے زرد پھلکے اتریں، کھجلاسنے پر خون خارج ہو۔

سردی ہر وقت جب آنکھوں میں لگ جاتے تو آنکھوں میں ٹھہر جاتے، گاڑھی زرد رطوبت خارج ہوتی ہو، پوٹے دندانہ وارد اور بنجار میں پانی کی مانند رطوبت خارج ہو، کھلی ہو میں شدت ہو، پتلیاں بہت پھیلی ہوئی ہوں۔

کانوں میں درد ہو، کانوں میں شور و غل، چیمبن اور سوزش ہو، کان کے اندر سے رطوبت نکلتی ہو۔

نکسیر بھوپتی ہو، گرم اور عاف خون خارج ہو، ناک کے اوپر بوجھ موس ہو۔ منہ سے لیس وار قندک مسابون کی طرح آتا ہو، زبان خشک اور کھردری ہو، حلق میں کھردرین اور خواشش ہو، حلق میں بلغم بہت ہو، سردی کے باعث دم بوزمین۔

منہ کا ناقہ کڑوا، سفید لیس وار رطوبت کی تہ ہو، سردی لگنے سے قویج ہو، ناف کے قریب کاٹنے والے درد ہوتے ہوں۔
پاخانے سفید، پیلے، سبزی مائل، میٹھے پانی کی طرح، شب کو

زیادہ، ترموسم میں ان کی کیفیت میں رد و بدل ہوتا ہے، دست
سفید، پیلے، سبز کھٹی بو والے آتے ہوں۔

سردی لگنے کی وجہ سے پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کرتے وقت
درد، پیشاب کے نیچے گاڑھی تلمچٹ کا جم جانا، نیچے پاؤں سردی میں
چلنے سے پیشاب کا بار بار آنا یا بند ہو جانا۔

سردی کی وجہ سے سینے یا ورودہ آنا بند ہو جائے، وقتِ حیض
کے ساتھ تمام بدن پر ابھار نکلی آتیں، پستان دکھتے ہوں۔
سردی لگنے کی وجہ سے سانس وقت سے آتا ہو اور ہنغم جمع
ہو جاتے۔

گردن اکڑی ہوئی، سردی لگ جانے سے کمر میں یا رانوں میں یا
پنڈلیوں کی ہڈیوں میں درد، ہاتھوں پر مسے ہوں، شدید جلد کا ابھار
کے بعد منفعلی علامات نمودار ہوں۔

جلد گرم اور خشک ہو، بنیل، گردن یا جگہ جگہ میں گرمی پڑ گئی ہو۔
کھلبی ہمیشہ سرد و ترموسم میں زیادہ ہو، پیئسیاں، آبلہ دارا اجاڑ پھسکا
مٹے۔

زیادتی :- شب کو سکون سے، سرد ہوا سے، تراور سرد موسم میں، موسم
وقتاً سرد ہو جانے سے، لیٹنے سے اور پھراؤ کھڑے ہونے سے۔
کبھی :- نشست سے اٹھنے پر حرکت سے، گرم خشک موسم میں
چلنے پھرنے سے، گرم ہوا سے۔

معادف :- برائٹا کارب۔

مصلح :- کیفیر، اپیکاک، کیوریم، مرکوریس۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ۔

DIGITALIS

ڈیجیٹلس

خصوصی علامات

- ۱۔ احساس جیسے ذرا سی حرکت نہ کرنے پر قلب کی دھڑکن بند ہو جائے گی (کوکین)
- ۲۔ نبض بھری ہوئی ، بے قاعدہ ، بہت مدھم اور کمزور ، ہر تیسری ، پانچویں یا ساتویں ضرب چھوڑ دے ۔
- ۳۔ جسم کی جلد نیلی ۔

عام استعمال

اس دوا کا خاص اثر پہلے دورانِ خونِ پیار اور بعد ازاں دوسرے اعضا پر ہوتا ہے ۔ دل کے عوارض میں خاص طور پر مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض جید فکر مند اور شورشیں کا مارا ہوتا ہے ، ناک کے شام کے وقت لاپرواہی ، بات چیت کرنے کو توجہ دینا ہے ۔ سر میں چکر اور کسکپی ، کن پٹی اور پیشانی میں کونپ ، نانی کر سکنے

سے ملتے کے بائیں طرف ٹیس ہو، بائیں کن پٹی میں چمک ہو، دانے
 ابرو میں جلن کے ساتھ درد، نگاہ وضعل جیسے آگے کوئی پردہ ہے۔
 آنکھوں کے ڈیلوں میں ٹیس ہو، بہت زیادہ آنسو بہتے ہوں تیز
 روشنی سے اور زیادہ ہوں، اپوٹے آپس میں چمٹ جائیں اور کیمچہ
 بہت نکلے، چیزیں سبز یا زرد نظر آئیں۔

چہرہ زرد، ہونٹ اور پوٹے پیسے، منہ میں خشکی، میٹھی اور بدبودار
 مال، رال ایسی نکلے کہ زبان اور مسوڑھوں کو پھیل دے، زبان نیگول،
 فائقہ کڑوا، بھوک باکل نڈار۔

متلی اتے کرنے کو طبیعت چاہے، بار بار ابکان، صبح کو بغمتے
 آئے، غذاتے میں نکل جائے، معدہ میں بہت کمزوری محسوس ہو، پیٹ
 میں گرانی، جلن اور مرد۔

پاخانہ سفید، کھڑیا یا راکھ کے مانند، تیلے دست آؤں سے
 پانی کا دست، یرقان کے عارضہ میں دست آئیں۔

پیشاب رک جائے، پیشاب کی تکلیف ہو، شازہ کی گردن پر
 درم ہو۔

کھانسی میں خون آئے، پھیپھڑوں سے بغم خون ملا ہونکلے،
 چلنے میں سانس پھولے، ذرا سی حرکت سے دل دھڑکنے لگے، ایسا معلوم
 ہو کہ دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ دل کی حرکت زیادہ ہو جائے۔ دل کے
 اطراف میں کوچن۔

نخعیوں کا درم، خواہش جماع بہت زیادہ اور ایستادگی اور
 احتلام ہو۔

رات کو دابنا لٹا تھ مع انگلیوں کے سوچ جائے اور تین گھنٹہ سوچن ہے، گھٹنے میں پانی اترا آئے، نیچے کے دھڑ میں بہت کمزوری معلوم ہوا پیر کی سوچن رات کو کم ہو جائے۔

رات کو نیند خراب، خوابوں کی وجہ سے اچٹ جائے، یہ خواب دیکھے کہ ادنیٰ سے پانی میں گر ٹپا ہے اور چونک کر جاگ پڑے۔
نبض سست اور بے قاعدہ، اندر سردی اور ارد گردی گرم یا اور پڑی اندر گرمی، پسینہ بکثرت آئے اور آرام نہ ملے۔

زیادتی :- درد سر بڑھ جائے، بیٹھے سے، گرم کمرہ میں بیٹھنے سے، خاص کر سیدھے بیٹھنے سے، کھانے سے گانے سے۔
کسہ :- خالی معدہ ہونے سے، کھلی ہوا میں۔

معاون :- بیسلا ڈونا، برائیونیا، کیوولا، لائیو پوریم، نکس و امیکا، اوسیم، فاسفورس، پساٹیل، سیپیا، سلفر اور وریٹرم اہیم۔
مصلح :- ایس، کلکیرا، کیفر، نکس و امیکا، اوسیم۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳ طاقت تک۔

نوٹ :- ڈیجیٹیس کے بعد کوزین یا چائنا یا اس کا کوئی مرکب ہرگز نہ دینا چاہیے، بچہ مضر ثابت ہو سکتا ہے۔

خصوصی علامات

- ۱۔ بے چینی حد سے زیادہ
- ۲۔ بیحد ذکی الحسی کھلی ہوا سے
- ۳۔ درد سزا بیہر شراب کے استعمال سے
- ۴۔ زبان خشک جس کی نوک سرخ شدت سے مشابہ ہو۔
- ۵۔ دست محرقہ کے آغاز کے ساتھ، از خود سہمت کمزوری کے ساتھ۔
- ۶۔ زہر بارو بائیں سے دائیں کو آبلے کا سا۔

عام استعمال

یہ دوا وجع المفاصل کے مزاج والوں کے لئے زیادہ موزوں ہے،
 تڑپ جانے کی وجہ سے نخاس گر گرمی کے بعد تڑپ جانے سے لاحق ہونے
 والی تبکالیف کے لئے مستعمل ہے نیز تکالیف جو کہ مورچ سے یا
 کسی ایک عضو کو زور دینے کی وجہ سے مثلاً کسی چیز کو زیادہ ادھر
 اٹھانے سے یا زیادہ زور سائمانے سے پٹھہ پٹھو جانے کے لئے بھی نافع ہے۔
 عوارہ بریں ٹائیفائیڈ اور دیگر بخاروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بید بے چین ہوتا ہے، سوا آتر پہلو بدلتا ہے،
شام کو متشکر ہونا، رات کی طرف میلان، طبیعت، خاص کر شام کو تنہائی
کی خواہش۔

کھڑے ہونے پر یا چلتے ہوئے سر میں چکر لٹینے پر زیادہ ہو، چلنے
میں تھکھرائے جو فالج کا نتیجہ ہو۔ تپ سیپ بھرے ہوئے دانے سر پر جس پر
پیشی پڑی ہوتی ہو۔ بال گرتے جائیں۔ بدبودار کھلی رات کو ہو۔
آنکھ میں جلن، کھجلی، درد اور سرخی، پانی بہنا، بعض دفعہ پوٹے
جھاری یا مفلوج ہو جائیں جس کے باعث کھل نہ سکیں (جلسی میم،
یو پیٹوریم)

چہرہ پندہراؤ کے چھالے جن میں جلن اور درد ہو۔
دانتوں اور مسڑھوں میں درد، ٹٹنٹا، تانے سے آرام ہو پانی
پینے کے باوجود منہ خشک، زبان سرخ اور چٹنی ہوئی، زبان کی نوک خشک
کی شکل میں سرخ ہو، جبڑوں میں تشنج، ہر بار چلانے پر جیڑا آواز سے
پانخانہ پتلی سرخ آؤں والا پانی کا سا، کبھی آؤں خون آمیز ہو، مبرز
میں کھجلی اور جلن (بادی بوا سیرا)
خون ملا پیشاب، قطرہ قطرہ ہوا برف کے مانند سفید تلچٹ نیچے
بیٹھ جائے۔

بارش میں بیگ جانے سے رحم کے فعل میں بگاڑ، کونڈوزن وغیرہ
انسان سے استعارہ عمل اور خروج رحم ہو۔

خشک کھانسی شام سے آدھی رات تک اور صبح جاگنے پر زیادہ
گروں اور پیٹھ کی جھڑکن، چلنے سے کم ہو، منہ چلانے میں دونوں ناک
کے بیچ میں درد ہو۔

عضلاتی بائی کے درد، عرق النسا، بائیں جانب (کالوسنتھ) درد بائیں
بازو میں، قلبی تکلیفات کے ساتھ۔

حاد بیماریاں محرکہ کی صورت اختیار کر لیں۔

دست محرکہ کے آغاز کے ساتھ از خود سخت کمزور ہونے کے ساتھ،

دورانِ پاخانہ نالیوں کے پھیلے حصے میں اور پر سے نیچے تک پھارنے
والے درد۔

فالج ماؤفہ حصص میں سن ہونے کے ساتھ، مرطوب جگہ پر لیٹے
بہنے کے بعد، بجگ جانے سے، وضع حمل، کثرتِ جماع، نوبتی بخار
تپِ محرکہ کے بعد، اغضار کاناالج، پپوٹوں کاناالج۔

زہر باد بائیں سے دائیں کو، آبلے، زرد آبلے، بے حد متورم، جلن
خارش، ڈنک لگنے کے سے درد۔

زیادتی :- طوفان سے قبل، سرد موسم میں، رات کو، خاص کر
آدھی رات کو، سرد چیزوں سے۔

کسبی :- گرمی سے، گرم خشک موسم میں، موہکت لینے سے، گرم چیز
سے، دست آنے سے، پہلو بدلنے سے، ماؤفہ عضو کو جانے سے
معاون :- براؤیوینا

مصلح :- بیلاڈونا، براؤیوینا، کیمفر، مسفر، کانیا

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک نیز ۲۰ طاقت بھی مستقل ہے

نصوصی علامات

- ۱- آنکھیں جلیں، درد کریں اور تھکن ہوں محسوس ہوں، گرم مثل انگاروں کے
- ۲- کانچ نکلے فوراً پانخانہ کرنے پر۔
- ۳- شانہ پر پیشاب کرنے کے بعد بھی بوجھ قائم ہے۔

عام استعمال

یہ دوا آنکھوں کے عوارض نظر کی کمزوری وغیرہ کے علاوہ بڈلیوں، جوڑوں، رحم، شانہ اور مقعد کے بعض عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

سر میں کسی چیز کے چبھ جانے کی طرح درد ہو، شراب خوری کے بعد درد اٹھے، بڈلیوں میں دکھن ہو۔
 نظر کا زیادہ استعمال کرنے سے بصارت کمزور ہو جائے، پڑھنے سے آنکھوں میں تھکن ہو، ڈھیلے درد کریں۔ آنکھیں بوجھل اور جلیں دار۔
 معدہ میں توہنج کا سادرد ہو، سپوں میں گرم شکم جس کے ساقط توہنج اورتے ہو، مقعد پر اس دوا کا خاص اثر ہوتا ہے۔ ناقابلِ جراحی ناسور جو مقعد کے اندر ہوں، اس دوا کے استعمال سے اچھے ہو جاتے ہیں،

پاخاز مشکل سے خارج ہو، بعد وضع حمل پاخانہ کرنے پر کاپیٹنگ، قبض ہو یا آؤں آمیز اسہال آئیں، جھکنے سے خروج مقعد ہو۔ رحم سے جریانِ خون جس کے ساتھ علامات سر اور باؤ گولہ کے دو سے ہوں۔

زیادتی :- لیٹنے سے، ٹھنڈک اور تر موسم میں

معاون :- کلکیر یا فاس۔

مصلح :- کیمیندر

طاقت :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک نیز ۳۰ طاقت مستقل ہے۔

RHODODENDRON

رُودُودِنْدِرِن

تخصوصی علامات

- ۱۔ اعصاب افراد جو آندھی اور طوفان سے خوف زدہ ہو جائیں۔
- ۲۔ دانست کا درد جس میں زیادتی موسم کی تبدیلی سے، آندھی گرج سے یا ہوا دار موسم میں ہو۔
- ۳۔ مختلف اعضا میں پھاٹنے والے، کھینچنے والے ابلی کے درد جن میں زیادتی آرام کے وقت، مرطوب ٹھنڈے موسم میں اور ہوا دار موسم میں ہوا رہتا ہے۔

عام استعمال

وجع المفاصل کی قسم کے درد خصوصاً عصبی مزاج افراد میں ہوں تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ نقرس میں نافع ہے، وجع المفاصل اور سوزاک کے باعث ورم خصیہ اور سوزش خصیہ میں جیکر خصیے کچلے جانے کا احساس ہو، یہ دوا کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایسے مفاسلی دردوں میں خاص طور پر مفید ثابت ہوتی ہے جو آرام کرنے اور طوفان کی آمد سے پہلے شدت اختیار کر لیتے ہیں لیکن طوفان کے بعد انہیں سکون ہو جاتا ہے۔

عمومی علامات

سر میں شدید درد بالخصوص بائیں کنچی میں، درد بدحواس کرے آنکھوں میں یا کانوں میں عضلاتی کمزوری، آنکھ کے ڈھیلے میں ڈر ہو۔ کانوں میں گھنٹی سی سبکتی ہو، کانوں میں آواز کم سنائی دے۔

چہرہ میں عصبی درد ہو، دانت کے عصب مارڈ ہوں اور شدید درد ہو، مرطوب موسم میں دانت کا درد۔

صبح و شام خشک کھانسی، چھاتی میں ہلکا درد ورم و سوزش خصیہ، اینڈیٹن جو رات کو پیڑ ڈنکا اور نیچے ران تک جائے۔

تمام جوڑے متروک ہوں، نقرسی اور مفاسلی درد ہو۔
زیادتی :- طوفان یا آندھی سے پہلے، مرطوب موسم میں رات

اور صبح کے وقت -

کسی :- طوفان کے بعد اگر میہنچانے یا کچھ کھانے سے
طاقت ۱- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک نیز ۳۰ طاقت ہی
متعمل ہے -

RATANHIA

رینٹھیا^ط

تخصوصی علامات

- ۱- حمل کے ابتدائی مہینوں میں دانت کا شدید درد جو لیٹنے سے
بڑھ جائے -
- ۲- تبض جس میں اجابت کے لئے بہت ہی زور لگانا پڑے اور
مقعد میں جلن ہو - (سلفر) -
- ۳- مقعد میں شقاق ہوں یعنی مقعد کٹی پٹی -
- ۴- مقعد میں تکلیف جیسے ران کا نیچے کے کھڑے پگڑے ہوں -

عام استعمال

خاص طور پر پروا سیر میں حسب علامات متعمل ہے۔ علامہ بریٹن کو
بیل ریگریٹ کا لیف میں بھی کارآمد ہے۔

عمومی علامات

صحن کے ابتدائی ایام میں دانت میں شدید درد ہو، دانت لمبا معلوم ہوا لیکن سے درد زیادہ ہوا، مریضیہ اٹھ کر چلنے پھرنے پر مجبور ہو جائے تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

تبعض جس میں پاخانہ بہت سخت آتا ہوا اور کونقنا بہت پڑتا ہو، بواسیری سے باہر نکل آتے ہوں اور مقعد میں جلن اور درد بہت دیر تک رہے (سلفر) انترہیاں ہے جس ہو جاتی ہوں، پاخانہ آنے کے بعد ایسے درد ہوں گویا شیشے کے ٹکڑے مقعد و مبرز میں چبے ہوئے ہیں۔ پاخانہ جانے کے گھنٹوں بعد تک جلن و کونقن بنی رہتی ہو اور درد بھی پھیپانہ چھوٹے تو یہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔

مقعد کے چپٹ جانے کے لئے بھی یہ ایک مفید دوا ہے جب کہ مبرز کی لحمس ہو، درد و پلانے والی عورتوں کی بھٹنی بھپٹ جائے تو اس کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوا ہے (گریفائیٹس، سیپیا) شدید ہچکی میں بھی یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

اس دوا درد ٹینچر کی سریم کئی ایک امراض مقعد میں خارجی طور پر لگانا مفید ہوتا ہے۔

زیادتی :- کھل ہوا میں چلنے سے رات کے وقت طاقت ۲، طاقت سے ۲۰ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

خصوصی علامات

- ۱۔ شراب نوشی کے نتائج بد
- ۲۔ سینہ کی دیواروں میں اعصاب، مغز استخوان کے یا بال کے سوزیاں
چھینے کے سے، تیز اور گول لگنے کے سے درد۔
- ۳۔ پیوریسیس یا نونیا گرم سرد ہو جانے کا وجہ سے (ایکوناسٹ
آرنیکا)

- ۴۔ سینہ کی پسلیوں کے درمیان گوشت میں بال کے درد، سینہ
میں پھوٹے کا سارو، چوٹ کا سارو، جس کی زیادتی پھوٹے سے
حرکت سے یا جسم کو موٹنے سے ہر (برائونیا)

عام استعمال

سینہ اور پسلیوں کے درد میں عام طور پر مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

اس دوا کا اثر گوشت کے ریشہ جات، جلد اور سینہ کی دیواروں
پر ہوتا ہے۔ شراب نوشی سے پیدا شدہ خرابیوں کو دور کرتا ہے۔
دن میں آنکھوں سے دکھائی نہ ملے، آنکھوں کے ماسے دھواں سا

معلوم ہو، واسطی آنکھ پر درد، روشنی برداشت نہ ہو سکے، آنسو بہیں
منقہ قسم کے درد اور دکھن، سینہ کی بیچ کی ہڈیوں و جنسی ہونے
موسوں ہو، پسلیوں کے بیچ کے گوشت میں درد، سینہ میں شانوں
کے بیچ میں گوچن، سانس لینے میں، حرکت کرنے سے زیادہ ہو،
سینہ میں بائی کا درد۔

جلد میں کھجلی، جلن، دانے، نیگیوں آبلے، ہتھیلیوں میں کھجلی۔
زیادتی :- حرکت سے، چھونے سے، مرطوب اور طوفانی موسم
سے، کھل جوا میں، شام کے وقت۔

کسی - آرام کرنے سے

مصالح :- اناکارٹیم، براٹیرینا، کیفر، کلیمٹیس، کروٹن جگ، پیراٹیل،
رٹاکس۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

RUMEX

ریو میکس

تخصّوصی علامات

ا - کھل جوا سے بے مددگی الحس
ب - خشک مسلسل اور تھکا دینے والی سانس جس میں زیادتی ہو یا اسکا
کے تبدیل سے ہو۔

۴۔ خشک سسل اور تھکانے والی کھانسی جس میں زیادتی ٹھنڈی ہوا میں ذرا سانس لینے سے ہو۔ مریض اپنے سر کو بستر میں چھپا لیتا ہے، تاکہ ہوا کو گرم کر سکے۔

۵۔ جلد کے مختلف حصص میں خارش، جب کپڑے اتارتا ہوا جسم ننگا کرتا ہوا ٹھنڈی ہوا لگے۔

عام استعمال

یہ دوا سلی مزاج دانوں کو موزوں تر ہوا کرتی ہے جن کو ٹھنڈی ہوا موافق نہ آتی ہو۔ حلق میں خارش سے پیدا شدہ کھانسی نیز ایسی کھانسی جو حلق کو ذرا سا چھوڑنے سے آتے نیز ہوا کی خفیف ٹھنڈک بھی کھانسی پیدا کرنے کا موجب ہو تو یہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

زبان کے کنارے دکھیں، زبان پر میلی، نرم معدہ پر کوئی سخت چیز رکھی ہوئی محسوس ہو۔ ہچکیاں، تھکی، گوشت کھانے سے بہت ڈکائی اور کھجلی۔

کھانسی، ناک اور ہوا کی نالی سے بلغم نکلے، ٹھنڈی سانس اندر جانے سے کھانسی زیادہ ہو، پیلا بلغم کثرت سے نکلے۔

پانچانہ جھورا، پیلا، صبح کا اسپہال، بستر پر سے پانچانہ کے لئے بھاگ پڑے۔

جلد پر بہت زیادہ کھجلی، خاص کر نیچے کے دھڑ میں جو کہ کپڑا اتارنے

سے زیادہ ہو۔
زیادتی :- شام کے وقت، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے، کپڑے
اتانے سے۔

کھی :- گرم ماحول میں، بستر میں منہ سر ڈھانپنے سے۔
مصلح :- بیلاڈونا، کیمفر، کونیم، فاسفورس، ہیوسمس، لیکے کس۔
طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

RHEUM

ریوٹم

تخصوصی علامات

- ۱۔ بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بوجھ نہلانے کے بعد بھی قائم ہے۔
- ۲۔ دردِ شکم، ہر کھٹے دست کے ساتھ۔

عام استعمال

یہ دوا بچوں کے امراض میں خاص طور پر کام آتی ہے جبکہ وہ دانت
نکال رہے ہوں، بچوں کو دست آتے ہوں ساتھ ہی سرور اور دردِ شکم
کی شکایات لاحق ہوں تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

بچہ کو کھٹی بو والے پانخانے آئیں، سچے بے صبر اور پر جوش ہوا کئی چیزوں کے لئے ضد کرے اور روتے، چہرے پر پسینہ، دال کی زیادتی پیٹ میں تو لہنجی درد، ریاح سینہ کی طرف بڑھیں، مختلف چیزوں کی خواہش کرے مگر پھر کھاتی نہ جاسکیں۔ پانخانہ کے قبل تو لہنجی درد، پانخانہ کے بعد پیٹرو میں کلٹنے کا سادرد۔

زیادتی :- کھانا کھانے کے بعد، حرکت کرنے سے، کپڑا اتارنے سے، رات کے وقت، صبح سونے کے بعد، کپڑا اتارنے سے، سردی سے، پانخانے سے پہلے، دوران میں اور بعد میں۔

کسی :- کپڑے پٹینے سے، گرمی سے۔

معاویہ :- میگنیشیا کارب، اپیکاک۔

مصالح :- کیپفر، کیموٹا، کالمن سونا، رشاکس، نکس و امیکا، پیٹیل۔
طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

ZINGIBER

زنجبیر

خصوصی علامات

- ۱۔ معدہ کے عوارض اگر وہ تیز بوز کھانے سے یا خراب پانی پینے سے ہوں تیزابیت، ریاح کی زیادتی۔
- ۲۔ دمہ جس میں بے چینی نہ ہو اور جس میں زیادتی صبح کے وقت ہو۔ حلق کے نچلے حصہ میں خراش۔

عام استعمال

یہ دوا اضمہ بڑھانے کے لئے، مردی کمزوری اور امراض تنفس میں مفید ہے۔

عمومی علامات

- نصف سر کا درد، سر میں الجھن اور خالی پن معلوم ہو، جنوں پر درد۔
 ناک خشک، ناقابل برواشت کھجلی ہو، سرخ مہاسے ناک پر ہوں۔
 کھانے کا ذائقہ دیر تک محسوس ہوتا ہے۔ معدہ میں تیزابیت توخی
 اسہال، گندا اور خراب پانی پینے سے اسہال، اس کے ساتھ نفخ اور کاٹنے والا
 درد، مزمن اسہال، مبرز سرخ اور سوچی ہوئی، بواسیر گرم، دکھیں اور در کریں۔
 بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب کے سوراخ میں جلن اور نیش زنی
 کاسا درد، پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہو، ٹائیفائیڈ

کے بعد پشیا ب بالکل بند ہو جائے ۔

حلق کے نیچے دکھن ، سانس لینے میں تکلیف ، درد جس میں گھبراہٹ نہ ہو ، صبح کو زیادتی ، حلق میں خراش ، کھانسی ، صبح کو ہنم نکلے ۔
مردوں میں سپاری کی خراش ، خواہش نفسانی زیادہ ، ایسا دل درد کے ساتھ ، احتلام ۔

جوڑوں میں کمزوری ، پیٹھ میں درد ، متھیلی اور تلووں میں تشنج ۔
زیادتی :- چھونے سے ، لیٹنے سے ، حرکت سے ، شام کو ، رات کو ، ٹنڈے مرطوب موسم میں ، روٹی سے ، تہ بوز اور خربوزے سے ، غیر پانی سے ۔

کھی :- کپڑے اتارنے سے ۔
مصلح :- نکس و امیکا ۔
طاقت :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک ۔

ZINCUM METALLICUM

زکم مٹلیکم

تخصوصی علامات

- ۱۔ قوت حیات کی کمی ، دماغی یا اعصابی طاقت نہ ہو ۔
- ۲۔ پاؤں یا ٹانگوں میں رعشہ اور کانپنے کا مسلسل اور شدید احساس ، ان کو مسلسل حرکت دے ۔

- ۳۔ حیض کا ادرار شروع ہوتے ہی مرینڈ اپنی لکھنوں میں کمی محسوس کئے۔
- ۴۔ بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنجی درد، چہرہ میں پیلاہن یا سفیدی کے ساتھ، گرمی نڈار۔
- ۵۔ کتے کی سی جھوک۔
- ۶۔ دیشھ کی تمام لمبائی میں جلن جس میں بیٹھنے سے زیادتی ہو۔

عام استعمال

بچوں کے عوارض میں یہ دوا بالخصوص مفید ہے۔ نیز دماغی اور جسمانی کمزوری اور تشردگی میں بھی یہ دوا نافع ہے۔

عمومی علامات

حافظہ کمزور، بات چیت اور کام کاج کو جی نہ چاہے، مستورات کے عوارض میں بقیاری اور گھبراہٹ۔

بائیں جانب سر گرنے کا احساس ہو، گدی میں درد اور کھوٹھی میں بوجھ کا احساس ہو۔ پیشانی سرد ہو لیکن سر کا پینڈا گرم ہو۔

ناخونہ، موتیا بند، ضعف بصر، پوٹے گریں۔

ہونٹ نڈرد، منہ کے گوشے چھٹے ہوتے، چہرے کی ہڈیوں میں درد۔

جھوک شدید لیکن کھانے سے تسکین نہ ہو، معہ میں درد، نفخ، ریاجی، تڑنخ، پیٹ میں گڑبگڑ، جگر میں دکھن، جھکی، متلی اور صفراواتی، پیشاب پیچھے کی طرف جھبک کر بیٹھنے سے آتے، ہسٹیریا کے ہٹ

پیشاب میں رکاوٹ، کسی قسم کی حرکت جسم سے پیشاب خارج ہو سکت

پاخانہ تھوڑا تھوڑا خارج ہو، بچوں کا ہنسیہ، اسہال کی بندش سے مراد یا
دماغی عوارض۔

نخعیہ متورم، اور پر کو کھینچے ہوئے، انتشار، احتلام، موٹے زہار گر
جائیں، نخعیۃ الرحم میں درد، حیض دیر سے آئے یا کم ہو۔ پستان متورم،
حرام مغز کی سوزش اور پاؤں کی بیقراری۔
سینہ میں کھچاؤٹ اور درد، کوڑی کے نیچے جلن درد اور شیریں اشیاء
کھانے سے کھانسی میں زیادتی۔

زیادتی :- حیض کے دوران، چھوٹے سے، شراب پینے سے، شام
کو یا صبح کے کھانے کے بعد۔

کسی :- کھانا کھانے کے وقت اور طوبت کے اخراج سے۔

معاون :- کلکیر یا فاس۔

مخالف :- کیورمیلا، نکس دامیکا۔

مصلح :- کیفر، ہیرسلف، انگنیشیا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر

خصوصی علامات

- ۱۔ غدو مذی کے بٹھ جانے سے پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ۔
- ۲۔ خواتین میں پستانوں کی نشوونما بہت کم رہ جائے۔ خصیتہ الرحم بڑھے ہوئے ہوں اور چھونے سے درد کریں۔

عام استعمال

خواتین اور مردوں کے جنسی اعضاء کے غدووں کے عوارض کے علاوہ یہ دوا ضعفِ باہ اور عام جسمانی کمزوری میں بھی مفید ہے۔ قوت نشوونما میں مدد دیتی ہے اور جسمانی ساختوں کی تعمیر میں مدد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سرا لہجن بھرا محسوس ہوا، چکر درد سر کے ساتھ، کمزور مریضوں کو دوسرے ہوا، درد ناک کے کمرے کے بیچ تک۔

مردوں میں مذی کے غدو کی تکالیف مذی کا خارج ہونا، خصیوں کے بیٹھے سکتے جاتیں اور قوتِ مردانگی کم ہو جائے۔ مباشرت میں درد ہوا اور اخراج جلد ہو۔

مستورات میں بیضیتہ الرحم میں درد، پستان سگڑے ہوئے، خواہش

جامع بالکل غائب۔

پیشاب کرنے کی حاجت رات کو متواتر ہے، پیشاب بستر پہ
خطا ہو جائے۔ مزمن سوزاک، پیشاب کرنے میں تکلیف ہو۔
ایکایاں آئیں، کھٹے ڈکار، سینہ میں جلن، دودھ پینے کی خواہش
بنغم بگبشت، نزلہ کے ساتھ، مزمن کھانسی۔

مصلح :- سلیشیا، پساٹیل

طاقت :- مدرٹنکچر ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک ایک خوراک ہے،
علامہ برین ۲ طاقت بھی متعلق ہے۔

SARSAPARILLA

سار ساپریلا

خصوصی علامات

- ۱۔ پیشاب کے خاتمہ پر شدید اور قریب قریب ناقابل برداشت درد۔
- ۲۔ پیشاب خون آمیز، چھوٹی چھوٹی کٹکریاں یا پتھری نکلنے مثانہ میں پتھر۔
- ۳۔ پیشاب مقدار میں کم، چھپا، جس میں چھوٹے چھوٹے تار ہوں، جس
میں ریت ہو، مقدار میں زیادہ، بغیر احساس کے نکل جائے۔
- ۴۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے جب مریض بیٹھا ہو۔
- ۵۔ خواتین میں پستانوں کی گھنٹیاں اندر دھنس جائیں۔

عام استعمال

درد گردہ اور سنگِ ثنائہ اور پیشاب کے مختلف عوارض میں اکثر مستعمل ہے۔ علاوہ برسی خون کی خرابی سے پیدا شدہ جلدی امراض میں بھی بیحد مفید ہوتی ہے۔ نیز گھنٹھیا اور آتشک میں بھی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

مردرد یا بڑبڑائیوں کے پردوں میں دردوں کے لئے جبکہ ان کا باعث پارہ کا استعمال ہو یا آتشکی و سوزاکی مادہ ہو۔

آتشک میں پارہ کا بیجا استعمال کرنے کے باعث تمام جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں۔

خارش کی مانند خراش دار خشک پھنسیاں جو کہ موسم بہار میں عموماً اور کھلی ہوا میں لہنے سے نکل آتی ہیں اور پھر پیٹریاں سی بن جاتی ہیں سوزاک مرطوب ٹنڈے موسم سے یا پارہ کے استعمال سے دب گیا ہوا اور اس کے بعد وجع المفاصل کا عارضہ ہو گیا ہو۔

پھوڑے پھنسیوں و ایگز یا اور ٹیک کے بعد ک پھنسیوں کے لئے یہ ایک بیش قیمت دوا ہے۔

زیادتی :- رات کو، مرطوبیت سے، پیشاب کھنکھنے کے بعد، جہاں لیتے ذہنت، موسم بہار میں، حیض کے قبل۔

معاون :- ایلمیم سیپا، مرکبوریس، سیپیا۔
مخالف :- ایک ایٹڈ۔

طاقت :- یہی طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SYZYGIUM JAMB.

سائزیم جیم

خصوصی علامات

۱۔ پیشاب میں شکر کا اخراج

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر فریابٹیس یعنی پیشاب میں شکر آنے کے عارضہ میں ہی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

پیشاب میں شکر کے اخراج کو کم کرنے اور اس اخراج کو روکنے کے لئے یہ دوا ایک متناظرین دوا ہے۔

جسم کے بالائی حصہ پر گرمی وانی نکلنا، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے جن میں بے انتہا کھل ہو۔

بیحد پیاس اور ساتھ ہی کمزوری، پیشاب مقدار میں زیادہ خاصج ہو۔ جس کا وزن مخصوص زیادہ ہو۔

جلد پر پلا تھم تھم یا فریابٹیس کے باعث ہونیوالے زخم

طاقت :- یہ دوا جامن کی گٹھلی کے مغز سے تیار ہوتی ہے مگر اس مغز کا سفوف ہی دس گرین فی خوراک کے حساب سے دن میں تین مرتبہ استعمال کیا جائے تو بھید مفید ہوتا ہے ۔
 در شکر کی صورت میں بھی مستعمل ہے ۔

CICUTA

سائیکیوٹا

تخصیصی علامات

- ۱- تشنجی دورے ، خوفناک بوضعی اور انیٹھن کے ساتھ ۔
- ۲- عفوئی (زچگی) کے تشنجی دورے ، سانس رک جائے اور مردہ معلوم ہو ، جسم کا اوپری حصہ زیادہ تر ماؤٹ ہو جائے ، وضع حمل کے بعد دورے جاری رہیں ۔
- ۳- مٹی اور ناقابل مضمون شیا رک بھید خواہش ۔

عام استعمال

بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنجی دوروں ، گردن توڑ نماز رگ اور رپسوت کے تشنج کے لئے یہ دوا مستعمل و مفید ہے ۔

عمومی علامات

مستویات میں مرگی اور دسٹہ کے تشنجی دورے، دانٹ نکلنے کے زمانہ میں یا پیٹ کے کیڑوں کے باعث سچوں میں تشنجی دورے۔
پڑھتے وقت سرخ متحرک محسوس ہوں یا نظروں سے غائب ہوتے ہوئے محسوس ہوں۔

سوجہ دانٹ نکلنے کے زمانہ میں دانٹوں کو یا مسوڑھوں کو پیسے، جبر سے جھینچ جائیں۔

جسم کے مختلف حصوں میں جھینکے پیدا ہوں، سرگرم۔

دماغ یا ریڑھ کی چوٹیوں کے پلانے اثرات بد کے باعث تکالیف خصوصاً تشنجی، گوشت کے اندر پھانس لگ جانے سے کڑا زہریلے۔

سائیکو لوگ مادہ کے باعث آبلے یا کوتہ جن پر زہر کھڑ بن جایا کر اباروں کے دب جانے سے ذہنی تکالیف۔

زیادتی :- تباکو کے دھوئیں سے (اگنیشیا) چھونے سے، ہوا کے جھونکے سے، چوٹ سے۔

مصلح :- آرنیکا، کانیا، اریسم، کیوریم ایسی ٹیکم۔

طاقت :- ۶ خانہ سے ۲۰۰ طاقت تک۔

خصوصی علامات

۱۔ کتوں کی سی جھوک، پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی جلد جھوک

لگ جاتے

عام استعمال

یہ دوا سچوں کے امعار کی خراش میں مفید پڑتی ہے، نیز پیٹ کے کیرے اور اس کے ساتھ دیگر عوارض، چڑچڑاہٹ، جھوک کی زیادتی، دانت پینا، تشنچ، چلانا، رونا، ماتحتوں اور پیروں میں زردی کے جھکے لگنا وغیرہ۔

عمومی علامات

بچہ نہایت فدی ہو، اور یہ چاہے کہ کوئی اسے گود میں لے کر گھومتا

ہے (کمپوٹا)

سر پر گرانی، سن ہو جانے کے ساتھ، درد سر جھکنے سے کم ہو۔
پتلیاں پھیل جھولتی، اشیاء زرد نظر آتی ہوں، امعار کی خراش کے باعث جھوگا پن۔

مریض مسلسل ناک کو کھجلائے، چہرہ زرد۔
دانت میں درد جو کہ ٹھنڈے پانی سے یا ہوا لگنے سے زیادہ ہو۔

پیاس زیادہ، پورا کھانا کھانے کے بعد۔ بھی مہلک لگی ہوتی ہو۔ میٹھا کھانے کی رغبت، تھے میں بلغم اور کثیرے نکلیں، سبچے ماں کا دودھ نہ پئے۔ پیٹ میں ناف کے پاس چھگی لینے کا سادرو، بچوں کا پیٹ چھوٹا ہوا اور سخت ہوا، جھکیاں آئیں، ایسا محسوس ہو کہ پیٹ میں کوئی کاٹا ہے۔ سفید پانی کا سادست جس میں کثیرے نکلیں، مہرز میں کھلی۔

پیشاب رات کو خود بخود بستر میں ہو جائے، مقنونی دیر رکھے رہنے سے پیشاب دودھیا ہو جائے۔

خشک کھانسی، کالی کھانسی، ضیق النفس، صبح اور شام کو تکلیف زیادہ بخار لرزہ کے سادق اور پیاس کے بغیر اور کبھی پیاس کے ساتھ جس میں پسینہ زیادہ تر چہرہ اور سر میں آئے۔

زیادتی :- صبح و شام، چھونے سے، کھانے کے بعد، کھلی ہوا میں چلنے سے، دبانے سے، گرم موسم میں، دھوپ سے۔

کبھی :- حرکت سے، پیٹ کے بل بیٹھنے سے۔

مصلح :- کیمفر، کیسی کم، چائنا، مرکبوریس۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳ طاقت تک عام استعمال ہوتا ہے نیز

۳۰ سے ۲۰۰ تک بھی مستعمل ہیں۔ ڈاکٹر نیش ۲۰۰ طاقت کو گرم

امداد کے لئے زیادہ مفید خیال کرتے ہیں۔

خصوصی علامات

- ۱- ڈنٹھیر یا، مریض گرم غذا زیادہ آسانی سے نگل سکے۔
- ۲- درد سر بہت زیادہ سوچنے سے۔
- ۳- خشکی تالو اور حلق میں۔

عام استعمال

بیمار کا ہی اور انفلوئنزا میں جبکہ کھل ہوا میں جانے سے بکثرت چھینکیں آئیں اور آنکھوں سے پانی جاری ہو، یہ دوا بہت مفید ہے، نیز حلق کے درد اور لوزین متورم ہوں، مستورات کی غشی جو اس دہم سے پیدا ہو کہ وہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے یا حاملہ ہے۔ علاوہ ازیں اعصابی عوارض میں جو کہ گرم شکم کے باعث پیدا ہوں۔ یہ دوا اکثر اچھے نتائج پیدا کرتی ہے۔

عمومی علامات

بچوں میں کیڑوں کی انگلیات (سائنا، سلیشیا، سپان جیلیا) دورانِ سر، آنکھوں کے جلنے سیاہی، ہر قسم کی بو بہت تیز محسوس ہو۔
 یکایک چھینکیں آئیں اور آنکھوں اور ناک سے پانی بہے۔
 حلق کے درد کا درم جو کہ بائیں طرف شروع ہوا، حلق میں دکھن،

بہت لمبے اور بلغم۔

منہ کا ذائقہ میٹھا، پیاس نہ ہو، میٹھی چیزوں کی رغبت، پیٹ میں
ٹھنڈک معلوم ہو۔ رال ہے۔

حیض بہت دیر میں ہو، حیض ٹھہر ٹھہر کر ہو۔
جلد خشک، ناخن سخت۔

بنجار، سردی نیا وہ محسوس ہو، سر، منہ، ماتھ، پیر ٹھنڈے، آنسو
بکثرت نکلیں، پیاس نہ ہو۔

زیادتی :- ٹھنڈک سے، ٹھنڈی چیز کے پینے سے، پورا چاند چھنے پر
کٹھی :- گرم کھانے سے، گرم چیز سے، لیٹنے سے۔

معاون :- سیپا۔

مصلح :- کیمفر، کونیم، پسا ٹیلا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۴ طاقت تک مستعمل ہے۔

SABINA

سیبنا

تخصوصی علامات

۱۔ رال اور گانا ناقابل برداشت ہو۔

۲۔ کمر میں کھینچنے والے درد چوتھڑ کی ٹہری سے پیر تک۔

۳۔ تکلیفات استطلاق حمل یا قبل اند وقت وضع حمل کے بعد، درد چوتھڑ

کی پٹیوں سے پیڑر کو جانیں۔

۴۔ حیض جس میں درد چوتھڑ کی ہڈی سے پیڑر تک ہو۔

عام استعمال

یہ دو اجزائی خون کو روکنے کے لئے جبکہ خون قد سے غلیظ اور قد سے رقیق ہو نہایت کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ بری عادتِ استسقاءِ حمل، سیلانِ اجض، مشکل سے پیشاب آنا، حاد و مفصلی اور اعصابی درد اور سوزشی سوزاک وغیرہ عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

حیض جلد آئے، بکثرت ہو اور ایامِ دیر تک رہیں، خون قد سے غلیظ اور رقیق ہو، کمر سے لے کر پیڑر تک درد، درینچے سے اوپر کو اٹھے، اندامِ نہانی میں ٹیس مارتے والے درد ہوں، حیض کے دنوں کے علاوہ بھی خون آئے، تیسرے مہینے استسقاءِ حمل کا میلان۔

مرووں میں سوزشی سوزاک، حشقیہ میں جلن، دکھن، مٹکانہ اور پیشاب کی نالی میں سوزش ہو، خون آمیز پیشاب آئے، پیشاب کے لئے بہت زور لگانا پڑے۔

مقعد بھری ہوئی معلوم ہو، قبض ہو، بواسیر جس میں بکثرت خون آئے، تقرسی اور مفصلی عوارض یا مخصوص ایسی عورتوں میں جو رجمی عوارض میں مبتلا ہوں، جوڑوں میں سوزشی درد۔

زلیہ آتی :- گانے بجانے سے، حرکت سے، گرمی اور گرم ہوا سے۔

کھ... ہی :- ٹھنڈی ہوا میں -

معاون :- تھوہا -

مسلح :- کیفیر ، پساٹیل -

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے -

SPONGIA TOSTA

سپانچیا ٹوسٹا

خصوصی علامات

۱- مریض وق کے مزاج والا ہو -

۲- کھانسی خشک ، ہر چیز مکمل طور پر خشک ، بغم کی کہیں آواز نہ ہو -

۳- کھانسی خشک ، سننا بہت کی آواز ، سماعت کٹری میں آ رہ کشی کی

سی آواز ، زیادتی بیٹھی چیزوں سے ، ٹھنڈی چیزیں پینے سے -

۴- کروب میں سیٹی کی سی آواز ، زیادتی سانس اندر لینے سے -

عام استعمال

دل کے کوڑوں کی بیماریاں ، کھانسی جو قلبی عارضہ کی وجہ سے ہو
گلہڑ ، کروب ، بڑا کادی کھانسی ، ورم ، نمونیا ، ذات الجنب ، ورم
حجاب القلب اور سوزش باریطون میں حسب علامات مستعمل اور مفید ہے -

عمومی علامات

تمام ہوائی نالیوں اور خند خشک ہوں، آواز بھاری، منجھو خشک، جلتا ہوا، رکنا ہوا، کھانسی خشک، بھونکنے والی، خناق، کھانسی کچھ پینے کے بعد کم ہو جاتے۔

تنفس وقت سے قبل صبحیہ بخیرہ میں کوئی شے چھپسی ہوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا کھینڈ کا تمام سخت سوس ہو، شب کو اچانک نیند کھل جاتی ہو، اس کے ہمراہ شدید کھانسی ہوتی ہو، جی بہت گھبراتے، سانس وقت سے آتا ہو، سر کو نیچا کر کے لیٹ نہ سکتا ہو، ویسے کے دوران نیند آجاتی ہو۔

سپرٹیک کارڈ (منی کن نالی) سوچی ہوئی اور درد کسے، خصیتین میں درد اور سوجن ہو۔

زیادتی پر اور نچائی پر چڑھنے سے، آندھ سے، آدمی رات سے قبل، سر مٹنے سے، مغزلی ہواؤں سے، تمباکو سے، گرم کمرہ میں، میٹھی اشیاء سے۔ کبھی بہتر نہ سے، سر کو نیچا کر کے لیٹنے سے کھانے کے بعد۔

مصلحہ :- ایجوٹائیٹ، کیمیفور۔

طاقت :- در خشک سے ۳۰ طاقت تک (۲۰۰ طاقت کرپ میں، اور سچی طاقتیں قلبی عوارض میں اور جھپوٹے طاقتیں عام امراض میں مفید ہیں)

سپائی جیلیا

تخصیصی علامات

- ۱۔ جسم ذکی الحس ہونے کے باعث چھونے سے درد کرے۔ جھنکے کو چھونے سے جاڑا محسوس ہو۔
- ۲۔ آنکھوں کے ڈھکیوں میں ناقابل برداشت، دبانے والا درد۔
- ۳۔ آنکھوں میں چھونے سے ذکی الحس
- ۴۔ چہرہ کا عصبی درد، صبح سے غروب آفتاب تک۔
- ۵۔ دانت کا درد تمباکو نوشی سے، جس میں کئی کھانے کے دوران ہو (پٹاشیکو)
- ۶۔ دھڑکن شدید، آنکھ سے دکھائی دے اور خود مریش کو سنائی دے۔

عام استعمال

آنکھوں، دل اور نظام عصبی پر اس دوا کا اثر نہایت واضح ہوتا ہے۔ اینٹیپوسٹریکٹو (مزور غصب) کے عصبی درد میں بیکہ مفید ہے۔ خصوصاً کمزور اور کمزور خون کے شرکار مریضوں کے لئے مفید ہے، ایسے مریضوں کو وجع المفاصل ہوتا ہو اور ان میں نخرانہ پیری مادہ موجود ہو، بڑھتی لگنے کے سے درد بڑھتے ہیں۔ نفسی مادہ میں اور عصبی درد ہوتے ہیں، چھوٹا ناقابل برداشت ہوا، اعضاء کو سردی محسوس ہو، تاہم بدن میں سردی اور سردی، گرم اعضاء کی وجہ سے پیدا

تذہ عوارض وغیرہ میں مستعمل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض ذہنی طور پر تیز نوکسیلی چیزوں کی پن، سویوں وغیرہ سے خوف زدہ

ہوتا ہے۔

ہاکی کی تکلیف قلب کی (ایڈیم، نایا)۔ دل کے اوپری حصہ میں دل کے
کرنے کی آواز۔

اعصابی درد سر، نوتی، صبح کے وقت دماغ میں شروع ہو کر تمام سر
میں پھیل کر بائیں کنچی، ابرو میں سے ہوتے ہوئے بائیں آنکھ میں مجتمع ہو
جاتے۔ (دائیں جانب، سنگو نیریا، سلٹیا، درد تسکن والے، شدید۔
درد سر سوج نکلتے ہی شروع ہوں، دوپہر تک بڑھ جاتیں اور غروب
آفتاب تک جلتے رہیں (ٹوبیکم)

چہرہ کا عصبی درد بائیں جانب کا، نوتی، آنکھ کے گڑھے کا، آنکھوں کا،
جڑے کی ہڈی کا، دانتوں کا، صبح سے غروب آفتاب تک۔

کینسر کا زخم مہرز میں جس میں ناقابل برداشت درد ہو (المیومن)

زیادتی :- حرکت سے، شور و غل سے، چھونے سے، آنکھوں کو حرکت
دینے سے، سر پر چوٹ آنے سے، اندر سانس لینے سے، لٹھکے سے۔
کسی :- آرام سے، سر اونچا کر کے اور داہنی کوٹ لینے سے۔

مصلح :- اورم، کیفیر، کوکولس، پساٹیللا۔

طاقت :- درمگر سے ۲ طاقت تک۔ عصبی عوارض میں ۲ طاقت سے ۳ طاقت
تک سوزش علامات کہتے اسکی علامتیں عموماً عصبی دردوں (نیوریلجیا) میں ۳۰ طاقت زیادہ

خصوصی علامات

- ۱۔ عمل جراحی کے بعد کی تکالیف۔
- ۲۔ گوبانجھیاں، پوٹوں پر یا اوپری پوٹوں پر، یکے بعد دیگرے، چونے بعد سخت گلٹیاں پیچھے چھوڑ جائیں (کوئیم، تھوہا)۔
- ۳۔ دانت کا درد، حیض کے دوران، دانت کھانے پینے کی چیز لگنے سے درد کریں۔
- ۴۔ دانت کناروں پر بوسیدہ ہو جائیں۔
- ۵۔ تباکو کی بے جا خواہش۔
- ۶۔ پیشاب کی نالی میں جلن جب پیشاب نہ کر رہا ہو۔
- ۷۔ بوڑھے افراد میں غدہ نذی کے مراضہ کے باعث پیشاب کر چکنے کے بعد درد۔

- ۸۔ جریان، مریض کی نگاہوں میں شریک پلین اور خطا دہی۔
- ۹۔ کھانسی جس میں تھریک تباکو کے دھوئیں سے ہو (سنبھیا)۔

عام استعمال

یہ دوا غصہ اور اس کے برسے فٹا کج کو دفع کرتا ہے، غصہ کی وجہ سے ہیٹ درد کو دور کرتا ہے۔ نیز مشت زنی کے برسے اثرات، احتلام،

جریانِ منی، کثرتِ مجامعت کے برے اثرات وغیرہ کے لئے نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر سرینین کا حافظہ کمزور ہو، کوئی کام طبعی نہ کر سکتا ہو، غصہ کے برے اثرات، بے قراری، بے چینی اپنے آپ پر قابو نہ ہو۔
زیریں جڑے کے غرور سوچے ہوئے، دانتوں سے پیپ آئے، آنکھ کی پتلی میں آتشکی سوزش، گولہ بخنی۔

سروروں میں قوتِ باہ کمزور ہو، جریان، اختتام، مشقت زنی کے نتائج بد، خصیتین ناکارہ اور سوچے ہوئے جن میں جلن اور ٹونک مارنے کے سے درد ہوں۔

مستورات میں نصیۃ الرحم میں درد، خون حیض بےقاعدہ، دیر سے اور زیادہ مقدار میں آتا ہو، فرج میں خارش اور ٹونک مارنے کے سے درد۔
کھانسی صرف صبح کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد زیادتی، تاسف یا ہتک کے بعد دانت صاف کرنے کے بعد۔

زیادتی: چھونے سے، بوجھ سے، دبانے سے، حرکت سے کھانے پینے سے، غصہ سے، جذبات سے، پیشاب کرنے کے بعد اور پیشاب نہ کرتے وقت۔

معاون: کاسٹیکم، کالوسنتھ۔

مخالف: رینین کولس بلب۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

STANNUM

سٹانم

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض نگیں، ایس، تمام وقت سنتے کی سی حالت محسوس کرے۔
- ۲۔ کمزوری اور غشی سی خصوصاً زینہ اترتے وقت۔
- ۳۔ درد سر، عصب درد آہستہ آہستہ ٹھہریں اور آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔
- ۴۔ دھم کا اپنی جگہ سے گرنا، مریض اس قدر کمزور کہ وہ بجائے بیٹھنے کے کرسی میں گر پڑے۔
- ۵۔ سینہ میں بے حد کمزوری، اس قدر کمزوری کہ باتیں نہ کر سکے۔
- ۶۔ کھانسی، سینہ میں خالی پن کا احساس۔
- ۷۔ بلغم میٹھا یا تلکین۔

عام استعمال

نظام عصبی میں استہانی درجہ کی کمزوری ہو، جسم و جان خستہ و ماندہ ہوں، ہوائی نالیوں اور پیپھیروں میں کمزوری اور درد آہستہ آہستہ بڑھتے اور گھٹتے ہوں۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض اداس، پشیمردہ، مائل بہ گریہ لیکن رمنے سے تکلیف اور بڑھ جائیں۔ مستورات کو زینہ اترنے میں کمزوری محسوس ہو لیکن پڑھنے سے تکلیف نہ ہو۔

مرمن سوزش براز کاوی، ذوق کے آخری درجوں میں جیکہ چھاتی میں بید کمزوری ہونا توانی کے سبب ہونا، گانا، ہنستا یا بلند آواز نکالنا و شور مچانا، کھانسی بلند آواز والی، بلغم بکثرت خارج ہوتا ہے۔ بلغم شیریں، نکلیں، کھٹا یا بدبودار اور سبز پیپ خارج ہوتی ہے۔ کھانسنے اور بلغم نکلنے سے حلق کی خشکی کو آرام محسوس ہو۔
انفول میں تشنچ، رعشہ، نالاج۔

زیادتی :- دائیں جانب لیٹنے سے، گرم شیار پینے سے۔
کسی :- دبانے سے، کھانے سے اور اخراج بلغم سے۔
معاون :- پیاسیلا۔

مصلح :- پیاسیلا۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک مستعمل و مفید ہے۔

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض مسلسل دعائیں، التجائیں اور منتیں وسماجتیں کرے۔
- ۲۔ خواہش کہے روشنی کی اور ساتھیوں کی، اکیلا رہنا برداشت نہ ہو۔ (بسمتھ)۔ زیادتی اندھیکے میں اور تنہائی میں۔
- ۳۔ آنکھیں بالکل کھلی ہوں، چکلدار، پتلیاں بہت پھیلی ہوئی۔
- ۴۔ کسنت۔
- ۵۔ تھے، جوں ہی سرتیکے سے اٹھائے۔
- ۶۔ بہت سی تکلیفات کے ساتھ دردناک درد کا نہ ہونا اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔ (ادیسم)

عام استعمال

نظامِ عصبی اور دعائی علراض میں عام طور پر مستعمل ہے۔

عمومی علامات

دلوانگی، مریض متواتر ہڈیاں بچتا اور شور مچاتا ہے، خطرناک بیہوشی عجیب و غریب ہمیشہ سے خائف رہتا ہے۔
خرداک کا ذائقہ گھاس کا سا محسوس ہو، پیاس کی شدت، صفائی

اور بھئی تھے۔

صبر البول، مشائخ خالی ہو۔

مردوں میں خواہشیں جماع حد سے زیادہ ہو اور بخش خیالات میں غرق ہے۔ عورتوں میں پر سوتل جنون جبکہ نفاس کم خارج ہر مختلف قسم کے وہم آئیں، اعصابی آکساہٹ و بقراری۔

درجہ جبکہ اعصاب متورم ہوں۔

سرخیاؤں میں دماغی علامات واضح ہوں، تپ محرقہ صبر البول ہو۔

پسینہ بکثرت، لیکن بنجار میں تخفیف۔

زیادتی :- چھونے سے، دبانے سے، حرکت سے، ہوا سے، ٹھنڈک سے

شام کے وقت، اندھیرے میں، چکدار چیزیں دیکھنے سے، دھوپ

میں، اکیلے ہونے پر۔

کسی :- گرمی سے، روشنی میں۔

مخالف :- کانٹا۔

مصلح :- بیلا ڈونا، کیمفر، نکس و امیکا، اوپیم، پلسٹیل۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱- غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک درد۔
- ۲- تمام تکلیفات یا علامات رات کے وقت بڑھ جاتی (مرک)
- ۳- سیلان الرحم، مقدار میں زیادہ کپڑوں سے بہ نکلتے۔
- ۴- سر کے بال گریں۔
- ۵- بے جا خواہش شراب کی، کسی ہی شکل میں۔

عام استعمال

آتشک زہر سے ہونے والے امراض کے علاوہ دیگر متعدد عوارض میں حسب علامات مستعمل ہے۔

عمومی علامات

حافظہ کمزور، کتابوں، اشخاص اور جگہوں کے نام بھی یاد نہ رہیں۔ حساب کے سوالات حل کرنا مشکل ہو۔

درد سر، سر کی پٹیوں میں درد، سرسام، بال گریں۔

دوشنی برداشت نہ ہو، آنکھوں سے پانی بہے، رات کو دوریں زیادتی۔

تنگ کی ٹہری ہیں سٹرن ، تالو میں سوراخ ، زبان میں ٹنگاٹ رال کثرت
عرق الناسر جو رات کو زیادہ ہو ، شانہ کے جوڑوں یا انگلیوں کی گانٹھوں
میں منفاصلی درد ۔

خواتین میں فرج کے لبوں پر زخم ، سیان رحم کثرت ، پیلا ، پانی کا
سا ، اس کے ہمراہ بھیتہ الرحم میں درد ۔
موسم گریا میں مزمن درد زور کرے ، خشک کھانسی رات کو زیادہ ہو
جلد پر سرخ ، بھوٹے بدبودار دانے ۔

زیادتی :- رات کو ، گرمی میں ، ساحل سمندر پر ۔
کٹھی :- دن میں ، آہستہ آہستہ گھومنے پھرنے سے ، خشکی پر
پھاڑوں پر ۔

طاقت :- ۲۰ طاقت سے ہزار طاقت عام طور پر مستعمل ہے ۔
اوسچی طاقت ہی مفید ثابت ہوتی ہے اور اس کی خود کھیں بار
بار دہرائی نہیں چاہئیں ۔

خصوصی علامات

- ۱۔ کھڑے ہونا سلفر کے مریض کے لئے ایک بدترین وضع ہے، سلفر کے مریض کھڑے نہیں ہو سکتے۔
- ۲۔ میلے کھیلے لوگ۔
- ۳۔ تکالیف میں ہمیشہ غسل کے بعد زیادتی۔
- ۴۔ بچے نہلایا جانا یا منہ لانتھ دھویا جانا پسند نہ کریں۔
- ۵۔ جب بہترین منتخب شدہ اوویہ اپنا تسلی بخش اثر دکھانے سے قاصر رہیں۔
- ۶۔ تکالیف مسلسل بار بار عود کر آئیں۔
- ۷۔ احساس جلن کا جسم کے مختلف حصص میں۔
- ۸۔ مسلسل حدت اور گرمی چاند میں، رات کے وقت تلووں میں جلن کے ساتھ۔
- ۹۔ دست صبح سویرے بستر سے جھگائیں (الیو، سویریم)
- ۱۰۔ قبض، پاخانہ بڑا اور درد بھرا، بچہ درد کی وجہ سے پاخانہ پھیرنے سے ڈرتے۔
- ۱۱۔ پیشاب اور پاخانہ جہاں سے گزریں ان حصص پر درد ہو۔
- ۱۲۔ مقعد کے گرد سرخی اور جھلین، جسم کے تمام مخارج بہت سرخ۔

عام استعمال

سب سے بڑی وافع جمر بیہ دو اس ہے۔ اس کا استعمال امراض کو اندرون جسم سے باہر سطح پر لاتا ہے۔ یہ جسم کے ہر رگ و ریشہ پر اثر کرتی ہے اور متعدد امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے زیر اثر اخراج خواہش پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اعصاب پر اثر کرنے سے منو بے قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ خاص کر ان مزمن امراض میں مفید ہوتی ہے جن کا آغاز گلیٹیوں سے ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم ہمت، بد مزاج اور رشتے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سر میں چکر، بعض دفعہ کل سر میں بوجھ، عموماً رات کو زیادہ۔ در دہر ہر ہفتہ یا دو سر سے ہفتہ ہوا کرے۔

آنکھوں میں گرمی، جلن اور سرخی، چوٹے متورم۔

نکسیر، ناک میں خشک زخم یا پیسٹریاں۔

زبان سفید، کٹے اور ٹوک سرخ، حلق میں رکاوٹ۔

معدہ میں کمزوری، خالی پن یا بیٹھنے کا احساس قبل دوپہر۔

قبض بہت جلد جلد۔ مقدار میں زیادہ اور زیادہ دنوں تک رہے۔

پھوٹے یکے بعد دیگرے نکلیں، خارش جو بہتر میں بڑھے۔

بواسیر جس کا علاج خارجی مریضوں سے ہوا ہو۔

دری کیفیات اندرونی یا بیرونی مختلف حصص کی۔

زیادتی بہ آرام سے، جب کھڑا ہو، بستر کی گرمی سے، نہانے سے،
 موسم کی تبدیلیوں سے (رسٹا کس)
 کسی بہ خشک گرم موسم میں، واہنی جانب لیٹنے سے۔
 معاون :- ایجنٹائٹ، بکس و امیکا، پلساٹیل۔
 مصلح :- ایجنٹائٹ، کیمفر، کمیوٹا، چائنا، مرکپوریس، پلساٹیل،
 رسٹا کس، سیپا، سلیشیا، تقو جا۔
 طاقت :- درٹنگچر سے ۳۰ طاقت تک نیز ۲۰۰ طاقت اور اوپر۔
 نوٹ :- کلکیریا کے بعد سفر نہیں دینا چاہیے)

سلیشیا

SILICEA

خصوصی علامات

- ۱- تخا زیری مزاج وہ بچے جن کے سر بڑے ہوں، تالو کالے ہوتے اور پیٹ
 پھولا ہوا۔
- ۲- ویرینہ درد سر گردن کی پشت سے شروع ہو کر چاند کو جاتے۔
- ۳- قبض ہمیشہ حیض کے قبل اور دوران حیض۔
- ۴- پاخانہ مشکل سے ہو جیسے مہزہ کی نا اہلیت سے ہو۔
- ۵- پاخانہ کا کچھ حصہ باہر نکل کر پھر اندر لوٹ جاتے (تقو جا)
- ۶- شرمگاہ کی نالی سے خون کا سیلان ہر مرتبہ حیض کے پستان منہ میں سے۔

۷۔ ہاتھوں، پاؤں کی انگلیوں، پاؤں اور نعل کا بدبو دار پسینہ۔
۸۔ علامات میں سستے چاند کے دوران زیادتی ہو۔

عام استعمال

پپ والے عوارض میں عام مستعمل ہے۔ چھوٹی طاقتیں پپ کو جلد
پکا کر خارج کرتی ہیں اور اونچی طاقتیں پپ کو نیشک کر کے اندمال
میں مددگار ہوتی ہیں۔

علاوہ بریں ناکافی نشوونما سے بدن، خنازیری مزاج والے بچوں کا مرض
سوکھا، حرارت، عزیز سی کا کم ہونا، سرخی جھٹ لگ جانا، ٹیکہ لگانے
کے برے اثرات مابعد وغیرہ بھی اس دوا کے مقتضی ہوتے ہیں۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض اعصابی، چڑچڑاہٹا ہے، بے چین، پریشان اور حلیم۔
نڈا پوسے، طور پر جزو بدن نہ بنے۔ سیدھا تھکاوٹ اور کمزوری
ناسور، مقعد کیے بعد ویکھے سینہ کی علامات کے ساتھ (بہ بریں)
پستان کی گھنٹی اندر کی طرف کھینچ جائے (سار سا پریلا)
جلد غیر تندرست، ہر چھوٹی سی ضرب پک جائے (گریفائٹیس، سپر
مرک، ایٹرولیم)

ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ٹیڑھے (انیمیم کردوٹ)
آنکھوں کا ناسور، پاؤں کے ناخن گوشت میں گھسن جائیں، بسہری
پوشے جن میں مضمض خون ہو، کار شگل، سرطان، ناسور، مقعد میں شکاف۔

یہ دو اجسامانی ریشوں میں سے غیر جسمانی اشیاء کو خارج کرنے میں بھی مثلاً مچھلی کا کاناٹا، سویاں، پڈھی کے ٹکڑے۔
 زیادتی :- ٹنڈک سے، حیض کے زمانہ میں سننے چاند کے دنوں میں کپڑا اتارنے سے، خاص کر سر پر کپڑا بٹانے سے
 کبھی :- گرمی سے، خاص کر سر پر کپڑا لپٹنے سے، سولے پیٹ کی علامات کے جلد دیگر علامات گرمی سے کم ہوتی ہیں البتہ پیٹ کی علامات میں ٹنڈی اشیاء کھانے پینے سے تخفیف ہوتا ہے۔
 معاذن :- سخو جا، سکویلا، گریفائیٹس، فلورک ایسڈ، ہیرپلفر۔
 مصلح :- کیفیر
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک نیز اونچی طاقتیں۔

SAMBUCUS NIGRA

سمبوس نائیگر

خصوصی علامات

- ۱- چھوٹے بچوں کا خشک نزلہ۔
- ۲- بچہ اندر سانس کھینچنے کے لیکن باہر نہ پھینک سکے۔
- ۳- بنجارہ جسم پر کسی قسم کی نمی کے بغیر، جب مریض سوتا ہو۔
- ۴- پسینہ کی زیادتی تمام جسم پر جاگنے کے دوران۔

عام استعمال

یہ دوا خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے اعضاء متنفس کے عارض میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

بچوں کا خشک نزلہ، ناک بلغم سے بند ہو، بوڑھے افراد کا دم، اس دوا کی تکالیف کے ساتھ عموماً پسینہ کی زیادتی ہوتی ہے۔ آواز بیٹھتی ہوئی، حلق میں لیس دار بلغم، تشنج کھانسی آدھی رات کے قریب آئے اور اس کے ساتھ سانس کی تکلیف، کھانسی کے باعث چہرہ نیلا ہو جائے۔

تورنج، منلی، نفع کے ساتھ اور بار بار پینکالین دار پاخانہ۔

ہاتھ نیلیوں، ٹانگوں اور پیروں کی سوجن، پیربرٹ کے مانند سر بلکنے کی حالت میں کل جسم پر پسینہ۔

زیادتی :- آرام کی حالت میں، پھل کھانے کے بعد۔

کسی :- بستر پر اٹھ کر بیٹھنے میں، حرکت کرنے میں۔

مصلح :- آر سیٹیم البم، رشاکس، کھنفر۔

طاقت :- دہائیچر سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

خصوصی علامات

- ۱- چھین والے درد جیسے نوکدار شیار چھب رہی ہوں۔
- ۲- ہڈیوں کے پردے تک پہنچے ہوئے برونی زخم۔

عام استعمال

عام طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے متعلقہ عوارض میں یہ دوا مستعمل ہے ایسے زخموں کے لئے جو کہ ہڈی کے پردوں تک پہنچ گئے ہوں، یا جب ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑتی نہ ہو یا جب ہڈی کالی ہو گئی ہو اور اس کے بعد درد ہوتا ہو یا جب ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دونوں سرے درد کرتے ہوں تو یہ دوا کارآمد ہے۔

عمومی علامات

چوٹ آنے کے باعث ہڈیوں یا ان کے غلاف کی تکالیف، عمل جراحی کے بعد ہڈی کا کٹا ہوا سر اور دوسرے اور ہڈی کے غلاف میں چھین ہوا ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سرے پورے طور پر نہ جڑے ہوں، ٹنکستہ ہڈی کا سر درد کرے۔

چوٹ آنے کے باعث آنکھ میں درد۔

طاقت :- در ٹیچر ایک دس قطرے تک یا ۱ x ۱ x ۳ یا ۳۰ طاقت
زخموں اور خراش مقعد کے لئے خارجی طول پر بھی اس کا نوٹن مستعمل ہے
(ایک حصہ در ٹیچر اور تین حصے پانی)

CIMICIFUGA

سمی سی فیوگا

(دیکھتے اکثر ایسی موسا)

SANGUINARIA

سنگونیریا

خصوصی علامات

- ۱۔ نوبتی درد سر جسے نیند سے کون ہو۔
- ۲۔ درد سر جو گدی سے شروع ہو۔
- ۳۔ درد سر جو سن یاس کے زمانہ میں عود کر آئے۔
- ۴۔ چہرہ کا اعصابی درد جس میں بعد دوپہر رخساروں پر چمکدار سرخی ہو۔
- ۵۔ دل منے باز اور کندھے میں بالی کے درد۔
- ۶۔ کھانسی خشک جس کے ساتھ گالوں پر چمکدار سرخی ہو۔

عام استعمال

یہ دوا داسنی طرف کے حصّہ جسم پر اثر کرتی ہے۔ خاص کر بلغمی جھلی پر اور وہ عین سینہ کی بلغمی جھلی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

عمومی علامات

چہرہ کا اعصابی درد، اور دلے جڑے سے تمام اطراف میں پھیلے ان مقامات پر درد جہاں گوشت کم ہو مثلاً پیٹلی، ہاتھوں کی پشت، نرخرہ اور غذا کی نالی میں جلن۔

حجرہ میں یا ناک میں بدگوشت (سنگوئیر یا نائٹریٹ، سوئیم) سن یا س کی تکلیفات

درد زکام کا ہی کے بعد جس میں زیادتی خوشبو سے ہو۔

نوجوان لڑکیوں یا عورتوں کے چہرہ پر ابھار۔

زیادتی :- میٹھا کھانے سے، دامتیں پہلو میں حرکت کرنے سے، پھپھونے سے۔

کسہی :- تمرش اشیا سے، اندھیرے میں۔

معاون :- اینڈومٹرائٹ۔

طانت :- مدرتھ کے چر سرد میں اور ۶۴ جڑوں کی تکالیف میں۔

خصوصی علامات

- ۱- مزمن امراض میں اچھی منتخب شدہ اور یہ تسلی بخش فائدہ نہ کریں۔
- ۲- بھید کمزوری جو حاد امراض کے بعد باقی ہے۔
- ۳- نہانے کے بعد بھی جسم سے گندی بو آئے۔
- ۴- جسم کے مختلف حصوں جلد موری یا ضرب کھا جائیں۔
- ۵- بھید کی الحسی ٹھنڈی ہوا سے یا موسم کی تبدیلی سے۔
- ۶- دورے سے ایک دن قبل غیر معمولی طور پر بہتر محسوس کرے۔
- ۷- تمام اخراج سڑے ہوئے گوشت کی سی بو والے ہوں۔
- ۸- بھوک آدھی رات کے وقت تھائے۔
- ۹- جلد پر خشکی، سستی، پسینہ نہ آئے۔ قتل۔

عام استعمال

یہ دوا سورک مزاج افراد کے لئے خصوصاً مفید ہے۔

عمومی علامات

کھجلی جس میں گرمی سے زیادتی ہو، کھجانے سے خون نکل آئے۔
انگلیوں کی گھاٹیوں اور جوڑوں میں کھجلی، دانے بار بار پیدا ہوں۔

دوسرے جس کے دوران بھوک محسوس ہو، کھانے سے متلی۔
 کھوپڑی میں پک جانے والے اُبھاروں کے کھنڈ، جو میں ٹرے ہائیک
 کان پر تڑپتی ہوئی، لیس وارماک سے والی (گریفائٹس) کان بیٹھا تیار
 خارش پیدا کرنے والا سخت متعفن سیلان۔
 کیل ہر قسم کے۔

حاملہ عورتوں کی متلی جیکر عمدے سے عمدہ دوا فائدہ نہ کرے۔
 زیادتی بہ قہوہ سے، موسم کی تبدیلی میں، گرم دھوپ میں سردی
 سے، ٹھنڈے ہوا کے جھونکے سے۔

کسی :- گرمی سے، گرم کپڑے پہننے سے، موسم گرمیوں میں بھی
 گرم کپڑوں سے سکون ملے۔

معاون :- سلفر، ٹیوبوہ کسولائٹم۔

مخالفا :- کونیم، لیکے ٹیس، اسپیا۔

مصلح :- قہوہ۔

طاقت :- ۳۰ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

(جلدی جلدی خوراک دہرائی نہ چاہیے۔)

خصوصی علامات

۱۔ تلی کی مزمن یا حاد تکالیف۔

عام استعمال

یہ دوا بالعموم تلی کے عوارض میں ہی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

تلی بڑھی ہوئی، تلی کا ورم، بائیں جانب درد ہو، جگر اور تلی کی خرابی کے باعث خون کی کمی، بائیں جانب پسلی کے نیچے درد کے باعث بائیں کمرٹ لیٹا جا سکے، جگر اور پیٹھ میں درد، تلی کی نسی یا پرانی تکالیف کے باعث چہرہ زرد، بھوک کم، سبھاہ

پیشاب تیز، پھینے دار جس میں سلفرازوٹسکرم موجود ہو، پیشاب کی بار بار حاجت۔

اسہال، پیٹ اور مقعد میں بوجھ۔

حیض بکثرت، سیلان الرحم زرد رنگ کا ہو۔

زیادتی بد حرکت سے اور بائیں جانب لیٹنے سے۔

مصلح :- نرگم مسودہ

طاقت :- مد رنگ اور چھوٹی طاقتیں نیز ۲۰ طاقت ۔

SEPIA

سیا

خصوصی علامات

- ۱۔ درد مہر جو پیٹھ کی طرف جائے ۔
- ۲۔ بے حد غمگینی اور رونے کا میلان ۔
- ۳۔ لاپرواہی ان سے بھی جن سے بہترین پیار ہو ۔
- ۴۔ درد سر حیض کے زمانہ میں سیلان کی گھٹی کے ساتھ ۔
- ۵۔ بالوں کا بری طرح گزنا ۔
- ۶۔ ناک کے اوپر گالوں تک پھیلی ہوئی زردی ۔
- ۷۔ زبان گندی جس سے بو آئے ۔
- ۸۔ لگم اور اندام نہانی میں بوجھ اور نیچے کی طرف دباؤ کا احساس جیسے ہر چیز پڑے سے نکل کر باہر جا پڑے گی ۔

عام استعمال

سیا خاتین کے عام امراض کی مخصوص ترین ادویہ میں سے ہے ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریضہ پر گھبراہٹ ہوتی ہے، بے خیال، گھر کے کام کاج سے نفرت، از حد منہموم، متفکر اور مایوس، ہر ایک شے سے بیزاری۔
 رحم میں درد، پیڑوں کے عضلات میں ٹڈھال کر دینے کی سہی تکلیف
 بچے کی طرف شدید دباؤ، مدھم بھدی درد بالخصوص بائیں خصیتہ الرحم میں
 محسوس ہوا، رحم ٹکنے کے ساتھ اجتماع خون ہوا اور زوس سیلان الرحم آتا ہوا
 رحم بائیں جانب ٹکلا ہوا جس کے باعث بائیں زیریں دھڑ میں خرد اور درد ہو
 دائیں جانب لیٹنے سے آرام، فم رحم مچھونے سے درد گرسے، خون حیض
 بہت جلد جلد کبھی مقدار میں کم اور کبھی بہت زیادہ، قبل از حیض
 سیلان الرحم زرد، دودھیا، خراش دار، پیپ کی طرح بدبو دار، جاتے
 مخصوص میں دکھن، حیض بے قاعدہ اور درد کے ساتھ صبح کے وقت
 جی ٹکلاتے۔

زیادتی :- قبل دوپہر، شام کے وقت، نہانے سے، مرطوبیت سے،
 بائیں جانب ٹھنڈی ہوا میں، آندھی اور گرج سے قبل، پسینے کے بعد
 کبھی :- ورزش سے، دبانے سے، بستر کی گرمی سے، گرم چیزوں
 کے لگانے سے، اعضاء کھینچنے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے
 سے، نیند کے بعد۔

معاون :- نیٹرم میور، نیٹرم کارب، نکس و امیکا، سباڈیلا، سلفر۔
 مخالف :- بران اوٹیا، لیچے کس۔
 مصلح :- ایچوٹائیٹ، اینٹیم کروٹو، اینٹیم مارٹ، رشاکس، سلفر۔

طاقت :- ۱۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔ نیز
۲۰۰ طاقت بھی استعمال ہوتی ہے۔

چھوٹی طاقتیں بار بار دہرائی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ تر اونچی طاقت
کا استعمال زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اونچی طاقتیں جلد جلد دہرائی
نہ جائیں۔

SECALE COR.

سیکیل کار

خصوصی علامات

- ۱۔ مریضائیں جو دہلی پتلی بیماری سے تباہ شدہ، کمزور ہوں اور جن کے سرکے
سے بیماری ٹپکے۔
- ۲۔ مستورات ہر چیز ڈھیلی اور کھلی محسوس کریں، خون کی نالیوں میں ٹھیلپان
- ۳۔ چھوٹے، چھوٹے درد بھرے، سبز مواد کے ساتھ۔
- ۴۔ جلد چھپونے سے ٹھنڈی محسوس ہوتا نام مریض اور صفا برداشت نہ کرسے۔
- ۵۔ دوران وضع عمل ہر چیز ڈھیلی اور کھلی محسوس ہو لیکن باہر نکالنے کا فعل
نہ ہو۔

عام استعمال

یہ دوا ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جن کے گوشت میں سکڑن پیدا

ہو رہی ہو، جھریاں پڑ رہی ہوں، خون کی کمی ہو، سردی بہت محسوس کریں،
اعضائے بدن ہوں یا ان میں جھنجھاہٹ یا چوٹیٹیاں رہنے لگنے کا احساس پایا جائے
اور خون متواتر ہوتا ہے، تیز اور زیادہ سیاہ خون نکلے۔

عمومی علامات

سیلان خون کی طبیعت، معمولی زخم سے بھی سفید خون بہا کرے۔
(لیکے کس، فاسفورس)

ایکویڈیا (سیلان الرحم) سبز، بھورا، متعفن
دست مقدار میں زیادہ، پانی کے سے، متعفن، بھوسے (کروٹن بلک)
پیشاب از خود نکل جاتے، بوڑھے آدمیوں کا پیشاب، رکابوا۔
جن جسم کے تمام حصوں میں جیسے آگ کی چنگاریاں ہوں۔
حیض بے قاعدہ، مقدار میں زیادہ، سیاہی مائل تپے۔
استسقاء حمل کا خطرہ یا استسقاء تیسرے مہینہ میں۔
پستانوں میں دودھ پوسے طولہ پر نہ بھرے۔
زیادتی:- گرمی سے، گرم کپڑا اوڑھنے سے۔
کٹھی:- ٹنڈرک سے، کپڑا اتار لینے سے، ملنے سے، عضو پھیلانے سے
مصلح:- کیپڑا اوپیم
طاقت:- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

SELENIUM

سلیمنیم

خصوصی علامات

- ۱- قبض، پاخانہ بڑا اور سخت جسے خارج کرنے کے لئے انگلیاں استعمال کرنی پڑ جائیں۔
- ۲- مسلسل ایسا دگی بغیر شہوت کے، خودواور کھینچے ہوتے۔
- ۳- آواز زیادہ استعمال کے بعد بیٹھ جائے۔

عام استعمال

اس دوا کا خاص اثر اعضائے تناسل اور بول پر ہوتا ہے، سن رسیدہ لوگوں کے ضعفِ باہ اور اخراجِ مذی میں کارآمد ہوتی ہے، بڑھاپے میں داعی اور جسمانی تقاہت جلد ہو جایا کرے۔ یا کسی کمزور کر نیوالے مرض کے بعد کی تقاہت میں بڑی مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

نورسہنی طور پر خیالات، جماع کی طرف راغب لیکن نامردی ہو۔
بال گر جاتیں سر کے، ابرو کے، مونچھوں کے اور آلاتِ تناسل کے۔
پیشاب سرخ گہرے رنگ کا، مقدار میں کم۔

کمزوریا، سرریض و ماغی یا جسمانی محنت سے جلد تھک جاتے، لاغری۔
 کمزوریا کے باعث خود بخود اخراج منی ہوا کرے، جربان، احتلام
 زیادتی:- سونے کے بعد گرم موسم میں، کونین کھانے سے، گرم
 ہوا سے، چائے پینے سے۔

کسی :- ٹنڈک سے، ٹنڈکے موسم سے، طاقت سنجش پینز کھانے
 معاون :- کیلیڈیم، نیٹرم کارب، فاسفورک ایسڈ، سٹانی سیگریا۔
 مخالف :- چائنا، شراب
 مصلح :- اگنیشیا، پساٹیللا

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SANICULA

سنی کولا

خصوصی علامات

- ۱۔ لاغری مسلسل بڑھتی رہے، سچے بوڑھا دکھائی دے، میلا، چکنا اور
 بلاؤن نظر آتے۔
- ۲۔ گردن کے گرد کی جلد پر بل دار جھریاں ٹیڑھ جاتیں۔

عام استعمال

دوسری متعدد ادویہ کی علامات اس دوا میں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے

کسی کسین میں جیب دوسری منتخب دوانا کام ہے تو حسبِ علامات
یہ دوا مستعمل ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سچہ بہت ضدی، چڑچڑا اور غصیلہ۔

کھوپڑی پر، ابرو میں اور وارھی میں بکثرت بھوسہ ہو۔
کان کے پیچھے درد اور کان کے پچھلی طرف کی جڑ سے لمبی لہ
رطوبت خارج ہوتی ہے۔

متل اور تے گاڑھی یا موٹہ پر چڑھنے سے۔

یشاب اور پاخانہ از خود خارج ہو جاتا ہو۔

تقبض جس میں پاخانہ کا اخراج بہت مشکل سے ہو۔

دست مڑے ہوئے انڈے کی طرح جھاگدار دستوں کی نوعیت

اور رنگت بدلتی ہے۔

مقعد کے قریب شگاف جو بڑھ کر آلات تناسل تک پھیل جائے

سیلان الرحم پھیلنے کی ہی بو والا۔ پیڑو اور رحم کے مقام پر کمزوریاں

ایسا لگے جیسے ہر عضو باہر نکل پڑے گا۔

پاؤں کے پسینے انگلیوں کے درمیان اور پھوڑے کا سارو۔

پاؤں کے نموں میں جبن

طاقت ۳۰ طاقت اور اس سے اونچی طاقتیں مستعمل ہیں۔

خصوصی علامات

- ۱- جلن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مثلاً دونوں کندھوں کے درمیان -
- ۲- وردپیلی کی ہڈیوں کی درمیانی جگہ میں، ہاتھیں جانب کرٹ سے بڑھے -
- ۳- کمزوری، خالی بن کا احساس تمام شکم میں
- ۴- آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
- ۵- دست، جیسے ہی کوئی نفلد پاخانہ کی نالی نہیں پیچھے، احساس جیسے مقعد کھل رہی ہو -
- ۶- کھانسی، ہاتھیں کرٹ لینے سے -

عام استعمال

یہ دوا بالعموم لمبے، دلے، دموی مزاج افراد پر زیادہ مستعمل ہے، جن کی جلد خوبصورت ہو، پلکیں نازک اور بال طاقم اور بھوسے ہوں۔ ذہنی طور پر تیز فہم اور بہت فکری احساس ہوں -

عمومی علامات

ذہنی طور پر سرخیں کم سمیت، چونک پڑنے کی عادت، کام کرنے

کو جی نہ چاہے، یادداشت خراب ہو۔

صبح بیدار ہونے پر یا بیٹھے ہوئے اٹھنے پر دلچسپی آئیں، میٹھا

میٹھا درد سر۔

آشوب چشم، جلن دار اور کھلی والا، پوٹھے پیچھے رہیں۔

کانوں میں زرد کی جھنجھناہٹ، سماعت کم ہو جائے۔

کھانے کے فوراً بعد بھوک، کھانے کے بعد بہت سی خالی ڈکارتیں

کبھی تبصر، کبھی دست، جو صبح کو زیادہ ہوں، سبز آؤں کا پاجانہ

یا تپلا، سفید یا خون ملا پاجانہ۔

پیشاب بھورے رنگ کا، نیچے ریت جم جائے۔

مردوں میں جماع کی خواہش جو روکے سے نہ سکے۔

عورتوں میں حیض نہایت جلد اور قلیل ہو، چھلتا ہوا لیکوریا۔

کھانسی جس میں زنگ آکر اور بغم نکلے۔

ران اور پیر کے انگوٹھوں کا سن ہو جانا، ہاتھ میں رعشہ۔

سنگار لہزہ کے ساتھ۔ سردی بہت محسوس ہو۔

زیادتی بہ چھوٹے سے، مشقت سے، گرم غذا سے، موسم کی تبدیلی

سے، جھجک جانے سے، بائیں کروٹ لیٹنے سے، آندھی سے،

زینہ چڑھنے سے۔

کسی بہ اندھیرے میں، دائیں کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈی غذا سے،

کھل ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، نیند سے۔

معاونہ :- آر سینکیم البرم، ایلیم سیپا، کارل بورجی، آپیک۔

مخالف :- ایس، کاسٹیکیم۔

مصلح :- آرسینکیم البوم، کلکیریا، کینفر، کانیا، بکس و امیکا، سیپا۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ اور اوپر۔

PHYTOLACCA

فائٹولاکا

خصوصی علامات

- ۱۔ ڈنقیریا، حلق میں جلن جیسے آگ کے انگارے، یا گرم سرخ لوبے سے جو، خشکی۔
- ۲۔ پستانوں میں سخت ہونے کی رغبت، پستان پتھر کے سے سخت اور درد ہے۔
- ۳۔ درد پستان کی گھنڈیوں میں سے نکل کر تمام جسم میں جا میں۔
- ۴۔ پستانوں کے ناسور، منڈل نہ ہونے والے زخم۔
- ۵۔ پستانوں کی گھنڈیوں میں ذک الحسی، پھوٹے کا سادرد اور شکاف۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر حلق اور پستانوں کے عوارض میں مستعمل ہے، علاوہ
 بریں آتشکی تکالیف، بڈلیوں کے غلاف کے مفصلی درد اور عرق النسا
 وغیرہ میں بھی نافع و کارآمد ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض زندگی سے مایوس اور غمگین۔

گردن کے غدود سوجے ہوئے، حلق میں جلن جیسے جلتی ہوئی گولہ رکھی ہے۔ حلق میں سیاہ رنگ کی جھوٹی جھل پیدا ہو جائے، حلق میں زخم، حلق کے غدود پھولے ہوئے، گردن کی داہنی جانب کے غدود سخت۔

مہرز میں شگاف، گرمی میں میٹھا میٹھا درد اور دکھن، پیشاب کا رنگ سیاہ، برتن میں جھوٹے رنگ کے حصے پڑ جائیں۔

سوزاک، آتشک، اعضائے تناسل پر زخم، پستان میں درم، سوجن، مواد پڑ جانا، پستان کے غدود سخت ہوں اور درد کریں۔

بائیں گھٹنے میں بائی کا درد، انگلیوں کے پور سوجے ہوئے، سخت اور جھک نار ہوں۔ بائیں کولیسے میں برانا بائی کا درد۔

زیادتی :- بادل، بجلی، بارش کی تری سے، نمی سے، سرد موسم سے، رات کو، دبانے سے، حرکت سے۔

کسی :- گرمی سے، خشک موسم سے، آرام سے۔

مصلح :- بیلا ڈونا، کانیا، انگیشا، آئرس، مرکوریس

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

قائی سو سٹگما

PHYSOSTIGMA

خصوصی علامات

۱- غیر معمولی دماغی تیزی، خیالات کی لامتناہی رو کو روک نہ سکے۔

عام استعمال

زیادہ تر آنکھوں کے امراض میں استعمال ہے۔

عمومی علامات

آنکھوں کو استعمال کرنے کے بعد ان میں درد، آنکھوں کے سامنے سیاہ تارے اڑتے دکھائی دیں، آنکھوں کے سامنے سبلی کی چمک، آنکھوں کے چوڑوں اور آنکھوں کے عضلات میں اینٹیٹن (راگیر کبھی) آنکھ کے ڈھیلے کا لرزنا یا چھڑکن۔

عضلاتی نظام کی بچھڑکنوری، حرکت میں کمی آجائے (جلبسی میم) کم سن افراد میں دماغی یا جسمانی پراگندگیوں سے لرزہ۔

کمزور اصل یا چوٹ سے پیدا ہونے والا یا چوٹ سے بڑھ جانوالا گنازہ جس میں ذرا سی ہوا سے میان تک کر پاس سے گزرنے والے آدمی کی سانس کی ہوا سے اضافہ ہوا یا پیریکیم یا ٹیڈیو تو بنیم، نکس و امیکار، شکر کینا،

زیادتی :- عموماً صبح کو ورزش کرنے سے ، دماغی محنت سے ،
 کبھی :- چلنے سے ، کھل ہوا میں ، آنکھ بند کرنے سے ، خاموشی
 سے ، گرم کمرہ میں -
 مصلح :- اٹروپیا -
 طاقت :- مدرٹھنکچر یا ۳ x

FLUORIC ACID

فلورک ایسڈ

خصوصی علامات

۱۔ ان نوع افراد کی تکلیفات جو لوٹھے دکھائی دیں۔

عام استعمال

یہ دوا لوٹھے افراد کے امراض میں کارآمد ہوتی ہے یا ایسے اشخاص
 جو قبل از وقت بوٹھے ہو گئے ہوں ، جن کو جلدی جلدی حرکت کرنے
 اور ٹھنڈے آرام معلوم ہوتا ہو ، جلد کھردری ہو اور لگاتار خارش
 ہوتی رہتی ہو ، ٹھنڈک سے تخفیف ہو اور گرمی سے تکلیفات بڑھیں
 بالخصوص ناخنوں کے نرم پڑ جانے میں ہیں یہ دوا کارآمد ہوتی ہے ۔

عمومی علامات

بہت بچے پیدا ہونے پر خواتین کی وریدوں کا پھول جانا، پرانے زخموں۔

رُخے اور ضعیف افراد کے اعضاء کا استتقار، نظام وریدی کمزور
آتشکی زہر سے یا پارہ کے کثرت استعمال سے بڑیاں گل سڑ رہی
ہوں، متاثرہ مقامات سے پتلا، جلانے والا، خون آمیز متعفن مواد
فانج ہو۔

آنسوؤں کی تحصیل کا ناسور، آنکھوں کے لئے ہونا قابل برداشتے۔
دانتوں کا ناسور، دانتوں سے خون آمیز نکلین مواد نکلنا نکلے۔

فوطے متورم، خواہش جماع میں زیادتی۔

تام نمراج میں خارش جو گرمی سے بڑھے۔

زیادتی :- گرمی سے، بوقت صبح۔

کمی :- چلنے پھرنے سے، سردی سے۔

معاون :- سلیشیا

طاقت :- ۳ x یا ۶ x یا ۳۰ طاقت

خصوصی علامات

- ۱- چہرے کی زردی، بلغمی جھلیوں کا پیلا پن جو ذرا سے درد، تحریک، اکساہٹ یا محنت سے تمنا اٹھیں اور سرخ ہو جائیں۔
- ۲- چکر پتے پانی کو دیکھنے پر۔
- ۳- خون حین پیلا، پانی کا سا، کمزور کرنے والا۔
- ۴- تھے آدھی رات کے فوراً بعد۔
- ۵- دست آئے جب مریض کچھ کھائے یا پئے۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر کمزور خون والے نوجوان، کمزور افراد پر مستعمل ہے، جن کو جلد سردی لگ جاتی ہو، پاؤں سرد رہتے ہوں، بہت زیادہ ذکیٹس ہوں، سخت محنت کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی ہوں۔

عمومی علامات

نوبتی اور تسکین کا درد سر، چہرہ تمنا یا ہوا، چکر آئیں۔
آنکھوں میں پانی جرا ہوا یا سرخی اور جلن، آنک سے خون ہے۔
چہرہ زرد جو ذرا سی بات سے سرخ ہو جائے۔

کھانے سے ذائقہ کڑوا، رات کو کھانے کے بعد غذا تپتی ہو جاتی ہے۔
 پتے دست پانی کے سے، جلن دار، چکنی آؤں یا خون والے۔
 مردوں میں ناسردی اور احتلام، عورتوں میں حیض بار بار کثیر المقدار اور
 عورت تک پہننے والا درد کے ساتھ، سیلان الرحم دودھ یا اپنی جیسا۔
 کھانسی جو صرف چلنے یا حرکت کرنے سے عود کر آئے۔
 رات کو شانہ کی ہڈیوں میں، یا کولہے سے رات تک یا پندرہ لیوں
 اور ٹانگوں میں درد۔

بخار میں چہرہ سرخ، اٹھ پیر ٹھنڈے، پسینہ بکثرت جس کے
 ساتھ متل ہو۔

زیادتی :- رات کو آرام کرنے سے، خاموش بیٹھنے سے، کھانے سے
 کسی :- آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے، موسم گرمی میں۔
 معادن :- ایوننا، چائنا، تھے میلس،
 مخالف :- ایٹک ایڈ۔

مصالح :- آرنیکا، آر سینکلم لیم، بیلا ڈونا، ہیر پرف، اپیکاک،
 پلسا ٹیلا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر۔

CARBOLIC ACID

کاربائک ایسڈ

خصوصی علامات

- ۱۔ درد بہت تیز جو یکایک آئے۔
- ۲۔ بکے بیماری پیشانی کے درد جیسے ریڑک کی پٹی پیشانی پر کس کر باز بھی گئی ہے
- ۳۔ تبیض جس کے ساتھ سانس میں سخت تڑپ تعفن ہو (اے ایم سورنم)

عام استعمال

یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جب کسی حصہ جسم سے بدبو دار، سٹرا
 ہو اور خارج ہوتا ہے، کمزوری بہت ہوتی ہے اور ضعف و نفاہت
 بدرجہ کمال ہو۔ تمام جسم سرد پسینہ سے تڑپتے ہو۔

عمومی علامات

قوتِ شامہ یعنی سو نگوٹے کی قوت بہت تیز ہو جاتی ہے، سانس و
 پانسانے نہایت بدبو دار ہوں، قہقہہ، سرخانی، ذیابیطیس، ریاح، چھین
 اسہال۔

کام کرنے کو جب نہ چاہے، آنکھ کے گرد حلقہ میں درد۔

انفلوئنزا، منہ اور حلق میں زخم، بدبو دار رال نکلے، حلق سے کچھ
 نکلنا نہ جاسکے۔ پیٹ میں نفخ، متلی، حاملہ عورتوں کی متلی،

تبض میں نہایت بدبودار ریاح خارج ہوں۔ پیٹ میں اینٹھن، اسہال
 مستدرات کے حیض یا سیلان الرحم نہایت بدبودار۔
 مخالفہ کار باکب ایڈ سے بلی ہوتی جگہ پر ٹھیکسین یا نباتاتی تیل
 ہرگز نہ لگائیں۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

کاربو انیمالس

CARBO ANIMALIS

خصوصی علامات

- ۱۔ بوجھ اٹھانے سے جلد موچ آجاتے۔
- ۲۔ حیض نمودار ہونے کے بعد مریضہ اس قدر کمزور ہوجاتی کہ بول بھی نہ سکے۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر خنازیری مزاج والے افراد میں مستعمل ہے جن کی
 دیدیں پھولی ہوتی ہوں، رطوبتیں مجلیوں کا رنگ اور غوائی ہو غدد
 سخت ہو گئے ہوں، سوجھے ہوئے ہوں اور ان میں بڑا سخت درد
 ہوتا ہو۔

عمومی علامات

ماغزہ کا فعل بہت سست، غذا کے ڈکار دینے تک آئیں،
 مریض کچھ کھاتے تو اس کا جی متلانے لگے۔
 چہرے پر تانبے کے رنگ کی پھنسیاں، کاہلی اور نقاہت
 بہت ہو۔

در دیر شدید، مریض رات بھر سر پکڑ کر بیٹھا ہے۔
 خون کا دورہ کمزور، حرارت غریبہ نہایت کم ہو گئی ہو۔
 بڑھاپے کے امراض جبکہ وریدی پھول گئی ہوں، رخسار اور
 ہونٹ نیلے پڑ گئے ہوں اور سخت نقاہت ہو۔
 زیادتی :- جماعت کے بعد، جسم سے نیمتی رطوبتوں کے اخراج
 کے بعد، نیم شب کے بعد، خفیف چھوٹے سے۔
 معاون :- کلکیر یا فاس۔

مخالف :- کاربوئیج۔
 مصلح :- آرسینکیم اہم، کمیفر، کانیا، لیکے کس، نکس و امیکا،
 سرکہ۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳ طاقت تک عوارہ کئی تکالیف میں۔
 ۳۰ طاقت سے اوپر پرانی تکالیف اور مرنی میں۔

CARBO VEG.

کاربوویج

تخصیصی علامات

- ۱۔ تکلیفات بہت زیادہ گرم ہو جانے سے ۔
- ۲۔ مردوں کا سا چہرہ ، سرد چہرہ ٹھنڈے پینے کے ساتھ ۔
- ۳۔ ہاضمہ کی کمزوری ، سادہ سے سادہ غذا بھی موافق نہ آئے ۔
- ۴۔ عروق شریہ میں دوران خون کی کمی کے باعث مسلسل نچھا جھلنے کی خواہش کرے ۔
- ۵۔ رات کے وقت اکثر جاگ اُٹھے ، گھٹنے ٹھنڈے ہو جانے کے باعث ۔
- ۶۔ بیماری کے آخری مرحلہ میں ٹھنڈے پینے ، ٹھنڈے مائیس ، ٹھنڈی زبان اور آواز کے نہ رہنے کے ساتھ ۔

عام استعمال

شدید کمزوری ہو چکی ہو ، رطوبات کے اخراج میں زیادتی ہو ترشی کے ہو ، پیٹ اور آنتوں میں خاص کر ناف سے اوپر کے حصہ میں بھاری جمع رہی ہو تو یہ دوا کارآمد ہوتی ہے ۔ مریض کے جانبر ہونے کی امید ختم ہو رہی ہو تو نسا اوقات یہ دوا جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ۔

عمومی علامات

شدید طور پر کمزور کر دینے والی بیماریوں یا رطوبتِ زندگی کے ضائع ہو جانے کے اثرات ہیں۔

ناقص غذاؤں مثلاً سُری ہوئی پھلی، گوشت یا چربی نغذائوں سے پیدا شدہ تکلیفات۔

کمزور اور گرمی ہوئی صحت میں کسی مخرج سے سیلانِ خون ہو۔
معدہ اور آنتوں میں رنج کا اجتماع جس کی زیادتی لیٹنے سے ہو۔
آواز بیٹھ جائے شام کے وقت، شام کی مرطوب ہوا سے یا گرم مرطوب موسم میں۔

دست، بار بار، از خود مردہ کی سی بو والے جس کے بعد صلی ہو
مردوں میں خواہشِ جماع بالکل دب جاتے، جریانِ منی ہوا
پاخاند کے وقت نذی خارج ہو، مباشرت میں جلدِ خارج۔

عورتوں میں عظیم کثیر المقدار اور سیلانِ الرحم سفید دودھ کا
سپتلا اور گاڑھا جو صبح کو زیادہ ہو۔

زیادتی :- چربی غذا سے، صبح کے وقت، تبدیلی موسم میں
خاص کر گرم اور مرطوب موسم میں۔

کھسی :- پٹکھا کرنے سے، سرد ہوا سے، فلو کاروں سے۔
معاذت :- کال کارب، چائنا۔

مصلح :- آر سینکم اہم، کافیا، لیکی کس، کیمفر
طاقت :- معدہ کے باطن میں ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور کمزور
کے لئے ۲۰۰ طاقت و نیز زیادہ طاقت میں کارآمد ہے۔

CAUSTICUM

کاسٹیکم

خصوصی علامات

- ۱۔ بہت زیادہ زہور اور زہری مائل رنگت والا افراد۔
- ۲۔ چھلین یا زخم کا سادرد جسم کے کسی حصہ میں۔
- ۳۔ قبض صرف کھرفے ہونے کی صورت پاخانہ باسانی خارج ہو۔
- ۴۔ کھانسی، سیتہ میں چھلین اور پھوٹے کے سے درد کے ساتھ۔
- ۵۔ کھانسی، سانس باہر نکالنے پر۔
- ۶۔ آواز بیٹھا جائے۔ حلق میں چھلین کے ساتھ۔
- ۷۔ حیض صرف دن کے وقت۔
- ۸۔ نالیج، واحد حصص کا جیسے آلاتِ نطق، زبان، چھوٹے، چوڑے، بازو، ٹانگیں یا مثانہ۔

عام استعمال

اس کا اثر حرام مغز اور حلق کے اعصاب پر ہوتا ہے، حلق اور نالیج میں یا جسم کے کسی دوسرے چھوٹے واحد حصہ کا نالیج ہوتو یہ دوا نالیج ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریشیں ٹنگین ، بالوکس ، آنکھوں میں آنسو ، بے چین
بکوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنجن دوست (ٹانم)
آنکھوں کے ارد پر والے پوٹے کھلے نہ رہ سکیں بلکہ نیچے والے پوٹوں
پر گر پڑیں ۔ نظردنعتا کمزور ہو جاتے ۔

بچے چلنا دیر میں سیکھیں یا لڑکھڑا کر پلٹتے ہوں ، باسانی گرجا میں
پیشاب از خود ، کھانسی سے ، جھکے سے یا چلنے سے ۔
پرانی چوٹیں پھرا ہوا آئیں ۔

نالیج عموماً دائیں طرف ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے ۔

زیادتی :- ٹھنڈی خشک ہوا میں ، صاف موسم میں ، گاڑی کی حرکت سے
کبھی در مطوب ہوا یا مرطوب موسم سے ، گرمی سے ، بستر کی گرمی
معاون :- کاربوویک ۔

مخالف :- ناسفورس ، کافیا ۔

مصلح :- گوائیکم ، کس و امیکا ۔

طاقت :- ۳ سے ۳۰ تک (نالیج اور پانے امراض میں اونچی طاقتیں)

خصوصی علامات

- ۱- دماغ اور جسم کی غیر معمولی چستی اور فعالیت۔
- ۲- زیادہ خوشی کی حالت میں علامات بڑھ جائیں۔
- ۳- یکایک جذباتیت یا خوشی یا غم کی خبروں کے اثرات مابعد۔

عام استعمال

مد سے زیادہ ذکاوتی کے باعث اگر مختلف قوی غیر طبعی طور پر بہت تیز ہو جائیں مثلاً بنیاتی، سماعت، سونگھنے، چکھنے، یا چھونے کی قوت، تو یہ دوام پذیر ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض خیالات کی یورشوں کا شکار جس کے باعث سونا بھی مشکل ہو۔ مختلف کام بہت جلد کرنا چاہے۔
 درد سر، زیادہ دماغی محنت، سوچ بچا بہ یا بولنے کی زیادتی سے۔
 دانت کا درد جسے ٹھنڈک سے سکون ہو۔
 زیادتی :- یکایک دماغی جذبات سے، خصوصاً خوشی سے،
 منشاء سے۔

کمی :- گرمی سے، لیٹ جانے سے، منہ میں برف لگنے سے۔

معاون :- ایکونائٹ

مخالف :- کینتھرس، کاسٹیکم، کاکولس، اگنیشیا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

COLCHICUM

کالچیکم

تخصیصی علامات

- ۱۔ سونگھنے کی قوت میں تیزی، کھانا پکنے خصوصاً مچھلی، انڈے، مرغی گوشت کی خوشبو سے متلی اور غشتی۔
- ۲۔ پیٹ نفع سے بھید اچھا ہوا۔
- ۳۔ معده اور شکم میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک۔

عام استعمال

ہائی کے اور گٹھیادی دروں (وجع المفاصل) وغیرہ میں یہ دوا بہت زیادہ مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ماتھے، سر یا کان یا چہرے کی جلد میں جھنجھٹا بہت محسوس ہو،

دانت یا تالو میں درد، وال بکثرت۔

پاخانہ تخلیل نہایت درد کے ساتھ اسہال ہو، آؤں آمیز، کانچ
نکلا۔

پیشاب بار بار، جلن پیشاب کی نالی میں، پیشاب مقدار میں نقصا۔
ہاتھ، پیر کی انگلیوں میں ٹیس اور جھنجھٹا ہٹ۔
زیادتی :- حرکت سے، محنت سے، غروب آفتاب سے
طلوع آفتاب تک، نیند اچاٹ ہونے یا خوراک دیکھنے سے
کھی :- جھکنے سے یا سکون کے ساتھ لیٹنے سے۔
متخالف :- ایسی نمک ایٹڈ۔

مصلح :- بیلا ڈونا، کمیفر، لیٹم پال، کوکولس، نکس و امیکا،
پلسا ٹیلا، سپاٹی جیلیا، شہد اور شکر۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

KALMIA

کالمیا

خصوصی علامات

۱- درد گول گنے کے سے جن کا رخ اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔
(رکیٹس)

عام استعمال

یہ دوا شدید اعصابی درد، بائی کے دریا گھٹیا وی تکلیفات میں کارآمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

قلبی تکلیفات جو بائی کی وجہ سے پیدا ہوں یا بائی کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ہوں۔

درد چھینے والے، تیر لگنے کے سے، دبانے والے۔

بائی کے درد جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوا کریں جوڑے گرم اور متورم ہوں۔

دائیں آنکھ اور آنکھ کے گڑھے میں شدید درد جو سورج کے چڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھے اور زوال کے ساتھ کم ہو۔

زیادتی :- آگے کی طرف جھکنے سے، نیچے دیکھنے سے، حرکت سے کھل ہوا ہیں۔

معادن :- بنزوک ایٹ، سپائی جیلیا۔

مصلح :- اکیونائٹ، بیلا ڈونا۔

طاقت :- مدد ٹنکچو سے ۳ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ پرانی خونی بواسیر، درد وال۔
- ۲۔ پانخانہ سخت درد کے ساتھ اور بہت دیر کے ساتھ۔

عام استعمال

خصوصی طور پر خونی بواسیر میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

پیشانی میں درد، بواسیر کا خون رک جانے سے مزمن نزلہ۔
 نہایت شدید قبض، بواسیر جس میں درد ہو اور مستے سو جے ہوتے
 ہوں۔ مقعد میں لکڑی کے ٹکڑے بھرے ہوتے معلوم ہوں، حاملہ
 عورتوں کا قبض۔

زیادتی :- سردی سے، دماغی جذبات کی وجہ سے۔

کسب :- گرمی سے۔

مصلح :- نکس و امیکا۔

طاقت :- مدرٹنچور سے ۳ طاقت تک

(دل کی تکالیف میں اونچی طاقتیں مستعمل ہیں)

خصوصی علامات

- ۱- پیٹ میں شدید تو لنجی درد جس سے مریض دوہرا ہو جائے۔
- ۲- پیٹ کے درد کو دبانے سے سکون ہو۔
- ۳- چکر سر کو گھمانے پر خصوصاً بائیں طرف۔

عام استعمال

درد تو لنج کی خصوصی دوا ہے۔

عمومی علامات

پیٹ کا درد جو کھانے پینے سے بڑھ جائے، حیض شرمندگی سے یا غم سے یا غصہ سے رک جائے، حیض میں شدید درد شکم۔
 عرق النسا کا اینٹھن والا درد، متاثرہ جانب لیٹنے سے زیادہ ہو
 گولی کے سے درد سبلی کے جھبکوں جیسے، بائیں ٹانگ میں اور پے
 نیچے تک آتیں۔

ذیادتی :- غصہ سے، بے عزتی سے۔
 کسہی :- گرمی سے، سر کو آگے جھکا کر لیٹنے سے۔
 معاون :- مرکب ریسی، کیمبر میلا، سٹانی سیگریا۔

مصلح :- کیفر، کاسٹیکم، کمیویٹا، کانیا، اوپیم، سٹر و نٹنس۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۴ طاقت تک اور اوپر۔

کالوفائلم

CAULOPHYLLUM

خصوصی علامات

- ۱۔ سیلانہ الرحم، چھوٹی لڑکیوں میں (کلکیریا)
- ۲۔ تشنجی سختی رحم کے منہ میں جس کے باعث وضع حمل جلد نہ ہو۔

عام استعمال

یہ دو اخواتین کے عوارض کے لئے مستعمل ہے جو حمل کے دوران یا وضع حمل کے وقت یا دودھ پلانے کے زمانہ میں لاحق ہوں۔

عمومی علامات

عورتوں میں چھوٹے جوڑوں کے درد جو جگہ بدلتے رہیں، درد نوبتی اور تشنجی ہوں۔

- لیکوڈیا، جنن وارہ اور کمزور کرنے والا۔
- انقطاع حمل کا میلان رحم کی کمزوری کے باعث۔
- چھوٹے درد زہ وضع حمل کے آغاز میں۔

گمزوری کی بناء پر یا جلد وضع حمل ہو جانے سے یا اسقاط کے بعد مسلسل سیلانِ خون ہو۔
 وضع حمل کے بعد کے درد، تناس عرصت تک جاری ہے۔
 زیادتی :- کھلی ہوا میں، تہوہ سے۔
 کمی :- کمرے میں۔ پاخانہ پھرنے سے۔
 مصلح :- کافیا۔
 طاقت :- مدرٹنکچر سے ۳ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

KALI BICHROM

کالی بائیکروم

خصوصی علامات

- ۱۔ بلغھی جھلیوں کی تکالیف، رطوبتِ سخت، گاڑھی تار دارہ جو جسم کے حصص کے ساتھ چپک جائے اور تاروں کی صورت میں کھنچ سکے۔
- ۲۔ دردِ چھوٹے چھوٹے مقامات میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلد جلد منتقل ہو جائیں۔
- ۳۔ ناک کی جڑ نہیں دبانے والا درد، ناک سے پیڑیاں یا کھرنڈ۔
- ۴۔ گوا پھولا ہوا جیسے ہوا بھری ہو۔

۵۔ کروپ کھانسی، کھر کھری، دھات کے مزہ کی جس کے ساتھ سخت بلغم یا صبح سویرے جاگنے پر سڑکی طرح لچکدار بلغم سانس میں وقت کے ساتھ نکلے۔

۶۔ درد سر، حملہ کے قبل بنیائی میں دھندلا پن یا بینائی جاتی ہے۔
۷۔ تکالیف بالعموم موسم گرما میں ہوں۔

۸۔ اعصابی درد ہر روز ایک ہی وقت پر آتے ہیں (چائیم سلف)

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر فربہ اور موٹے تاسے افراد یا بچوں پر مستعمل ہے جو اس دوا کے بالمثل نزلادی، آنکھ والی یا سورتی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں یا جن کو کروپ کھانسی یا خناق کے عوارض رہتے ہوں۔

عمومی علامات

کھلی ہوا میں نرم حاصل کرنے کا میلان۔

ہاتی کے درد جو یکے بعد دیگرے آلات ہضم کے عوارض کے ساتھ چھ ماہ کے وقفہ سے ہوں۔

ناک کی درمیانی دیوار میں زخم، خون ملی رطوبت کے ساتھ۔

کھانسی شدید کھڑا ہٹ والی حلق میں تار دار بلغم والی۔

تالو میں گہرے، گوشت کھا جانے والے زخم، اکثر تشکی۔

زیادتی۔ صبح کے وقت، کپڑے اتارنے سے، دبانے سے، گرم

اشیاء سے، چھونے سے گہرا سانس لینے سے۔

کسی :- جلدی علامات ، سرد موسم میں آرام پانی ہوں ، گرمی ، کھلی ہوا سے ، جھکنے سے ، شام کو ، کھانے کے بعد ، کھانے سے ، تقوڑی نیند سے ، اتنے کرنے سے ۔

مصلح :- آر سینیکم البروم ، لیچے کسس ، پیساٹیلیا ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر ۔

بیرونی طور پر استعمال کے لئے آٹھ اونس پانی میں ایک گرین خاص یعنی کروٹو کالی یا تیکریم ملا کر کوشن بھی تیار کیا جاتا ہے ۔

KALI BROM.

کالی برومیدیم

تخصّوصی علامات

۱۔ قوتِ حس جاتی ہے ۔

۲۔ اعصابیت ، ناتھ اور انگلیاں مسلسل حرکت میں رہیں ، ناتھ مسلسل حرکت کرے ۔

۳۔ حافظہ جواب دے جائے ، جدول جاتے کر بات چیت کیے کرے ۔

۴۔ بچے رات کو ڈر جا کر کریں ۔ (کالی ناس)

عام استعمال

مرگی ، شدید قسم کے تشنہ ، حلقہ کی خرابی ، حد سے بڑھی ہوئی اعصابیت

کننت، نیز احتلام میں عام طور پر متعلق ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کو رونا اور سخت ترین غم کے توہات کے
دوڑے ٹپریں جن پر مریض قابو نہ پاسکے۔ پست حوصلگی، بے چین، بیخوابی۔
تالو، جھجھ، پیشاب کی نالی وغیرہ میں بے حسی ہونے کی کیفیت
رکھڑا ہٹ۔

سچہ حالت خواب میں ڈرے، چیخے چلائے، سوتے ہیں چلے چرے
(سلیٹ یا)

تشہی دوسے، وانت نکالنے کے زمانہ میں، کالی کھانسی میں،
سحلت ورم گروہ۔

مرگی پیدا کنشی یا آتشکی، حیض سے ایک دن پہلے یا نئے چاند پر
کیل، چہرے پر، سینہ پر یا کندھوں پر۔

زیادتی۔ اپنے عارض کے بارے میں سوچتے نہیں سے۔

کسبی۔ جب داغ یا جسم مختلف مشاغل میں مصروف ہے۔

مصلح:- کیفر، مہیونائس، نکس و امیکا، زندگم۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ دروسوئیاں چمپنے کے سے، تیرگنے کے سے۔
- ۲۔ درد، متاثر جانب لیٹنے سے۔
- ۳۔ چھو جانا برداشت نہ کرے۔
- ۴۔ اکیلا ہونے سے سخت نفرت ہو۔
- ۵۔ اوپر کے پوٹوں اور بوسے درمیان تقبیلی کا سا دم۔
- ۶۔ آنکھوں کی کمزوری جمانغ کے بعد۔
- ۷۔ دانت کا درد صرف اس وقت جب کچھ کھانا ہو۔
- ۸۔ مکر میں درد۔
- ۹۔ کھانسی، ابکائیوں اور غذا کی تے کے ساتھ۔
- ۱۰۔ حیض سے ایک تہفتہ قبل مریضہ بدتر محسوس کرے۔

عام استعمال

کئی خون، عام کمزوری، نرمل کیفیتوں، مسلسل درد کمر، بچوں کے نمونیا، بوڑھوں کے عوارض، جگر کے پرانے امراض، استسقا، دم سے اخراج خون، صفروی پتھری، احتیاس حیض وغیرہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

معدہ تناہوا اور ذکی الحس، بہ غذا ریح میں تبدیلی ہوتی محسوس ہو۔
سردی یا زکام حاصل کرنے کی بھید رغبت۔

درد میں سکون ہو جب اٹھ کر بیٹھ جائے یا آگے کی طرف جھکے۔
نکلنے وقت ندرخہ میں چھین دار درد یا پیٹھ میں درد۔
قبض، پاخانہ سے ایک دو گھنٹہ قبل سوئیاں چھیننے کے سے

قرینچ درد۔

قلب چربی آنے کی رغبت

ذیادتی بہ جماع کے بعد، ٹھنڈے موسم میں، تہوہ سے، صبح تین بجے
بائیں یا ماؤنڈ کروٹ لیٹنے سے۔

کسھی بہ گرم موسم میں چاہے مرطوب ہو، دن میں، حرکت کرنے سے
معاون بہ کاربوئیج اور نکس وامیکا۔
مصالح بہ کیہفر، کانیا۔

طاقت بہ ۳۰ طاقت اور اوپر۔

CROTON TIG.

کروٹن ٹیگ

خصوصی علامات

- ۱- دست، جیسے ہی مریض کچھ کھاتا یا پیتا ہو، دست زبردستی پانی کے ساتھ
- ۲- سینہ میں کھینچنے والا درد، پستان سے شروع ہو کر کندھے تک۔

عام استعمال

دستوں کو روکنے کے لئے عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔

عمومی علامات

پانی کے سے پہلے دست، مقدار میں زیادہ، مسلسل پاخانہ کی حاجت جس کے بعد یکایک پاخانہ آتا ہے جو مہرز سے گولی کی طرح نکلتا ہے۔ پانی سے قبل آنٹوں میں پانی پھپکتا محسوس ہوتا ہے۔

جلد میں یا آلات تناسل پر شدید خارش، تمام جسم پر اکوتہ تھیکہ پر سر رکھتے، ہیستینجی کھانسی دوسے والی شروع ہو جاتی، ایسا شکل ہو۔

زیادتی، ذرا سی غذا سے کوئی چیز پینے سے، نہانے سے، موسم گرمیوں میں۔

مصلحہ:۔ کالی بزم۔

مصلح :- اناکارڈیم، انٹیم ٹارٹ، کلیمیٹس، رسٹاکس، ریمن کولس۔
طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CROCUS SATIVA

کروس سٹائیوا

خصوصی علامات

- ۱۔ احساسات میں متواتر تبدیلیاں گھڑی میں بچید خوش گھڑی میں بچید یوں۔
- ۲۔ مریض کو یکا یک ہی کس پہ پایہ آئے اور پھر یکا یک شدید غصہ۔
- ۳۔ سیلان خون، گاڑھا سیاہ جس کے لمبے لمبے تار لنگ جاتیں۔
- ۴۔ درد سر جس میں ماہواری کے مقررہ دو تین روز میں زیادتی ہو۔
- ۵۔ نکسیر، ہر قطرہ لمبے تار کے کی صورت میں خارج ہو۔

عام استعمال

یہ دو زیادہ تر سیلان خون کو روکنے کے کام آتی ہے۔

عمومی علامات

درد سر، سن یاس کے زمانہ میں یا ماہواری کے دنوں میں۔

آنکھوں میں احساس جیسے ان میں دھواں لگ رہا ہے، یا ٹھنڈی

ہوا لگ رہی ہے، زور سے بھینپنے پر آرام محسوس ہو۔

ٹکسیر پیشانی پر ٹنڈے پسینے کے ساتھ، چمکدار سرخ خون کی (کاربوئی) بچوں میں جو بہت بڑھ چکے ہوں۔ (کلکیر یا فاسفورس) جسم کے اندر کسی حصہ میں زندہ چیز کی حرکت کا احساس۔ کوریا، ہشیریا، واحد عضلات میں تشنجی سکڑن۔ زیادتی:- لیٹ جانے سے، گرم موسم میں، گرم کمرے میں، صبح کے وقت، بھوک کی حالت میں۔ ناشتہ سے قبل، کسی چیز پر نظر جا کر دیکھنے سے۔

کسی:- کھلی ہوا میں۔

معاون:- جاپان، نکس و امیکا، پلسا ٹیلا، سلفر۔ طاقت:- مدہ ٹینکچر سے ۳۰ طاقت تک۔

KREOSOTUM

کریازوٹ

خصوصی علامات

- ۱- مریض اپنی عمر کی مناسبت سے زیادہ لمبا ہو۔
- ۲- بچے بوڑھے نظر آئیں، جھریاں پڑی ہوئی۔
- ۳- مستورات میں سن ریاس کی تکلیفات۔
- ۴- بچوں میں جو نہی دانت ظاہر ہوں گلنے مٹنے لگیں۔
- ۵- حیض کا زیادہ سیلان جب مریض لڑکی ہو۔

- ۶۔ حیض بار بار رک کر جاری ہو۔
 ۷۔ پیشاب صرف لیٹی ہوئی حالت میں آسان سے آئے۔
 ۸۔ سچے کا پیشاب پہلی ٹیند کی حالت میں نکل جائے۔
 ۹۔ لیکوریا جس میں زیادتی دو حیضوں کے درمیان ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے اشخاص پر مستعمل ہے جو اپنی عمر کی نسبت زیادہ بڑے معلوم ہوں یا ایسے جھڑیوں والے بچے جو اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آئیں۔

عمومی علامات

بچوں کے دانتوں میں درد، مسوٹھے سیاہی مائل سرخ یا نیلے،
 دانت بوسیدہ۔
 مزمن براز نکالی ٹس یا مرضِ سل جس میں بلغم بدبودار اور بکثرت ہو۔
 ابلکائیاں، غذا کھانے کے کئی گھنٹے بعد قے، معدہ میں دکھن۔
 پیشاب بدبودار، انڈام نہانی میں خارش
 خارشِ شام کے وقت بجمد شدید۔
 زیادتی بہ کھلی ہوا میں، سردی میں، آرام کرتے وقت، لیٹنے پر،
 حیض کے بعد۔
 کسھی بہ گرمی سے، حرکت سے، گرم خود آگ سے۔
 مخالف :- کاربوئیچ، چائنا۔

مصلح :- ایکونائٹ ، فیرم ، نکس و امیکا ۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت اور اوپر ۔

CRATAEGUS

کریے طگس

خصوصی علامات

- ۱- دل کی کمزوری اور دل کے فعل کی بے قاعدگی ۔
- ۲- شریانوں کی دیواروں کا سخت ہوجانا ۔
- ۳- ذیابیطس خاص کر بچوں میں ۔
- ۴- قلبی استسقاء
- ۵- خفیف مشقت سے بھی سانس پھول جائے لیکن نبض کی رفتار زیادہ نہ بڑھے ۔
- ۶- دل کا پھیل جانا ، دھڑکن کی پہلے آواز کمزور ہو ۔
- ۷- نبض بے قاعدہ ، مدھم ، ضربیں چھوٹے چھوٹے کی جلیں ۔
- ۸- دل کے مقام پر خاص کر بائیں منتسل کی ٹڈی کے نیچے درد ۔

عام استعمال

یہ دوا خاص کر دل کے عوارض میں مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

مرضِ عصبِ مزاج اور چڑچڑاہٹ ہو، کمر، گردن اور سر میں درد،
 زمین طور پر پکند ہو، آنکھوں میں سوزش کی کیفیت اور ناک سے رطوبت
 کا اخراج۔

شاہ رگ کی بیماری، کھانسی، نبض تیز چلے اور بے قاعدہ ہو، دل
 میں درد ہو، جلد پر ٹنڈک محسوس کرے، آنکھوں کی آنکھیاں یا پاؤں
 کے نیچے نیگیوں، تمام علامتیں مشقت سے یا جذباتیت سے بڑھیں۔
 قلب کی مرضیں بیماریاں جس کے ساتھ شدید کمزوری ہو، شریانوں کی میواریں
 کا سخت ہوجانا۔ یہ دوا شریانوں کی اندرونی سطح پر چسے ہوتے مادوں کو
 تحلیل کرنے کی تاثیر رکھتی ہے۔

جلد پر پسینہ کی کثرت، جلد پر ابھار نکلیں۔
 شاہ رگ کے مریضوں کی حیوانی۔

زیادتی:- گرم کمرے میں۔

کسی:- تازہ ہوا سے، سکوت اور استراحت سے۔
 متعلق:- سٹروہنٹس، ڈیسیٹیلس، ناجا، کیٹس۔

طاعت:- درمٹسکو ایک ندرہ قطرے تک نہی خوراک۔

دقتی نمیشن نتائج حاصل کرنے کے لئے کچھ عرصہ تک اس کا استعمال جاری

رکھنا ضروری ہے،

خصوصی علامات

۱۔ معمول سے جذباتیت و متحرک ٹر جانے۔

عام استعمال

بلغمی سوزاک، دق، مستورات کی سن پائس کی شکایات میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر بوجہ مضحل۔

دوران خون سڑکی طرف یا سینہ میں بائیں جانب۔

دل کی بیماریوں سے پیدا شدہ مرگ۔

شرابیوں میں شراب ترک کرنے پر مختلف تکالیف۔

موٹ خواتین میں سن پائس کے عوارض۔

زیادتی بہ معمول محنت سے اور موسم سرما میں۔

کبھی بہ مکمل آرام سے، گرمی سے، گرم کمرے میں۔

مصلح :- کاربوریج، گلوٹامین، پلساٹیل۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور، بمشکل کھڑے ہو سکیں، دیر میں چلنا سیکھیں۔
- ۲۔ ہڈیاں نرم، پستلی تپلی اور آبسانی ٹوٹ جانے والی، تالو بہت دیر تک کھلے رہیں، یا بل جاتیں اور پھر کھل جاتیں۔
- ۳۔ مرضی جب تک کیف کے باسے میں سوچتے تو تکلیف زیادہ محسوس کرے۔
- ۴۔ پیٹ میں درد کھانے کی ہر کوشش پر۔

عام استعمال

ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی میں عام استعمال ہوتا ہے۔

عمومی علامات

- دبلے پتلے افراد میں خون کی کمی۔
- بچوں میں دانست نہکانے کے زمانہ میں دست اور ریاچ۔
- نھے بچوں کی نائٹ سے خون آمیز رطلوبت کا اخراج۔
- ہڈیوں کی کمزوری، ریڑھ کا استھون کمزور، ٹیڑھے ہونے کا میلان، جسم کا بوجھ سہانا دشوار ہو، ٹوٹی ہڈی بمشکل جڑے۔
- مبصس والی نوجوان لڑکیوں کے چہرہ پر کیلی۔

مقعد میں ناسور کیے بعد دیگرے سینے کی تکالیف کے ساتھ (بربرک) زیادتی۔ مرطوب ٹنڈے موسم میں، برف چگھتے وقت کھی۔ موسم گرمیا میں، گرم اور خشک ہوا میں۔ معاون: پیر، روٹا، زنگم ٹیلیم، سلفر۔ طاقت: پہلے طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر۔

CALCAREA CARB.

کلکیر پا کارب

خصوصی علامات

- ۱۔ فریہ ہونے کا میلان۔
- ۲۔ بچوں میں جلد زکام ہونے کا میلان۔
- ۳۔ سر میں جمید پسینہ حبیب ستاٹھو۔ (سلیٹیا یعنی کولہ)
- ۴۔ بحالست بیماریا یا بیماری کے بعد انڈوں کی تہہ رکھنے والی خواہش۔
- ۵۔ موٹا تاری ڈیکوئی میں جلد بڑھنے کا میلان۔
- ۶۔ حیض بہت جلد، مقدار میں زیادہ اور بہت دنوں تک رہے۔
- ۷۔ مستورات میں پاؤں ٹنڈے اور نڈار رہیں، بہتر میں مسلسل سرو۔
- ۸۔ ڈراسی تحرک خون میض کو دوبارہ زیادہ مقدار میں جاری کرے۔
- ۹۔ امراض جو غذا کے جزو بدن نہ بننے سے پیدا ہوں، ہڈی کے نظام کی نشتر و نما کی خرابی۔

۱۔ جسم کے واحد حصص پر ٹھنڈک۔

۲۔ زکام جلد لگ جانے سے بے حد میلان۔

عام استعمال

نور نشوونما سے متعلقہ عوارض و تکالیف میں عام طور پر مستعمل ہے۔

عمومی علامات

مریض یعنی مزاج ہو، زنگ گورا، فریب ہونے کا میلان۔
بچوں میں سر اور پیٹ بڑا ہو، تالو کھلے ہوئے، ہڈیاں نرم اور
آہستہ آہستہ بڑھیں۔

بڑیوں میں خم، خصوصاً بڑھ کر اور لمبی ہڈیوں میں۔

بچوں کے وائٹ ویر میں اور شکل سے نکلیں، چننا ویر میں سیکھیں۔
آلات ہضم میں تیزابیت، کھٹے ڈکار، کھٹی تہ اور کھٹے پانے،
جلد جلد بڑھنے والے افراد میں پھیپھڑے کے عوارض۔

پسینہ جسم کے واحد حصص کا۔

زیادتی :- دماغی محنت سے، ذہنیہ چڑھنے سے، ہر قسم کی سردی سے،
پانی سے، نہانے سے، مرطوب ہوا یا موسم سے، پوسے چاند
میں، کھڑے ہونے سے۔

کسی بد خشک آب و ہوا اور موسم میں، ورد لیٹنے والی جانب
چھینکنے سے

معاون :- رسٹاکس، بیلاڈونا، لائیکوٹوڈیم، سلیشیا

مخالف :- بریٹیا کارب، بران اونیہ، کالی بائیکرام، نائٹروک ایسڈ، سلفر۔
 مصلح :- بران اونیہ، چائٹا، کیمپر، بیپر، آئیوڈیم، ایشکاک، ایسڈ،
 نکس و امیکا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

COCA

کوکا

خصوصی علامات

- ۱- مایوگیائی کیفیت عصبی تھکن سے، شرمیلہ پن۔
- ۲- تنگی، تنفس کھلاڑیوں میں، سانس چھوٹی۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے افراد پر استعمال ہوتا ہے جو کہ شاہ زوری کے کرتب اور کھیل دکھاتے ہوں یا پہاڑوں پر چڑھتے ہوں اور کوتاہ دمی اور نیز دھڑکن کے شاکی ہوں یا ایسے افراد جو بہت زیادہ دماغی یا جسمانی مشقت کے باعث دماغی اور اعصابی تھکن کا شکار ہو جائیں۔

عمومی علامات

اعصاب کے نفل میں نقص اور ساتھ ہی ہاضمہ کی خرابی۔

سر میں چکر، سر کی پشت اور گردن میں درد یا درد شقیقہ، خاص کر
اگر یہ عوارض تصکاوٹ اور ماندگی کی وجہ سے ہوں، سردی سے پہلے
روشنی کی لہریں آنکھوں کے سامنے پھریں اور ساتھ ہی پھر آئیں۔

پھیپھڑوں سے خون کا اجڑا ریل کا پہلا درجہ۔

دل کی دھڑکن جو کہ شکم میں ہوا کے رک جانے کے باعث یا زیادہ
محنت کرنے کے سبب بڑھتی ہو۔

دانتوں کا گھٹنا سڑنا۔

آواز کے بیٹھ جانے کی صورت میں اس دوا کے پانچ پانچ قطرے ہر
نیم گھنٹہ کے بعد استعمال کرنے سے دو گھنٹہ میں آواز ٹھیک ہو
جاتی ہے۔

زیادتی :- اوپر چڑھائی چڑھنے سے۔

کسہ :- شراب سے، سواری سے، کھلی ہوا میں، تیز چلنے سے۔

مصلح :- جلیسی میم۔

طاقت :- مدر ٹنکچر سے ۳ طاقت تک۔

COCCULUS

کوکولس

خصوصی علامات

- ۱۔ گاڑی، کشتی یا ریل گاڑی میں سواری سے متعلق یا تھے یا چلتی ہوئی کشتی کو دیکھنے سے متعلق یا تھے ہو۔
- ۲۔ وقت بہت جلد جلد گذرتا محسوس ہو۔
- ۳۔ اثرات بد، بے خوابی کے، دماغی تحریک کے، اور راتوں کو جاگنے کے۔
- ۴۔ حیض کے دوران مریض اتنی کمزور ہو کہ کھڑی نہ ہو سکے۔

عام استعمال

ہسٹیریا، عصبی عوارض، مرگی، تشنج یا فالجی امراض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

مریض یا مریض اور باشس طبیعت کے ہوں۔

سر کا درد، گردن کے پچھلے حصہ میں اور گردی میں جوڑ پڑھ کی طرف جاتے، ساتھ ہی متلی ہو، چیت ٹیٹنے سے زیادتی، دردِ سر متلی اور تھکے کے ساتھ کسی قسم کی سواری سے۔

مھوک نہ ہو، منہ کا ذائقہ دھات کا سا (مرکبوریس)

جسم بچیدہست، کھڑے ہونے کے لئے جی کافی قوت درکار ہے۔
 بازوؤں اور ٹانگوں کا سترکیکے یا درد سے کانپنا۔
 شکم میں احساس جیسے تیز پھڑپھڑا پس میں دگر ہے ہوں یا
 شکم کو کاٹ لپے ہوں۔

لیکوریٹا، سجاوے حیض کے یا درد حیض کے درمیان، گوشت
 کے وجود کی طرح پتلا، سوزشی، خون ملا، دوران حمل میں۔
 نائٹ کا ہر نیا

زادتی :- کھانے سے، نیند خراب ہونے سے، کھلی ہوا میں،
 تمباکو نوشی سے، گاڑی میں چلنے سے، تیرنے سے، چھوٹے
 سے، شور و غل سے، جھکے سے، بعد دوپہر، دوران حیض بد
 میں پراگندگی سے۔

معاون :- کیومیلا، اگنیشیا، رساکس۔

مخالف :- کاسٹیکیم، کانیا۔

مصلح :- کیفیر، کیومیلا، کیوریوم، اگنیشیا، نکس و امیکا، سٹروٹھس

کانیا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

تخصّوصی علامات

- ۱- دورانِ سرخاں کر جب لیٹا ہو یا بستر میں کرٹ بیٹے۔ بائیں جانب سر گھمانے سے (کالوسنتھا)
- ۲- کھانسی، زیادتی جب لیٹا ہو۔
- ۳- پیشاب رک رک کر آئے۔
- ۴- حیض کمزور، رکا ہوا۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے رک جائے۔
- ۵- لیکوریا، حیض کے دس دن کے بعد (بوریکس، بوریکٹا)
- ۶- خواہشات نفسانی یا حیض کے دہ جہنے کے اثرات بدر
- ۷- پینہ جونہی سوتے یا جونہی آنکھیں بند کرے۔

عام استعمال

آلات تناسل کے عوارض کے علاوہ انفلونزا، کال کھانسی، خنانیر، رمد چشم، معدہ یا جگر کا سرطان، بوڑھے افراد کے امراض بول اور فالج وغیرہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر سرخیاں لا پڑا، کسی کام، کاروبار یا مطالعہ سے دلچسپی

حافظ کمزور، کوئی دماغی محنت برداشت نہ ہو۔
 خصبوں کے یا پستانوں کے غدود بجمد سخت در رکریں۔
 کھانسی حفرہ میں ایک ہی مقام پر خشکی سے تشنجی دورے
 کی صورت میں۔

حیض بہت دیر میں، مقدار میں کم، تھوٹے وقت سے ہے۔
 جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے جس کے باعث ماہواری رک جاتے۔
 (ڈسکارا)

لیکوریہ، سوزشی، خون ملا، دودھ کا سا، مقدار میں زیادہ،
 گاڑھا رک رک کر بہنے والا۔

جماع نہ کرنے سے یا کثرت جماع سے برے اثرات مابعد۔
 روشنی سے ذکی الحسی، آنکھوں میں درمی کیفیت نہ ہونے کے
 باوجود مصنوعی روشنی سے تکلیف ہو۔

فالج، پہلے زیریں دھڑ مفلوج ہو اس کے بعد اوپر کا جسم۔
 زیادتی بر شب کو لیٹنے پر، کروٹ بدلنے یا اٹھنے پر، بستر میں
 کنواریں میں، جسمانی یا طبعی ریاضت سے، حیض کے دوران، سردی
 لگ جانے سے، مصنوعی روشنی سے، بازو اوپر اٹھانے سے،
 دودھ پینے سے، زمین پر زور سے قدم رکھنے سے۔
 کبھی بہ تاریکی میں، روزہ رکھنے سے، اعضاء کو لٹکانے سے،
 حرکت اور دبانے سے۔

معاون :- آرنیکا، آرسینیکم البیم، بیلایڈونا، کلکیریا، ٹکس و امیکا،

لائیو پوڈیم، فاسفورس، پلساٹیل، سٹرامونیم، رسٹاکس۔
 ہصلح: کانیا، ڈسکارا، نائٹریک ایسڈ، نائٹریٹ ڈسکس۔
 طاقت: ۳۰ طاقت عام طور پر مستعمل ہے، لیکن گومڑوں و دیگر
 اس قسم کے عوارض میں بہت اونچی طاقتیں جلد دہرائے بغیر
 مستعمل ہیں۔

CAPSICUM

کیسی کم

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض بلغمی مزاج اور سست، ذرا سی محنت سے جان جائے۔
- ۲۔ سچے کھل ہوا سے ڈریں، ہمیشہ سردی محسوس کریں، بھدے،
 موٹے، میلے کچیلے بچے۔
- ۳۔ غلاست، یاد وطن چہرے پر سرخی کے ساتھ۔
- ۴۔ سکڑن تالو کی، حلق کی، ناک کے پھولے حصوں کی، سینہ میں،
 شانہ میں، پیشاب کی نالی میں یا مہز میں۔
- ۵۔ احساس جلن اور جھپلین کا حلق میں یا جسم کے دوسرے حصوں میں۔
- ۶۔ حلق میں سکڑن جلن کے ساتھ۔
- ۷۔ جلن دار درد حلق میں جس میں ننگتے وقت زیادتی ہو۔

۸۔ کھانتے وقت درد ہو، درد ملے مقامات میں مثلاً شانہ، گلٹنے
ہانگیں، کان۔

عام استعمال

ایسے عوارض میں بالعموم مستعمل ہے جن میں جسم کے کسی حصہ کی
رطوبات تھکتیوں میں مرچیں گلٹنے کی سی جلن پائی جاتے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مرض میں متوالا پن، دہشت کی طرف طبیعت
مائل، چڑھ چڑھا، زرد لہنج، تمام محسوسات تیز ہو جاتیں۔
سر کا درد ایک کن پٹی میں یا ماتھے میں خاص کر سر کو ہلاتے
ہوتے یا چلتے ہوئے زیادہ محسوس ہو، آرام کرنے کی کمی۔
آنکھوں میں جلن، سرخی، پانی بہے، چیزیں سیاہ دکھائی دیں۔
کان کے پردے میں یا گہرائی میں کھجھل اور درد، ناک سے خون
بہے۔

منہ میں جلن دار آبلے، حلق میں دکھن اور جلن، منہ میں بلغم، دانقہ
سیٹھا۔

پیٹ بھولا ہوا، ریاحی تولنج، پیٹ میں جلن۔
ریاحی تولنج کے بعد پاخانہ ہو، پیمپش آؤں اور خون وال، خونی بوایہ
مہرز میں جلن۔
شانہ میں انیٹشن، پیشاب کرنے میں جلن ہو، پیشاب میں خون۔

تنگی تنفس، سینہ میں درد -

زیادتی :- کھاتے وقت گرمی سے، کھلی ہوا میں، کپڑا اتارنے سے،
ہوا کے جھونکے سے -

معاون :- نیٹریم میور -

مصلح :- کیپور، چائنا، کیلیڈیم، سائٹا، سلفیورک ایسڈ -
طاقت :- ۳ طاقت سے ۶ طاقت تک -

کیکٹس گرینڈیفلورس

CACTUS GRANDIFLORUS

خصوصی علامات

- ۱۔ موت کا خوف، یقین کرے کہ مرض لا علاج ہے -
- ۲۔ تمام جسم میں یہ احساس ہو جیسے اسے پتھرے میں بند کر دیا گیا ہے یعنی بھینچ دیا ہے اور پتھرے کا تار لمحو بہ لمحو زور زور سے بھینچا جاتے -
- ۳۔ قلب میں احساس جیسے کوئی ٹوبے کا پتھو ڈال کر بھینچ رہا ہے اور ڈھیلا کر رہا ہے -

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر دل کے عوارض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض عملیں، مایوس، موت سے خوف زدہ، درد کے باعث چٹا اٹھے۔

سر میں درد، چند یا یہ بوجھ بڑھا ہوا محسوس ہو، سر کی شریانیں پھولی ہوئی نظر دھندل، دور سے آنے والی نظر کی کمزوری۔

اجتماع خون کے باعث اونچا سناتی دے یا کانوں میں دریا کی روانی جیسا شور۔

ناک سے نکسیر پھوٹے جو جلد ہی بند ہو جائے۔

حلق میں دم گھٹنے والے دورے جن کے ساتھ دل میں درد ہو۔

چہرہ نیلا، سرد پسینہ، زرد تہمتا ہوا ہو، مزمن عصبی درد

منہ سے صبح کو بدبو دار تنفس

صبح کو متل، خون کی تہ، یا تیز کھٹی تہ، معدہ میں جلن، ناف

کے مقام پر درد۔

پاخانے سیاہ اور سخت، بواسیر میتے سو جے ہوئے اور درد کریں

امعاء سے جریان خون جس کے ساتھ دل کی علامات بھی ظاہر ہوں۔

مثانہ سے جریان خون، گردن مثانہ میں رکاوٹ محسوس ہو،

یشاب بند۔

رحم کے مقام پر اور خصیتہ الرحم میں نکاڈٹ اور جکڑن ہو، وقت حیض
اندام نہانی میں سوزش، خون حیض جلد اور گہرے رنگ کا
مٹنہی کھانسی، سیڑھیوں پر چڑھنے سے سانس لینے میں دقت
ہو، نزلہ کھانسی، لیبیدار بلغم نکلے، سانس دقت اور تکلیف سے، دم
درد سے گھٹتا ہو، نبض کمزور، سینہ میں اجتماع خون کے باعث لیٹنا
مشکل ہو، دل دھڑکتا ہو۔

ایسا معلوم ہو کہ دل فولادی بندھن میں جکڑا ہوا ہے جس کے باعث
حرکت میں فرق آگیا ہے، چھین دار درد جس کی وجہ سے سانس لینے
میں دقت ہو، بائیں کروٹ لینا مشکل ہو، نبض تیز مضبوط اور سخت
چلتی ہو، مدھم بھاری درد جو دبانے سے زیادہ ہو، تنفس رک کر چلنا
ہو، چہرہ نیگول اور پھولا ہوا بالخصوص بائیں حصہ، بائیں ہاتھ پہ اور بائیں
ٹانگ پر سوجن، نبض بے قاعدہ، درد گولی کی طرح دل کی چوٹی سے شروع
ہو کر بائیں انگلی کے سروں تک جلتے ہوں، اذن قلب بڑھ گیا ہو، دل
کے نوروں کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت مفید ہے۔

ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے، ٹنڈے اور سن ہوں۔

جلد پر خارش کے بغیر نیشک بھوس کی طرح پھنسیاں، پہلے بائیں
گھٹنے کے عقبی جانب، پھر دائیں کہنی کے بیرون طرف پھر دائیں گھٹنے
کے عقبی جانب اور آخر میں بائیں کہنی کے باہر کی جانب پھنسیاں
نکلے۔

بیڑاں، جسم کے مختلف حصوں میں ٹپکن کے باعث خوفناک
خواب آتے رہیں۔

بہار ہر روز وقت مقررہ پر، کمر میں سر دی گئے، اس کے ساتھ
جریان خون ہو، سر دی بہت گئے، سر پیسہ، سمیت گھبراہٹ
زیادتی، ہر بائیں جانب لیٹنے پر، چلنے سے، سیڑھیوں پر چڑھنے
سے، صبح کو گیارہ بجے اور رات کو گیارہ بجے، کھانا کھانے کے
بعد، رات کو آوازیں سننے سے۔

کسی :- شام کو، نیند سے، سکون سے، تازہ و کھل ہوا سے۔
معاون :- ڈیجیٹیس، نکس و امیکا، یوٹیوریم پرنٹ، نیکی کس،
سلفر۔

مصلح :- اکونائٹ، کیفیر، چائنا، یوٹیوریم پرنٹ۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

ڈاکٹر روبینہ شہید سوجن دل کے عضوی امراض میں اس کا درٹنچر
استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

CALENDULA

کیلنڈولا

خصوصی علامات

- ۱۔ بچہ کو دو دھینے کے فوراً بعد بھوک لگ جاتی جو۔
- ۲۔ بہرا پن، لیکن مریض ریل گاڑی پر یا دور کی آواز سنبولی سن
سکے۔

- ۳۔ بہت جلد ٹھنڈا لگ جاتی ہو، خاص کر سر طوب آب دیا جائے۔
- ۴۔ غیر معمولی ہلکے، کھینچے جلتا ہوا، معدہ پھیلا ہوا محسوس ہو۔
- ۵۔ اندام نہانی کے منہ پر تھمتے ہوں۔

عام استعمال

زخموں یا جل جانے کے لئے یا سرخیاؤ وغیرہ میں عام طور پر خارجی طور پر مستعمل ہے۔ علاوہ ازیں خوردنی طور پر مذکورہ ذیل کیفیات میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

پرانے ناسور یا نئے زخم جو مندیل ہونے میں نہ آئیں (خارجی طور پر اس کا استعمال زخموں کو بہت جلد مندیل کرتا ہے)۔

ذہنی طور پر مریض اعصابیت کا شکار ہو، بہت ٹوڑ پوک، سر میں پھاڑنے والے درد، داغ بوجھل، سنجھے جہڑوں کے غرور و سوجھ بھوکے جنبہیں مچھونے سے درد ہو، گردن کے دائیں طرف درد، کھوپڑی پر چرچے ہوتے زخم۔

آنکھوں میں چوٹ لگنے سے پیب رسنے کا میلان، آنکھوں پر عمل جراحی کے بعد کی تکالیف، آنسوؤں کی تسلی کا قرحم۔

ہیرا پن جو مرطوب ماحول میں یا ایگزیا کی کیفیات کے ساتھ بڑھ جاتے۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے وقت یا دور کی آواز بخوبی سن سکے۔ نرگام جو صرف ایک نختے سے ہے، اخراج سبز رنگ کا ہو۔

بچوں میں درد پلانے کے فوراً بعد ان کو دوبارہ بھوک لگ جاتے۔
غیر معمولی بھوک، معدہ کی صلبی، سینہ میں متلی محسوس ہوتے،
طبیعت شدید طور پر گرتی چلی جاتے، معدہ پھیلا ہوا۔

کھانسی، سبز رنگ کے اخراج ہوں، آواز بیٹھ جاتے۔ کھانسی
جس کے ساتھ چڑتے کے چھپتے کے پھیلاؤ کی علامت بھی موجود ہو۔
خواتین میں اندام نہانی کے منہ پر مستے، ماہوار کی کھانسی کے ساتھ
دب جاتے، بچہ دانی کی گردن کی مزمن اندرونی سوزش، رحم پھیلا
ہوا، پیڑ میں بوجھ اور بھراؤ محسوس ہو، چڑوں میں احساس کھپاؤٹ،
دنقاً حرکت سے درد ہو، حیض بکثرت آتے۔

جلد پر بیرونی زخم، گوشت زرد رنگ کا نظر آتے۔ یہ دوا پیپ
پڑنے کے میلان کو سیت حد تک کم کر کے زخم کو جلد مندمل کرتی ہے۔
جلد کا جیل جانا یا سوزش، سرخباد (ان عوارض میں خارجی استعمال ہوتا ہے)
بخار، ٹھنڈک، کھل ہوا سے ذکی الحسی، کمر میں کیکپا مہٹ، جلد
چھونے سے گرم لگے، شام کے وقت حدت محسوس ہو۔
زیادتی :- مرطوب، بوجھل یا ابرا کو در موسم میں۔

معاون :- ہیرسلف۔

مخالف :- کیفیر۔

مصلح :- آرنیکا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳ طاقت تک۔

(بیرونی طور پر آبی کیلینڈرولا، یا اس کے ٹینچر اور پانی کی آمیزش سے
بنا ہوا لوشن زخموں کو مندمل کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ صلی

ہوتی جلد، پھوڑوں، پھنسیوں، شقاق یا خراش وغیرہ کے لئے اس کا مرہم مستعمل ہے)

CALADIUM

کیلیڈیم

خصوصی علامات

- ۱۔ نامروی، عضو وھیلا، خواہش جماع اور تحریک کے ساتھ۔
(لائیکو پوڈیم، لیکی کس)
- ۲۔ خواتین کی شرمگاہ میں خارش جس سے خواہش جنق پیدا ہو۔
(اوری جنیم، زنگم)
- ۳۔ سو جائے شام کو سجاہ کی حالت میں اور سجاہ اترنے پر بیدار ہو۔
- ۴۔ پسینہ میں شکر کا اخراج جس پر کھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔
- ۵۔ مریض کو حرکت سے نفرت ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عورتوں کے اعضائے تناسل کی کھجلی میں بہت زیادہ مستعمل ہے۔ علاوہ بریں مردوں کے جنسی عوارض میں بھی کارآمد اور مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض نسیان کا شکار ہو، دماغ یکسو نہ کر سکے، ہاتھ میں درد، متلی، چکر، کان میں پھڑکن ہو۔

متلی خاص کر صبح کو اٹھنے پر، معدہ میں پھڑکن، کڑوی تہ، پاپانے کے بعد مبرز میں جلن۔

مردانہ اعضائے تناسل میں کھجلی، حشفہ سرخ ہو، عضو پر سوجن اور صلا، سرد اور لمبا معلوم ہو۔ نیند میں ایستاوگ مگر بیدار ہونے پر ایستاوگ غالباً نامردی، احتلام، صحبت کرنے کی کوشش میں ایستاوگ نہ ہو یا مٹی نہ خارج ہو۔

خواتین میں انڈام نہانی کی کھجلی، عضو کی کھجلی، حمل کے ایام کی رجم میں آدمی رات کے بعد تشنہ درد ہو، کھجلاتے کھجلاتے عورت کو جماع کی خواہش ہونے لگے۔

جلد پر میٹھا پسینہ آئے جس پر کھجلیاں چپکیں، نرخرہ اور حلق ایسا خشک کر سانس لینا مشکل ہو۔ نزلہ کا دم، مریض ہوا سے گہرائے جسم پر دانے نکلنے اور دم کے زور کے دوڑے کیے بعد دیکھے ہوا کریں۔

زیادتی بہ گرمی سے، ٹھنڈے پانی سے، لکھنے پڑھنے سے اور سوچنے سے۔

کسبھی بہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے، پسینہ کے بعد، دن کو سونے کے بعد۔

معاون :- نائٹروک ایسڈ، پلسٹیا، اکونائٹ، کینٹھرس، سپیا۔
 مخالف :- آرم ٹرائفلم۔
 مصلح :- کیسی کم، کاربوویج، بیوسمس، اگنیشیا، مرکوریس،
 زنجبیر۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

CAMPHOR

کیمفر

تخصیصی علامات

- ۱۔ چوٹ کے اثرات بد، سطح جسم ٹھنڈی، چہرہ پیلا، نیلا، بوٹ
 نیلے، عجد کمزوری۔
- ۲۔ جسم چھونے سے ٹھنڈا تاہم ڈھانکنا نہ چاہے (میڈورینیم،
 سیکیل کار)۔
- ۳۔ زبان سرد ہو۔
- ۴۔ ناک ٹھنڈی اور نوکیلیں، جلد اور سانس سرد (ورٹیرم، جٹروفا)۔
- ۵۔ سطح جسم ٹھنڈی، یکایک مکمل کمزوری، اور طاقت سلب ہو جانے
 کے بعد۔
- ۶۔ خسرہ اور سرخ بخار، چہرے پر زردی یا نیلا پن، چہرہ ٹھنڈا اور
 مردوں کا سا۔

عام استعمال

بہیضہ میں تشنجی دوسے، مرگ، زہر باد، سوزاک، دل کے امراض
انفلوئنزا، خسرہ، نیند نہ آنا، سانب کا ڈوسنا، تمباکو کھانے کی عادت
اور ٹوگ جانے کے عوارض میں مشعل و مفید ہے۔

عمومی علامات

آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی، پتلیاں پھیلی ہوتی، تمام اشیاء چمکیلی محسوس
ہوں!

ناک بند ہو، چھینکیں آئیں، موسم کی اچانک تبدیلی سے زکام، ناک
سرد اور بھیچی ہوتی، نکسیر لگانا دہیتی ہو۔

چہرہ زرد، اترا ہوا، حیران، بدلا ہوا، نیلا اور سرد ہو۔

معدہ کی گہرائی میں دبائے والا درد، سردی کے بعد صلب ہو۔

پانخانے سیاہ بلا ارف سے آتے ہوں، بہیضہ کے ساتھ رانوں میں
تشنج ہوتے ہوں، جسم سرد، گھبراہٹ، سخت نقاہت، کمزوری
نہایان اور منہ سرد ہو۔

پیشاب جل کر اور دقت سے آتا ہو، شانہ کی گردن میں کونٹھن،
شانہ پیشاب سے بھل ہوا اور پیشاب بند ہو۔

مردوں میں خواہش جماع بڑھی ہوتی، ایستادگی بہت ہو،
شب کو اتمام ہو جائے۔

دل میں تکلیف محسوس ہو، دم گھٹنے کے سے دور، دمہ خشک
 کھانسی، دل دھڑکتا ہو، سانس سرد ہو، سانس رک کر چلتا ہو۔
 بیخوابی کے ساتھ اطراف جسم سرد ہوں، اعصاب کو جھٹکے گتے ہوں
 اور از حد بقیاری ہو۔

کندھوں کے درمیان مفاصل درد، حرکت میں وقت ہو، خدر یعنی
 سس ہو جانا، سستی اور سردی، جوڑے کڑکڑاتے ہوں، پٹھے کھینچے ہوتے
 پاؤں برف کی طرح سرد، دکھتے ہوں جیسے موج آگتی ہو۔
 بنجار میں نبض چھپوٹ کمزور اور آہستہ چلے، تمام جسم برف کی
 طرح سرد، ٹھنڈے پسینے، سردی جس میں اجتماع خون ہو، زبان سرد موٹی
 اور کانچے۔

جلد سرد، زرد، نیلی، بدن پر کثیر لینیا گوارا نہ ہو۔
 زیادتی :- حرکت سے، شب کو، چھینے سے، سرد ہوا لگنے سے
 کتھی :- گرمی سے۔
 معاون :- کینتھرس۔

مخالف :- کالی نائٹرکیم، کینڈولا۔
 مصلح :- اوریجیم، ناسفورٹس، کینتھرس، ڈوسکامارا۔
 طاقت :- مد ٹنچر اور چھوٹی طاقتیں۔

خصوصی علامات

۱۔ نوزائیدہ بچے اور دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفات، سچہ بد مزاج ہو۔
 ۲۔ سچہ بچہ چڑچڑا، غصہ ور، صدف گود میں اٹھا کر چلنے پھرنے سے ڈرتا ہے۔

۳۔ دروازہ، ماؤزہ، حصص میں سمن ہونے کے احساس کے ساتھ۔
 ۴۔ دست، غصہ یا پریشانی سے یا دانت نکلنے کے زمانہ میں یا زچگی میں۔

۵۔ پانخانہ، گرم، سخت متعفن، بڑے ہوتے انڈوں کی طرح۔
 ۶۔ ماں پر غصہ کے دورے کے بعد دودھ پینے سے سچہ کو تشنہ

عام استعمال

چھوٹے بچوں کے عوارض کی خصوصی دوا ہے۔ علاوہ بری غصہ کے بڑے تھکاوٹ اور کھوکھلے دانت کے دورے لے بھی سچہ نانت ہے۔

عمومی علامات

در در سر جو سوتے پھرتے بھی محسوس ہوتا ہے، چکر لٹینے کے بعد

آنکھوں کی تیلیوں کی سکڑن ، چوڑوں کے کنارے خشک لیکن صبر کو چپک جائیں ، آنکھوں میں جلن ۔

کانوں میں بھنبھناہٹ اور بچاٹنے والا درد ۔
منہ کا ذائقہ کڑوا ، ترش یا پھیکا ، منہ سے گندی بو ، دانت کا خاص کر کھوکھلے دانت کا درد جو بالخصوص رات کو ہو ، گال پھولے ہوئے ، کھانے پینے سے درد بڑھے ، خاص کر گرم اشیا سے ، منہ خشک ، زبان سرخ چٹخی ہوتی ۔

مھوکہ نہ لگے ، غذا سے نفرت ، ریاح بکثرت ، پیٹ میں درد بعض دفعہ غذا اور صفا کرتے ہو جاتے ، ٹھنڈے پانی کی پیاس ۔
دست عموماً رات کو اور درد کے ساتھ ۔

وضع حمل کے بعد عورتوں کے اعضائے تناسل میں درد اور جلن ، زرد رطوبت کا اخراج ، سیاہ پٹکیاں خون کی خارج ہوں ۔

سینہ کی لمبی بڈھی اور زرخیز میں بلغم منے کے باعث گھڑ گھڑاہٹ کھانسی ، سانس کی تکلیف ، بچوں کو سوتے ہوئے خشک کھانسی لگے ۔
پنڈلیوں میں انیٹمن ، گھٹنے چلنے میں آواز دی ، ہاتھ پیر ٹھنڈے ۔
دل کو نیند آتے رات کو بے چینی ہے ۔

بخار لرزہ کے ساتھ ، ایک گال سرخ اور ایک گال زرد ۔
جلد نازک ، سست ، یرقان ۔

زیادتی :- شام کو آدمی رات کے قبل گرمی سے ، غصہ سے ، کھلے ہوا سے ۔

کسبی :- فائدہ کرنے سے ، گرم تر موسم میں ، بیکر گھومنے سے ۔

معاون :- بیلٹوونا، پلساٹیل، میگنیشیا کارب۔
 مصلح :- ایکونائٹ، بورکس، ایومنا، کیفرا، کافیا، کوکولس انڈیکا،
 کوئیم، اگنیشیا، نکس و امیکا، پلساٹیل، ولیریانہ۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CANNABIS INDICA

کینابیس انڈیکا

تخصیصی علامات

- ۱- بہت زیادہ بھول جانے والا۔
- ۲- بولتے ہوئے ایک جگہ شروع کرے اور پھر بھول جائے کہ آگے کیا کہنا ہے۔
- ۳- عجیب و غریب تصورات اور خیالات میں مستغرق رہنا۔
- ۴- ہر معمول سے لفظ پر جو بولا جاتے ہے تماشہ ہنسے۔
- ۵- دماغ میں ایسے صدا ت جیسے پانچے چل رہے ہوں۔
- ۶- وقت اور فاصلے میں بہت زیادہ مبالغہ کرے، چند لمحے بھی عمریں معلوم ہوں اور چند گز بھی کہیں میل محسوس ہوں۔

عام استعمال

حواس کی رکاوٹ حد سے بڑھ جاتے اور دل میں ہر قسم کے توہمات

اور تصورات جاگزیں ہوں تو حسبِ علامات یہ کارگر و مفید دوا ثابت

ہوتی ہے

عمومی علامات

دردِ شقیقہ، سردرد جو پیشاب کی خرابی کے باعث ہو، دردِ نہایت شدید ہو جو مریض کو بے ہوش کر دے، سر کی چونک کھلنے یا بند ہونے کا احساس، یا ایسا معلوم ہو کہ اوپر کو اٹھایا جا رہا ہے، سکنِ پاس کی بیویابی جس کے ساتھ بے چینی ہو، مایوگیلیا، اعصابی درد اور نصف سر کا درد۔ آنکھوں میں اعصابی تکالیف، تمباکو یا شراب کے کثرتِ استعمال سے آنکھ میں تار پڑھ جائے، بوقتِ مطالعہ حروفِ درست نظر نہ آئیں، سوزاک یا خنازیر کے باعث ہو جانے والا آشوبِ چشم۔ معدہ میں فتور ہو لیکن پھر بھی مہوگ نہ پاوے لگے، معدہ میں درد اور نفع۔

سوزاک، پیشاب کی نالی میں جلن ہو، پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ مقامِ گردہ میں چیرنے والا درد ہو۔

سردی میں سوزاک کے باعث جریان، دائمی شہوت ہو اور بعدِ جماعت کمر میں درد محسوس ہو، عورتوں میں دورانِ حیض میں اشدتِ قراہم ہو اور خواہشِ جماع حد سے بڑھی ہوگی، سل ظہری، شدید درد اور ادھر تک کے دہشتہ کو دور کرنے کے لئے بہترین دوا ہے، خونِ خرابوں کا آنا یا راست کو خوف سے چونک پڑنا اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔

زیادتی :- صبح کے وقت ، چائے یا تمباکو نوشی سے ، دائیں جانب لیٹنے سے ۔

کسی :- تازہ ہوا سے ، سرد پانی اور آئینہ سے ۔
طاقت :- مدد ٹیکر سے ۳ x تک ۔

CANNABIS SATIVA

کینابیس سٹاپٹروا

خصوصی علامات

- ۱۔ احساس جیسے پانی کے قطرے واحد حصص سے واحد حصص پر گر رہے ہیں ۔ سر پر ، مقعد سے ، معدے ، دل سے ،
- ۲۔ تنگی ، تنفس ، مریض صرف کھڑے ہو کر ہی سانس لے سکے ۔
- ۳۔ سوزاک کا پہلا درجہ

عام استعمال

مرض سوزاک کے پہلے درجہ کے لئے یہ مخصوص ترین دوا ہے ۔ اگر اس مرض کے لئے کوئی دوسری دوا منتخب کرنا دشوار ہو جائے تو یہی دوا استعمال ہو سکتی ہے ۔ اس دوا کے لئے سوزاک کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی کو چھوٹے جانے سے یا دبانے سے بے انتہا درد ہوتا ہے جس کے باعث مریض ٹانگیں

پھیلا کر چلتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے مواد گاڑھا اور سبز ہو جاتے تو مرکب دس سال دینے سے پورا فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر کین بس مٹا گیا کے بعد مواد سبز اور گاڑھا ہو اور ساتھ ہی کین کی زیادتی باقی ہو تو مرکب دس سال کا مناسب ہوگی۔ نیز اگر پیلا، سفید یا گاڑھا مواد ہو تو پیلا ٹیلا کی ضرورت ہوگی۔ پرلے سوزاک میں سفر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سر میں چکر، ایسا محسوس ہو کہ سر پر پانی ٹپک رہا ہے۔ ناک کی جڑ پر بوجھ۔

آنکھوں میں عصبی خرابی یا شراب اور تمباکو کے کثرت استعمال سے مٹا پڑ جائے۔ نگاہ کے سامنے دھندلاہٹ، سوزاک کی وجہ سے آشوب چشم، خنازیری مافے کی وجہ سے آنکھ کی تکالیف۔ پیشاب رکا ہوا، اس کے ساتھ قبض، پیشاب کی حاجت، اس کے ساتھ درد، پیشاب کرنے میں کئی دھاریں نکلیں، پیشاب کی نالی میں چھین، پیشاب کرتے وقت جلن جو کہ متانہ تک ہو، کھوتنا ہوا پیشاب ہو، شدید سوزاک، پیشاب کی نالی میں سخت جلن، مریض ٹانگیں پھیلا کر چلے، خصیوں میں گھنچاؤ، ایستادگی، پیشاب کی نالی مواد کے باعث بند ہو جائے۔

سانس کی تکلیف اور دھڑکن جس کے باعث اٹھ کر بیٹھنا پڑے، سینہ میں بوجھ، سانس لینے میں گھڑ گھڑاہٹ، کھانسی کے

ساتھ سبز یا خون ملا ہوا بغم نکلے۔ ایسا معلوم ہو کہ دل سے پانی کے قطرے
پھینکتے ہیں، دھڑکن ہو۔

رات کو خواب بہت آئیں، صبح کو تھکاوٹ زیادہ ہو، دن میں
نمید آئے۔

موج لگنے کے بعد انگلیوں میں کھنچاؤ، زینہ چڑھنے سے گھٹنے کی
بڑی اکھڑ جاتے۔ زینہ چڑھنے پر پیر بھاری معلوم ہوں، پیر کے
انگوٹھے کے نیچے تلووں کی تکلیف۔

زیادتی :- لیٹ جانے سے، زینہ چڑھنے سے۔
مخالف :- کیمفر

مصلح :- کیمفر، اسٹاکس
طاقت :- مدد ٹنچر سے ۳ طاقت تک اور ۳ طاقت

CANTHARIS

کینتھارس

تخصّوصی علامات

- ۱- درد جلن دار، چھوٹے کے سے جسم کے مرحقہ میں۔
- ۲- پیشاب کی مسلسل خواہش یا پیشاب کی بیکام حاجت۔
- ۳- پیشاب کی نال میں شدید خارش۔
- ۴- پیشاب کے قبل، دوران اور بعد ناقابل برداشت حاجت

- ۵۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلبن اور کٹن والے درد۔
 ۶۔ پاخانہ کے ساتھ ایسی آؤں جیسے آنتوں کے ٹکڑے ہوں۔
 ۷۔ تمام دمی تکالیف میں جلبن درد اور پیشاب کی ناقابل برائت

حاجت۔

عام استعمال

آلات تناسل، پیشاب کے اعضا، نیز آلات ہضم، آلات تنفس اور آنتوں کی رطوبتی جھلیوں میں دکھن اور جلبن والے عوارض اس دوا کے طالب ہوتے ہیں۔

عمومی علامات

دوبھی طور پر مریض نزل، پست بہت، روہینے والا اور غصہ ہوتا ہے۔

سر ہی جکڑن، سر کے نیچے کوچن، بھجے میں جلبن اور دکھن درد، سرگردن کی طرف سے اوپر چڑھے، من پٹیوں میں تپن۔ آنکھوں میں جلبن اور دکھن، آنکھیں زرد، چیزیں زرد معلوم ہوں، مزمن زکام اور نزل، ناک سے بلغم نکلے، سرخی اور جلبن۔ چہرہ زرد جس سے کہ تشویش اور فکر آتی ہو، چہرہ پر سرخی اور جلبن یا آبلے جن میں کھلی اور جلبن ہو۔

منہ میں آبلے پڑے ہوں، حلق میں یا حلق کے غدد میں سوجن اور جلبن پانی پینے سے زیادہ ہو، مسوڑھے میں ناسور ہو گیا ہو، منہ

سے مال ہے۔

ہونٹوں کی خشکی کے باعث پیاس مگر پانی سے نفرت ہو،
جھوک بالکل نہ ہو، معدہ میں جلن اور ورم، ورم جگر، متلی اور تھکے
تبض، سخت پانخانہ ہو، پیمیش میں سفید یا زرد سرخی مائل آؤں
نکلے، ایسا معلوم ہو کہ آنتیں کھری جاتی ہیں، سبز خون مل آؤں، پانخانہ
سے قبل تو لہجی درد، پانخانہ کے دوران میز پر جلن ہو، بعد پانخانہ کے
میز میں اینٹن، جلن دار اور نیش زدن کا سادرد۔

پیشاب بمشکل خارج ہو، پیشاب کی سخت حاجت ہو مگر قطرہ
قطرہ جلن کے ساتھ نکلے، گردہ میں ورم، جلن اور نیش زدن ہو،
سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں جلن ہو اور خون نکلے، مثانہ
کے مقام پر چھونے سے سخت درد ہو۔

خواہش جامع زیادہ ہو، عرصہ تک ایسا دگ بے مگر درد
کے ساتھ جریان ہو، عورت کو حیض بہت جلد اور بہ کثرت ہو اور
سیاہ خون خارج ہو، سیلان رحم چھیلنے والی رطوبت خارج ہو،
پیشاب کرنے میں جلن، خواہش مباشرت بڑھ جائے۔
زیادتی :- چھونے سے، پیشاب سے، ٹھنڈے پانی یا تھوہ
پینے سے۔

کسی :- ملنے سے

معاون :- کیمفر

مخالف :- کافیا

مصلح :- اکونائٹ، ایپس، کیمفر، پساٹیل، لاروسیرا،

ریوم، سمفاٹم۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CUPRUM METALLICUM

کیوپریم مٹلیکیم

خصوصی علامات

۱۔ تشنج یا اینیٹن کی کیفیت نوبتی طور پر بیک وقت کئی ایک مقامات پر۔

۲۔ جاگتے رہنے سے ناقابل برداشت پریشانی کے دورے۔

۳۔ ابھاروں کے دوبارہ اندر چلے جانے کے نتائج بد، خاص کر تشنجی دورے۔

۴۔ تشنجی دورے جو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں سے شروع ہوں

۵۔ کھانسی سے گڑگڑاہٹ کی آواز جیسے بوتلی سے پانی نکل رہا ہو

۶۔ کالی کھانسی جس سے دم گھٹے، سانس نہ آئے، چہرہ نیلا پڑے

جلتے، جسم سخت ہو جائے یا اکڑ جائے، مسلسل تین حملے

(سٹانم)

عام استعمال

مختلف عوارض کے ساتھ اگر تشنج اور مروڑ پڑنے کی علامات ہیں

موجود ہوں تو یہ مستقل و مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غم و اندوہ کا شکار ہو، سرسام کا میلان۔
 سر ہچکے، مریض محسوس کرے کہ آگے کی طرف گر پڑے گا۔
 سر میں پاگل بنانے والا بوجھ اور چاند پر جھنجھناہٹ۔
 آنکھ میں درد، بے چینی کی وجہ سے آنکھیں گھمانا پڑیں، شہایت شدید
 زہام جس کی وجہ سے نیتھے بند ہوں، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے۔
 دانت میں درد، جو کہ کن پٹی تک ہو، منہ میں جھاگ، زبان پر
 سفید میل، ذائقہ میٹھا۔

ہچکی، متلی، تپنے کرنے کو جی چاہے، صفرا کی تپ ہو، معدہ میں
 تشنج، دست اور دور، معدہ میں تکلیف، وہ بوجھ جو کہ چھپونے
 اور حرکت کرنے سے زیادہ ہو، یکا یک درد اور دورہ ہوا اور اس
 کی وجہ سے چیخے۔

سخت اسہال و دست آنا، بار بار اور تھوڑا تھوڑا پیشاب ہو۔
 خشک کھانسی، دم گھٹنے والے درجے کے ساتھ، سینہ کے درد
 کے ساتھ، آلات تنفس کا سکڑنا اور اس میں تشنج ہونا۔

ہبضہ شکم اور نینڈلیوں میں اینٹیجن کے ساتھ۔
 تشنجی دوسے، چہرہ نیلا پڑ جائے اور انگوٹھے ہتھیلیوں میں جکڑ

جائیں۔

بازوؤں اور ٹانگوں میں اینٹیجن، درد تلووں میں، نینڈلیوں اور اعضا

میں بچید تھکاوٹ کے ساتھ ۔

بہالت محل، ولادت کے بعد تشنجی دور ۔

زبان کا فالج، لڑکھڑاہٹ والی ناممکن گفتگو ۔

مرگ، شعلہ گھٹنوں سے شروع ہوا اور اوپر کو جائے ۔ زیادہ تر درات

کے وقت، نیند کی حالت میں (بچوں) نئے چاند کے قریب باقاعدہ

وقفوں پر، سر کے بل گرنے سے یا سر کو چوٹ لگنے سے ۔

زیادتی :- وایاں جانب چھونے سے، حرکت سے، لیٹنے سے،

دبانے سے، جھٹکنے سے، تپنے کرنے سے، حیض سے قبل ۔

کسی :- بہالت پسینہ ٹھنڈا پانی پینے سے، گرمی سے، پاخانہ آنے

سے، پسینے کے دوران ۔

معاون :- کلکیر یا ۔

مصلح :- اورم، بیلا ڈونا، کیوٹلا، چائنا، کونیم، سائیکوٹا، ڈکامارا

ہیپر سلف، مرکوریس، اپیکاک، نکس و امیکا، پلسا ٹیلا،

وربیٹرم ۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک اور اوپر ۔

GRAPHITES

گریفائٹس

تخصیصی علامات

- ۱۔ مریضہ غم زدہ اور بالویس ہے ، گانے سن کر رونے ۔
- ۲۔ آکات تناسل کے بیجا استعمال سے کمزوری ۔
- ۳۔ لیوکوریا ، دن اور رات کئی بار شدت سے بہے ۔
- ۴۔ جلد کی خرابی ، ہر چوٹ یک جہے (ہیرسلف)
- ۵۔ اجار کانوں پر جن سے پانی کا ساشٹاف چپکے دار مواد یا رطوبت
- رہے ۔
- ۶۔ مریض شور و غل میں بہتر طور پر سن سکے ۔
- ۷۔ دیرینہ قبض ، پاخانہ بہت ٹرا خارج ہو (سلفر)

عام استعمال

اس دوا کے خاص اثرات جلد پر ہوتے ہیں ۔ توجیحی دانے ، اکوتز ، جلد میں شگاف پڑ جانے وغیرہ علامات والے عوارض میں مستعمل و مفید ہے ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غم زدہ اور بد مزاج ہو ، ذرا ذرا سی بات سے چڑھ

جاتے، کام کرنے کو جی نہ چاہے۔

سر میں نشہ کی سی کیفیت محسوس ہو، صبح کے وقت جاگنے پر دردِ سر ایک جانب تھے کرنے کو جی چاہے، دردِ دانتوں اور گردن تک جاتے، چاند پر جلن، سر پر تر اور چھپے بدبو دار دانے۔
آنکھوں کے پوٹے سرخ اور سوجھے ہوتے، پوٹے خشک، پوٹوں پر زخم۔

کان کے اندر خشکی، کان کے پیچھے تری ہو اور دانے نکلے ہوتے ہوں۔
کم سناتے، منہ چلانے میں کان میں پھٹ پھٹ ہو (سلیشیا جلیسیا)
ایکے کس، کان میں گویا بندوق چھوٹے۔

دورانِ حیض صبح کے وقت معدہ کی خرابیاں، معدہ بوجھل، پیٹ میں جلن اور جھوک معلوم ہو، پیٹ پھولا ہوا اور سخت جیسا کہ ریح کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کبھی تبض بڑے سددوں والی، کبھی دست بے ہوشنگ کے،
غیر مضم شدہ نہایت بدبو دار، مبرز میں شکاف۔

مردوں میں خواہشِ جماع زیادہ مگر قوتِ مباشرت کم ہو جائے۔
قبل اس کے کہ کافی ایستادگی ہو منی خارج ہو جائے، فوطوں کا درد،
مستق۔

مستورات میں اندامِ نہانی میں دکھن، خصیۃ الرحم میں درد، حیض بہت دیر میں اور قلیل ہو۔

سانس کی نالی میں کھر کھراہن، دمہ، دل میں دھڑکن، پستان کی گھنڈی میں شکاف۔

انگلیوں کے جوڑوں میں موج کا سادرو، ناخن اندر کی طرف
 پڑھیں، ٹانگوں کے دانوں سے شہد کا سا مواد نکلے۔
 جلد کے غدودوں میں ورم جہاں اعضاء کی شکن ہو، زخم جن سے
 بدبودار یا چیچپا مواد نکلے۔ جلد نا تندرست، جلد پک جایا کرے۔
 زیادتی :- سردی سے یا سرد ہو جانے سے، رات کو دوران حیض
 میں، اس کے بعد، کھانے کے بعد۔

کسی :- ڈکاروں سے، کھل ہوا میں چلنے سے۔
 معاون :- کاسٹیکم، ہیرسلف، لائیکو پوڈیم۔
 مصلح :- آرسینکیم البوم، نکس و امیکا۔
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

GLONOINE

گلو نائن

تخصوصی علامات

- ۱- سر کی تکلیفات، چولہے کی گرمی یا دھوپ میں پھرنے سے
 (لیکے کس، نیٹرم کارب)
- ۲- سن سٹروک (لوگنا) یا دھوپ سے پیدا شدہ درد سر۔
- ۳- دماغ بہت بڑا، جبر ہوا اور ٹھنڈا محسوس ہو، ہر جھٹکے، چپکولے،
 قدم یا نبض کی ہر ضرب پر دماغ میں تسپکن محسوس ہو۔

۴۔ حیض کی بجائے سر میں درد شروع ہو جائے ۔

۵۔ درد سر جس کے ساتھ سر میں اجتماع خون کی علامت بھی موجود ہو۔

عام استعمال

گرمی یا سردی کی کثرت کے باعث یا آگ کی تیز تپش کے قریب کام کرنے سے یا شدید دھوپ سے یا حیض کی خرابیوں سے دوران خون دل و دماغ کی طرف بٹھ جانے سے جو عارض ہوں ان میں یہ دوا کھلائی ہے۔

عمومی علامات

سر میں الجھن، چکر، سر کو شدید گرمی لگ جانا، ٹو لگنا، سر بھاری ہو لیکن تکیہ پر نہ رکھا جاسکے، سر کے گرد گرمی برداشت نہ ہو سکے، تپکن والا درد سر، سر کو کھلا رکھنے سے درد سر، دھوپ کے باعث درد سر، حیض کے بجائے درد سر، حاملہ مستورات کے سر کی طرف دوران خون، درم دماغ۔

آنکھوں کو ہر چیز نصف روشن اور نصف تاریک معلوم ہونے جھوٹے چھوٹے معلوم ہوں، آنکھ کے سامنے تاریک معلوم ہوں، کان میں تپکن، دل کی رفتار اپنے کانوں میں خود سنائی دے۔ و انت میں تپکن والا درد، گردن بھاری محسوس ہو، کالر ٹھیلانے کی خواہش، چہرہ سرخی۔

پیٹ میں درد، منگی وقتے، پیٹ میں کھرجن ہو، قبض یا اسہال
براسیر میں کھجلی اور درد، نحیف مشقت سے دل و دماغ کی طرف دورانِ
خون بڑھ جاتے۔

مستورات کے حیض میں دیر ہو یا یکایک بند ہو جاتے اس کے
باعث دماغ میں اجتماعِ خون۔

زیادتی بہ دھوپ سے، آفتاب سے، آگ یا گیس کے سامنے،
تھکنے سے، بال کٹانے سے، صبح سے بارہ بجے دوپہر تک۔
کھی و۔ برانڈی سے۔

معاون :- بیلا ڈونا۔

مصلح :- ایجوناتھ، کیمفر، کافیا، نکس و امیکا
طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ تک

GOSSYPIUM

گوسی پیم

تخصیصی علامات

- ۱۔ بیضتہ الرحم میں رہ رہ کر ہونے والا درد۔
- ۲۔ ایسا محسوس ہو کہ حیض جاری ہو گا مگر جاری نہ ہو۔

عام استعمال

رچی خرابی کے اثر سے کوسس سے لاحق ہونے والے عوارض میں یہ دوا عام طور پر مستعمل و مفید ہے۔ حیض کو جا رہی کرنے کے لئے یہ دوا مدد سچر کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ دیگر عوارض میں ہر مہینہ چھک طریق پر ۶ طاقت تک مستعمل ہے۔

عمومی علامات

عصبی مزاج، دراز قامت اور کئی خون والی مریضوں کی تکالیف حیض۔

سر میں درد جس کے باعث مریضہ سر کو پشت کی جانب جھکانے پر مجبور ہو۔

متلی، صبح کو ناشتہ سے پہلے تپ ہونے کا میلان۔

اندام نہالی کے لب سوجے ہوئے اور کھلاتے ہوں۔

حیض بالکل بند ہو۔

پستان میں رسولی ہو۔

حیض پانی جیسے ہوں، کمر میں درد، پیڑ میں کھچاؤ اور بو بھل پن۔

رجم میں رسولی جس کے ساتھ معوہ کا درد اور کمزوری۔

طاقت :- مدد سچر سے ۶ طاقت تک۔

تخصیصی علامات

- ۱- پانی کو دیکھنے سے، چلتے پانی کی آواز سے یا عراجی سے پانی کے نکلنے کی آواز سے تمام تکالیف بڑھ جائیں۔
- ۲- زخم نیگلوں ہو جائیں (لیکے سس)
- ۳- دھوپ یا سورج کی گرمی برداشت نہ ہو سکے۔
- ۴- درد سر، زیادہ چکدار اور روشنی سے یا چلتے پانی سے۔
- ۵- چلتے پانی کو دیکھنے پر مسلسل پیشاب کی خواہش (کنیتھرس)

عام استعمال

باؤلے کتے یا دوسرے عام کتے کے کان کے علاج میں عام طور پر استعمال اور مفید ہے۔

عمومی علامات

باؤلے کتے کے کان سے باؤلے پن کا اندیشہ ہو۔
تکلیفات جو خواہش جماع کی زیادتی سے پیدا ہوں (خواہش جماع کو روکنے سے تکلیفات ہوں تو کو نیم)
ذہنی جذباتیت یا بے عزتی سے تکلیفات میں اضافہ ہو۔

تشخیصی دوسے کسی چیز سے منعکس ہو کر آنے والی تیز روشنی سے
یا چونڈھیا دینے والی روشنی سے (سٹرا مو نیٹیم) ، کسی سیال چیز کا خیال
آنے پر ، چھوٹے جانے سے یا ہوا کے جھونکے سے ۔
ورد سہرا ، باڈے یا دوسرے کتے کے کاٹے سے ۔

تھوک ، تار دار ، لہیں و اہر سخت ، جھاگ دار منہ میں اور حلق میں
مسلسل نکلنے کے ساتھ (ہائڈراسٹس)
حلق میں ورد مسلسل نکلنے کی خواہش کے ساتھ رلیک کینٹیم ،

(مرکب)

نکلنے میں دشواری ، غذا کی نالی میں سیال چیزوں کو نکلنے سے
انہیٹن ، پانی نکلنے وقت گلا گھٹتا ہوا محسوس ہو ۔
رحم کا اپنی جگہ سے گرنا ، ستر مرگاہ میں ذکی المحتی ۔
زیادتی :- پانی کو دیکھنے یا پانی کی آواز سے ، چمک دار ، چونڈھیا دینے
والی روشنی سے (سٹرا مو نیٹیم) گاڑی کی سواری سے (کو کولس) ،
سورج کی گرمی سے ، جھپکنے سے ۔

مصلح :- انجینس کاسٹس ، بیلا ڈونا ، سڈرن ، فگیس سلواٹیکا ، ہایوسیا ،
لیکے کس ، سٹرا مو نیٹیم ۔
طاقت :- ۳۰ طاقت اور اوپر ۔

خصوصی علامات

- ۱۔ گہری ترقی کرنے والی اور دیرینہ بیماریاں ۔
- ۲۔ درد، جس میں زیادتی چار بجے شام سے آٹھ بجے رات تک ہو۔
- ۳۔ داہنی جانب ماؤف ہو جائے یا درد دائیں سے بائیں کو جائیں۔
- ۴۔ نحتنوں کی حرکت ٹکھے کی سی (اینیم مارٹ)۔
- ۵۔ نزلہ خشک، ناک رات کے وقت بند ہو جائے۔ منہ سے سانس لینا پڑے۔
- ۶۔ ڈونٹھیریا، تھلی دائیں ندرد سے بائیں کو جائے۔ زیادتی ٹھنڈی چیزیں پینے کے بعد ہو۔
- ۷۔ ہاضمہ کی خرابیاں، ریاخ بچید جمع ہو جائیں۔
- ۸۔ جھوک اچھی لیکن چند ہی لمحوں کے بعد محسوس ہو کہ گلے تک بھرا گیا ہے۔
- ۹۔ پیٹ میں اونچی آواز سے گڑگڑاہٹ ہو۔
- ۱۰۔ پیشاب میں سرخ ریت ۔
- ۱۱۔ بچہ پیشاب سے پہلے چلائے (بورکھیں)۔
- ۱۲۔ بوڑھے افراد کی نامردی، بچید خواہش جماع کے ساتھ لیکن ایسا نہ کیاں ناممکن ہوں، دوران جماع سو جائے، انزال قبل از وقت

عام استعمال

عام طور پر نظام ہضم کی خرابیوں اور جنسی کمزوری اور ضعف باہ میں مستعمل ہے۔ علاوہ بری حسب علامات مذکورہ ذیل کیفیات میں کارآمد ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض معزوم، روہینے والا اور لا پرواہ۔ سر میں درد، آنکھوں پر گونا گونی، کانوں میں کھجلی، مواد بہا پین سرد ہوا سے کان میں درد، سونگھنے کی قوت نہایت تیز، تکسیر حلق کے ذریعہ کا درم جو داہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں جانب کو جلتے۔

باضمہ کمزور، معدہ میں سٹرن اور گڑ گڑاہٹ، پانخانہ اور پیشاب مقدار میں کم۔ پیشاب کرنے سے قبل درد۔ مردوں میں خواہش جماع بہت کم، عضو ناسل چھوٹا، ٹنڈا اور ڈھیلا ہو جائے۔ مستورات کے حیض بلبلا اور کثرت ہوں، فرج سے ہوا کا اخراج، کثرت سیلان رحم مع درد کے داہنی طرف سے بائیں طرف۔

خشک کھانسی، دق، سیل مع کھانسی کے۔ گردن کی جکڑن، کمر میں ریڑھ کے قریب درد۔

انگلیوں کے جوڑ اور سرے پر درد اور دم، کولہے میں، رانوں میں
 ابری میں اور پیر کے انگوٹھے میں درد، پاؤں سرد۔
 بنجارہ زہ کے ساتھ ہو۔
 جلد پر کھین تریا ناسور۔

زیادتی :- چار بجے شام سے آٹھ بجے تک، کھانا کھانے کے بعد،
 ٹھنڈا کھانے پینے کے بعد، نکلین کھانے کے بعد۔
 کھی :- ٹھنڈک پانے پر، کپڑا اتار دینے سے، گرم کھانے یا پینے پر،
 کپڑا ڈھیلا کرنے پر۔

معاون :- چیلڈرنیم، آئیوڈیم، اگنیشیا، ایپیکاک، کالی آئیوڈائیڈ،
 پلساٹیل، کاربوڈیج۔

مخالف :- کافیا، نکس موسکاٹا (سلفر کے بعد لائیکوپوڈیم کا استعمال
 نامناسب ہے)۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک نیز زیادہ اور سچی طاقتیں۔

LILIUM TIG.

للیئم ٹیگ

خصوصی علامات

- ۱۔ سر کی چوٹی یعنی چاند پر وحشت کا احساس۔
- ۲۔ بے حد بے حوصلگی۔

- ۳۔ اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھتے تاکہ خواہش نفسانی دبی رہے۔
- ۴۔ بے مطلب تیز حرکات (اردضئم ناثریکیم)
- ۵۔ بار بار حاجت پشیاہ کی۔
- ۶۔ نیچے دبانے والے احساس شکم میں اور پیڑوں میں۔
- ۷۔ حیض، اورار، صرف اس وقت ہو جب مریض حرکت کرتی ہو۔
- ۸۔ احساس جیسے دل شکنجہ میں جکڑا گیا ہے (لیکے سس)

عام استعمال

اسہال، پیمیش، آنکھ و دل کے امراض، ہسٹیریا کی دھڑکن، تھوڑی کی تکالیف، اندام نہانی کی کھلیں، امراض رحم، پشیاہ زیادہ آنا، دھڑکن، درد دل وغیرہ کے امراض میں مفید ہے۔ جسم کے بائیں جانب اس دوا کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ لیکے سس میں بھی ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض پست سمیت ہو، رو دینے کو طبیعت چاہے بغیر رستے رہانہ جائے، یادداشت خراب، بے چینی، درد سر خاص کر دھمی تکالیف کے باعث۔ کبھی بائیں طرف کبھی داہنی طرف، درد سر چاند پر لوجہ، جب دھمی تکالیف کم ہوں تب دماغی شروع ہوں، گدی میں درد، خاموش نہ رہ سکے، خواہش نفسانی کو دبانے کے لئے کسی کام میں مشغول رہنا پڑے، تنہا رہنے سے گھبراہٹ ہو۔

نگاہ و منڈل، پڑھنے لکھنے کے بعد نظر کی کمزوری، تاکہ بند ناک کو

زور سے ملے، داہنے کان میں درد، سونے کے وقت کان میں آوازیں
گرمی کی وجہ سے چہرہ تمٹمایا ہوا، داہنی طرف کی گال کی ہڈی میں درد
اور داہنا نتھتا بند ہو، دانت سے لے کر کان تک درد ہو، زبان پر
زرد میل، رال بکثرت، داہنی طرف کی حلق کی گلٹی پھولی ہوئی۔

چمکی، تھلی، پیٹ میں کچھ سخت چیز گھومتی معلوم ہو، پیٹ پھولا ہوا
گراڈ ٹائیسٹ، ایسا بوجھ معلوم ہو کہ ہر ایک چیز اندام نہانی کی طرف
نکل جاتے گی۔ پیڑ میں تھڑا ٹھنڈا ہٹ، ایسا معلوم ہو کہ پیڑ میں سے کچھ
ٹشکا پڑتا ہے یا یہ کہ پیڑ کے تمام اعضاء باہر نکل جائیں گے۔ (میورکس)
سیاہ، ٹیک کینٹم)

مقعد پر بوجھ، متواتر پاخانہ کی حاجت، صبح کو اسپہال، اس کے
ساتھ خروج رحم، نبض سخت پاخانہ، پیشاب برابر ہو اور پیشاب کی
نال میں جھک ہو، صبح کو پیشاب دودھیا ہو، خصیتہ الرحم اور پیڑ کے
ریشوں میں کمزوری جس کے باعث رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے (ہیلوٹائس)

سیاہ

حیض جلد، مقدار میں کم، سیاہ متعفن، نلوں میں درد اور حسبن
نلوں کا درد ران تک جائے، خواہش جماع زیادہ۔

سینہ میں کساد ٹ، داہنے پھیپھڑے میں درد، دل میں پھیر پھار
دل کی رفتار بڑھی ہوئی تریبا ۱۵۰ سے ۲۰۰ تک ہو۔

مانڈا پیرا، کمر گردن وغیرہ میں جلن، درد اور تشنج
ذیبادتی :- گرم مکان میں، دلجوئی سے۔

کسکی :- تازہ ہوا میں۔

مصلح :- ہیلونائس ، نکس و امیکا ، پلسا ٹیلا ، پلاٹینا ،
طاقت :- ۳۰ اور اوپر

LOBELIA INFLATA

لوبیلیا انفلاتا

خصوصی علامات

- ۱- بچہ متلی اور تے ۔
- ۲- کالی کانسی ، جس کے ساتھ سانس میں تنگی ہو اور دم گھٹنے کا اندیشہ ہو ۔
- ۳- تے ، جس کے ساتھ چہرہ پسینہ سے شہر ابور ہو جائے ۔
- ۴- حمل کے دوران متوک کی زیادتی اور مزمن تے کی تکلیف اچھی خاصی بھوک کے ساتھ ، متلی کے ساتھ اور پسینہ کی زیادتی کے ساتھ ۔
- ۵- سینہ میں بو عھل پن اور دم کا احساس جس میں کمی تیز چلنے سے ہو ۔
- ۶- کمر میں بچہ نوکی الحسی ، ذرا سا چھوٹا یا نرم تکیہ بھی برداشت نہ ہو سکے ۔

عام استعمال

یہ دوا تمباکو ، شراب اور چائے کے کثرت استعمال کے اثرات بہ

کو دور کرتا ہے۔ نیز باضمہ کی خرابی جو نم معدہ کی کمزوری پر مشتمل ہو یا شدید قسم کی متسلی، تپ، تقاہت، زرد روی، ٹھنڈے پسینے اور خشوک کی کثرت، قے الدم، بد ہضمی کے باعث دردِ سر اور دمہ کو نافع ہے۔

عمومی علامات

خشک دہر جس کے باعث سینہ میں بوجھ اور رکاوٹ محسوس ہو، سینہ میں اجتماعِ خون ہو، تکلیف پھیپھڑے کے تاعدے میں شدت سے ہو، دل کی حرکت میں رکاوٹ۔

چوڑی کی پٹی ذکی الحس ہو اور مریض جھک کر بیٹھنے کے لئے مجبور ہو۔
پیشاب گاڑھا سرخ رنگ کا ہو۔

جلد پر خارش سے امتلا پیدا ہو۔

زیادتی، تمباکو نوشی سے، سرد پانی سے، غسل اور حرکت سے کسب تیز چلنے سے، گرمی سے اور شام کو۔
طاقت پر عموماً ۳ طاقت بہت متعل ہے۔

لیڈم پال

LEDUM PAL.

خصوصی علامات

- ۱۔ بائی کے درد یا گٹھیا نیچے سے شروع ہوا اور اوپر کو چڑھے۔
- ۲۔ درد چھیننے والے، بستری گرمی سے اور کپڑا اوڑھنے سے بڑھتی (مکسوریسی) کمی ہو جب پاؤں کو برت کے پانی میں رکھا جائے۔
(سکیلیں)
- ۳۔ تکلیفات ان لوگوں کی جو ہر وقت سردی محسوس کرتے ہوں۔ ہمیشہ سردی اور جاڑا محسوس کریں۔
- ۴۔ زخمی حصص چھونے سے ٹھنڈے معلوم ہوں۔
- ۵۔ سرخ پٹیاں یا کانٹھیں پیشانی اور رخساروں پر۔
- ۶۔ چوٹیں لگنے کے بعد مدت مزید تک بد زندگی قائم رہے یا سہز نشان بن جائے۔

عام استعمال

درد، کیتروں، مکوڑوں کا ڈنک، مارنا یا کاٹنا، پٹیاں، بہاؤ، اکوتہ، چہرے پر مہاسے، پیروں میں درد گٹھیا، گرمی لانے، وجہ مفصل، بسہری، زخم وغیرہ میں مفید ہے۔

عمومی علامات

دورانِ سر، دردِ سر، ٹوپی پہننے سے تکلیف بڑھ جائے۔
 آنکھ میں درد اور خون جاری ہو، مفاصلِ دردوں کے ساتھ موتیابند
 بخساروں پر سرخ مہاسے اور چھنیاں، چہرہ ذکا المحس۔
 پاؤں کے تلووں اور ایڑیوں میں سردی سے یا بھیگ جانے سے
 زخم، نوک دار آلات سے زخم، خاصہ جی طور پر مچھروں، بھڑوں کے
 لائے کے لئے بہترین دوا ہے۔

زیادتی :- رات کو بستر کی گرمی سے
 کمی :- سردی سے

- معاون :- سیپا
- مخالف :- چائنا
- مصلح :- کیفین، رسٹاکس
- طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

خصوصی علامات

- ۱۔ سن یاس کی تکلیفات
- ۲۔ بائیں جانب خصوصاً ماؤت ہو جائے، تکلیفات بائیں جانب شروع ہوں اور دائیں جانب جائیں۔
- ۳۔ سجدہ کی الحس پھونے سے۔
- ۴۔ تمام علامات خصوصاً دماغی بڑھ جائیں، نیند کے بعد یا تکلیفات کی زیادتی سے بیدار ہو جائے اور پھر تکلیف کی زیادتی میں ہی سو جائے۔
- ۵۔ مریض بے حد باتوں، ایک ایک لفظ سے کوئی سی کہانی لے بیٹھے۔
- ۶۔ قبض، مقدر کے چھتے میں سکڑن کا احساس۔
- ۷۔ حیض ٹھیک وقت پر ہوں اور حیض کے دوران دوسری تکالیف میں کمی۔
- ۸۔ پنکھا ہلائے جانے کی خواہش لیکن آہستہ اور ذرا دور سے۔
- ۹۔ پھوٹے، کادے، بنگلے، سیاہ بنگنی یا نیلے رنگ کے۔
- ۱۰۔ بنجانہ، جس میں زبان کانپے یا باہر نکالتے وقت نچلے داخوں میں پھنس جاتے۔

۱۱۔ ڈنٹھیر یا بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں جانب کو جائے، گرم چیز پینے سے زیادتی، تقیل اشیا کی نسبت زمینق اشیا ر نکلنے میں زیادہ درد اور تکلیف ہو۔

عام استعمال

حیض وقت سے یادر کے ساتھ، ٹائیفائیڈ، ہڈیان، بائیں جانب کا فالج، جھکنڈ، بیتقان، پھوٹے، خناق، خون کا نہر علیا، دم، ہیضہ اور جگر کی سوزش میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض ٹھکن، پست حوصلہ اور کامل الوجود ہو۔

درد سر جن میں زیادتی حرکت سے، دبانے سے، جھکنے سے، لیٹنے سے یا نیند کے بعد۔

دماغی اکساہٹ، قریب قریب الہامی اور پیغمبری دعویٰ۔

بواسیر حیض کی کمی کے ساتھ یا سن یاس میں، مسوں میں درد۔

سیلان خون کا میلان، چھوٹے چھوٹے زخموں سے جلد تڑا اور مقدار

میں زیادہ، خون سیاہ جو منجھ نہ ہو۔

سجادہ زینت طور پر ہر سال آئے۔

مشانہ میں گیند لڑھکنے کا احساس۔

زیادتی ہر نیند کے بعد، نیند کے دوران، بائیں جانب، موسم بہاریں

گرم غسل سے، دباؤ یا سکڑن سے، گرم چیزیں پینے سے، آنکھیں

بند کرنے سے۔

کسی :- رطوبات کے یا حیض کے جاری ہونے سے ۔
معاذن :- ہیرپلسف ، لاسیکو پوٹویم ، آئیوڈیم ، کالی آئیوڈائیڈ ، ٹارٹرک
ائیڈ ۔

مخالف :- ایسیٹک ایسڈ ، امونیا کارب ، سیپیا ، ٹوٹکامارا ،
سورنیم ، کاربانک ایسڈ ۔

مصلح :- آرسینکیم ، بیلاڈونا ، نکس و امیکا ، ناسفورک ایسڈ ۔
طاقت :- ۱۲ طاقت سے ۲۰۰ تک اور اوپر ۔

MOSCHUS

ماسکس

تخصوصی علامات

- ۱۔ ہسٹیریا اور اعصابیت جس کے ساتھ غشی کے دور ہوں ۔
- ۲۔ مریض کو نفس پر قابو نہ ہو ۔
- ۳۔ تشنجی اور عصبی نوعیت کی ہچکچ کے دور ۔
- ۴۔ مردوں میں خواہش جماع بہت بڑھی ہوئی ۔
- ۵۔ دمہ ہیبیدے چینی کے ساتھ ، بہت زیادہ کھانسنے کے بعد بھی
بلغم خارج نہ کی جاسکے ۔

عام استعمال

یہ دوا دردِ دل، ذیابیطیس، ذاتِ الجنب، مرگی، دمر، غشی، دل کی حرکت رک جانا، چکی، ہسٹیریا اور نامردی وغیرہ میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

سر میں چکر اور درد
آنکھوں سے پانی بہے، آنکھیں اور پٹھیں ہوئی، کانوں میں گڑگڑاہٹ
ناک سے خون جاری ہو۔
دوسری حالت میں منہ خشک، چہرے کے عضلات میں تشنج،
پیٹ میں درد، اچھار، متلی، پیڑیوں پر بوجھ اور دباؤ۔
نامردی، ایستادگی کے بغیر اختتام، مستورات میں خواہش جماع
نہیادہ، حیض جلد اور بکثرت، حیض کے وقت درد اور غشی۔
سانس کی تکلیف، ہسٹیریا کے ساتھ تنگی تنفس، سینہ میں درد،
تشنج، دل کی دھڑکن، دل کے حوال میں لرزہ کی سی کیفیت، مریض کو
موت نظر آئے۔

مختلف اعضاء میں تشنج، کھنچاؤ اور درد
زیادتی :- ٹنڈک کے، ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا بہت سرد محسوس ہو۔
کھلی :- کھلی ہوا میں، نلنے سے۔
معاون :- ایمر اگریٹیا۔

مصلح :- کیمفر، کافیا۔

طاقت :- پہلے طاقت سے ۳ طاقت تک۔

MERCURIUS

مرکبوریس

خصوصی علامات

- ۱- ہڈیوں کی بیماریوں میں درد رات کے وقت بڑھے۔
- ۲- نزلہ جس میں زیادتی مرطوب موسم سے ہو۔
- ۳- منہ سے تھوک تانبے یا دھات کے سے ذائقے کا۔
- ۴- ڈفتھیر یا مقدار میں زیادہ اور متعفن تھوک کے ساتھ۔
- ۵- ڈفتھیر یا میں مسلسل خواہش نکلنے کی۔
- ۶- پیش میں پاخانہ چھپچھا اور خون آمیز۔
- ۷- لیکوریا درد، جلن اور تھارش جس میں ہمیشہ زیادتی رات کے وقت ہو۔

عام استعمال

ہڈیوں کے عوارض، نزلہ دہی تکالیف، دانتوں کا درد یا بوسیدہ ہونا، سانس، تھوک یا جسم بدبودار ہو، ڈفتھیر یا پیش، سیلان الجسم مسوڑھوں کے زخموں وغیرہ کی صورت میں مستعمل و مفید ہے۔

اگر چھوٹی طاقت میں دیا جائے تو درموں کو جلد پکا دیتا ہے۔
مگر تجلیل نہیں کرتا۔

عمومی علامات

مریض بات چیت بہت تیزی سے اور جلدی جلدی کر کے معمولی سی محنت سے بے حد کمزوری اور لرزہ ہو جائے۔

ہڈیوں کی بیماریاں، ٹھنڈے درم، وہ دنبل جو پکنے میں بہت مدت لیں۔

ہر تکلیف میں پسینہ کی زیادتی ہو، لیکن پسینہ سے بھی سکون نہ ملے۔

نزہ بہت چھینکوں کے ساتھ، سوزشی، چھیل دینے والا، زردی مائل سبز، متعفن، مواد کی سی رطوبت، ناک کی ہڈیاں متورم۔
دانت کا شدید درد جس میں کمی رخساروں کو سلنے سے ہو، دانتوں کا اوپر کا حصہ بوسیدہ اور جڑیں ٹھیک ہوں۔

زبان بڑی موٹی جس میں دانتوں کے نشان بن جائیں۔

طو قنخیر یا کی جھلی موٹی، سلیٹی رنگ کی، دہجی دار کنارے۔

پیشاب، اینٹن اور کمزوری کے ساتھ، پاخانہ کے بعد بھی سکون نہ ہو، زیادہ تر خون کا زیادہ اخراج۔

زیادتی: رات کے وقت، مرطوب موسم میں، موسم خزاں میں، گرم اور

ٹھنڈی مرطوب راتوں میں، داہنی جانب بیٹنے سے، پسینہ سے۔

کمی: آرام سے، جماع سے، رونے سے۔

معاون :- بڈیا گا۔

مصلح :- آر سینکم اہم، کاربوویج، کاسٹیکم، ہائیوسیمس، لائیو پوڈیم۔
طاقت :- ۳ سے ۲۰۰ تک اور اوپر۔

مرکیوریس بین آیئوڈائیڈ

MERCURIUS BINIODIDE

خصوصی علامات

۱- ڈفٹھیریا اور اس سے متعلقہ تکالیف۔

عام استعمال

ڈفٹھیریا میں خاق کی مخصوص ترین ادویہ میں شامل ہے۔

عمومی علامات

ڈفٹھیریا اور غدودوں کی تکالیف، خاص کر بائیں جانب کی بیماری میں مستعمل ہے۔

تالوسیا ہی نائل اور سرخ ہو، تھقل اور رقیق دونوں قسم کی اشیاء

تنگنا مریض کے لئے دشوار ہوتا ہے، خناق کی جھلی بہت ہلکی ہوتی ہے جسے آسانی سے اتارا جاسکتا ہے۔

وبائی سرخ بخار کے مریض جن کو تالو اور حلق کے غدودوں پر زخم ہوں، غدود بڑھے ہوئے، زخروہ سے یا حلق میں اوپر سے سخت، سینہ بلغم یا بلغم کے لوتھڑے۔ سانس کی تالی میں دق کا درم ہو۔

طاقت :- ۳۶ سے ۶۰ تک اور اونچی طاقتیں۔

مرکیوریس پروٹو آئیوڈائیڈ

MERCURIUS PROTO IODIDE

خصوصی علامات

۱۔ وفتیسیر یا اور اس سے متعلقہ عوارض۔

عام استعمال

۲۔ وفتیسیر یا یعنی خناق میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

عمومی علامات

۳۔ وفتیسیر یا یعنی خناق اور حلق کی بیماریاں جبکہ گردن کے غدودوں میں

بہت گرم ہو۔
 ڈھنچھیر یا کی جھلی کی ابتداء پہلے دائیں جانب ہو یا اس جھلی کی زیادتی
 دائیں جانب ہو۔

گرم چیزوں کے پینے سے یا حلق کو نکلنے والے انداز پر حرکت
 دینے سے تکلیف میں شدت ہوتی ہے۔

زبان موٹی، جڑ کی طرف زرد میل کی تہ ہو (کالی بائیکرام) سونے
 جیسے زرد رنگ کی تہ ہو (نیٹرم فاس) زبان کی جڑ میں میلی یا سبزی مائل
 سیلٹی میل کی تہ ہو (نیٹرم سلفا)

زبان کی نوک اور کنارے سرخ ہوں، حلق اور گردن کی داہنی جانب
 مرض کا زیادہ اثر ہو۔

آتشک جس میں دوسرے درجہ کی علامات ظاہر تہ ہوں کنج ران
 کے غدودوں میں گرم جس ہیں پکنے کا میلان نہ ہو۔
 طاقت :- ۳ تا ۳۰ اور اونچا طاقتیں ۔

MERCURIUS SOL.

مرکبہ لیس سال

خصوصی علامات

- ۱۔ ناک سے سوزش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہو۔
- ۲۔ نکسیر، رات کے وقت، نیند کے دوران، ناک سے سیاہ منجمد
 تار نکلیں۔

۳۔ سوزاک ، سبز مواد کا اخراج ، جورات کو زیادہ ہو۔

عام استعمال

آتشکی عوارض ، سوزاک ، پیچش ، نزلہ کا دوسرا درجہ اور پیمپوائے عوارض وغیرہ میں مستعمل و مفید ہے۔ علاوہ بریں جن عوارض میں مرتے والی کثرت بہنے کی علامت پائی جاتے ان میں بھی بچہ کا آمد ہے۔ مسڑھوں میں پھولنے کا میلان ہو تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

کان سے خون ملی بدبو دار رطوبت کا اخراج اور شدید درد ، کان کے بیرونی مخرج پر مٹہ کی شکل کا بدگوشت پیدا ہونا۔ سوزاک ، پیشاب کی نالی کے اگلے حصہ میں جلن ، حشفہ گرم ، متورم پھولا ہوا اور چھونے سے ذکی المحس ہو جو تندہست ہونے میں نہ آئے۔

بد کے نکلنے یا یک جانے کا اندیشہ آتشکی بد کا ابتدائی درجہ ، نہ خم گہرے ، گول جو عضو کے اگلے حصہ یا حشفہ کو کھاتے جاٹیں ، خون بہے اور درد ہو ، زردی مائل بدبو دار رطوبت خارج ہو۔

جلد پر شدید خارشس جس رات کو بستر کی گرمی سے زیادتی ہو۔ زیادتی رات کو ، مطلوب ٹھنڈی ہوا میں ، کپڑا اتارنے سے ، داہنی طرف لیٹنے سے ، پسینہ آنے سے ، بستر کی گرمی سے ، کسی بر کھل ہوا میں ، تیزی سے چلنے میں ، کام کرنے میں ، بستر

پر آرام کرنے میں ۔

معاون :- بیڈیاگا ۔

مخالف :- سلیشیا ۔

مصلح :- کیہفر، بلاڈونا، کاربوووج، سلفر، آرٹک، نکس و امیکا

سلیشیا، آئیوڈیم، لائیو پوڈیم، ٹاسفورس، ایکے سس ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور ادنیٰ طاقتیں ۔

مرکیورس سائی

MERCURIUS CYANIDE

خصوصی علامات

دقتھیر اور اس سے متعلقہ امراض ۔

عام استعمال

یہ دوا بھی دقتھیر یا خاق کی مخصوص دواؤں میں شامل ہے ۔

عمومی علامات

شدید قسم کا خناق یعنی ڈفختیریا، جس میں فوری اور حد سے زیادہ
مشابہت بھی ہو جائے، بے حد تیز نبض، مرض کی ابتداء ہی میں کمزوری
غضب کی ہو جائے اور کو لیپس (حالت کمال ضعف و مشابہت) کی
کیفیت ابتداء ہی میں پیدا ہو جائے۔ اول اول حلق میں سفید رطوبت
پیدا ہو۔ جو بعد میں مکیا ہی مائل ہو، تنفس بدبودار، ناک سے
جریان خون۔ بھوک ندر اور لعاب دہن پیدا ہو۔
طاقت :- ۶x سے ۳۰ ہر دو گھنٹہ بعد۔

MERCURIUS CORR.

مرکبہ لیس کار

خصوصی علامات

- ۱۔ اینٹیٹن اور مروڑ مبرنہ میں، پاخانہ آنے کے باوجود آرام نہ ہو۔
- ۲۔ پاخانہ مقدار میں کم، خون آمیز، چیچپا، بدبودار۔
- ۳۔ سوزاک و درملہ و رجبہ، سبزی مائل مواد کا اخراج۔
- ۴۔ نملادی ورم کان کے درمیانی حصہ کا۔
- ۵۔ کان کی نالی بند، بہراہن۔

عام استعمال

پیمپش کی خصوصی ادویہ میں سے ہے۔ علاوہ برسی آتشک، سوزاک، خنازیری، ردِ چشم، حمل کے دوران درجہ گروہ، سوزشِ باریطون، نرضیکہ جن امراض میں مرکوریس سال کا آمد ہے، انہی عوارض کی علامات نسبتاً زیادہ شدید ہوں تو مرکوریس سال کا آمد کی طالب ہونگی۔

عمومی علامات

آتشک عوارض، سوزشِ موادِ دلے نہ خم، گروہ کی بیماریاں۔
پیمپش اور موسمِ گرما میں لاحق ہونے والے آنتوں کے عوارض۔
پاخانہ مروڑ کے ساتھ گرم، آنتوں کی بلغمی جھلتیوں کے بہنے سے جمع ہوں اور ساتھ ہی شدید توجھی درد ہو۔

مثانہ میں تشنج اور پیشاب کی نالی میں شدید جلن کے ساتھ پیشاب آئے۔ گرم جلن دار، مقدار میں کم، قطرہ قطرہ، خون آمیز، البیوس، ملا آہکھو اور کانوں کی بلغمی جھلتیاں نزلادی عوارض کا نشکار ہوں۔
بچوں کے دست سبزی مائل، پینٹے ہوتے انڈے جیسے،
زیادتی :- رات کو، شام کو، تیزابی استیاری سے، کھلی ہوا میں،
بیرونی دباؤ سے، ننگنے سے، گہرا سانس لینے سے، حرکت سے،
کسی - دہرا ہونے سے، اٹھنے سے، گرم پسینہ سے۔
مصلح :- سلیٹیا، میرپلسف، نائٹریک ایسڈ۔
طافنت :- آلابت انضمام کے مزمن نزلہ اور پیمپش میں ۲x یا ۳x

مستعمل و مفید ہے ۔

دیگر عوارض میں ۶ طاقت سے ۳۰ تک ۔

MILLEFOLIUM

ملی فولیم

خصوصی علامات

- ۱۔ چوٹ آنے کے بعد زخم سے بکثرت سیلانِ خون ۔
- ۲۔ سیلانِ خون جسم کے کسی مخرج سے، درد کے بغیر ۔
- ۳۔ حیض بکثرت ہو اور زیارہ دنوں جاری ہے ۔

عام استعمال

عام طور پر سیلانِ خون کو روکنے کے لئے مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

- ادوارِ خون ناک سے ، منہ سے ، پانخانہ سے ، بواسیر سے ، آنتوں سے ،
حیض بہت جلدی ، بکثرت اور بہت دیر تک ہے ۔
پیشاب کے راستے سے خون جاری ہو ۔
سسل میں منہ سے خون جاری ہو ، کھانسی میں خون آئے ۔

تکسیر زور سے ہے ۔
 بواسیر کا خون رک جانے پر منہ سے خون آنے لگے ۔
 زیادتی :- شام کے وقت ، رات کے وقت ۔
 مخالف :- کانیا ۔
 مصلح :- آرم میکو لیٹم ۔
 طاقت :- مرد تنکیر سے ۲۰۰ طاقت تک ۔

MEDORRHINUM

میڈورینم

خصوصی علامات

- ۱۔ بھید اعصابیت اور شدید تھکن اور تقاہت کے باعث تمام جسم پر لرزہ ۔
- ۲۔ ضعف اور ناتوانی کی کیفیت ۔
- ۳۔ بات بات پر رو دینے کا میلان ۔
- ۴۔ مختلف اشیاء خورد و نوش کی بیجا نہ لکنے والی خواہش ۔
- ۵۔ ہانگوں اور پاؤں میں شدید بے چینی اور رعشہ (زنگم) ۔
- ۶۔ ہاتھوں اور پاؤں میں جلن (یکے کس ، سلفر) ۔
- ۷۔ بڑی بڑی پھولی ہوئی گانٹھوں سے انگلیاں بد وضع ہو جائیں ۔

عام استعمال

مزمن سوزاک یا جبے ہوتے سوزاک کے باعث لائق ہونے والے عوارض کے لئے مخصوص ندرین دوا ہے۔

عمومی علامات

سوزاک مادہ کے باعث جوڑوں کی مزمن سوزش، وجع المفاصل، نقرس اور امراض شمعاع۔ نیز سوزاک نہر سے خواتین کے پیرو میں پانے عوارض۔

تقریباً تمام نامزدہ میں دکھن ہو۔

رکٹ کے شکار پستہ قامت بچے جن کے جسم و دماغ کی نشوونما صحیح طور پر نہ ہو سکی ہو۔

حافظہ کمزور، وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو۔

سجھار میں متواتر بچھے کی ہوا کی خواہشیں، چہرے اور گردن سے حرارت کی لہریں اٹھیں، رات کو پسینے آئیں، ذوق کا بھار۔

زیادتی :- اپنے مرض کا خیال آنے پر، صبح سے شام تک خشکی پر، آندھی اور طوفان سے، خفیف حرکت سے۔

کسی :- ساحل سمندر پر، معدہ کے بل بیٹھنے سے، مرطوب آب و ہوا میں۔

معاون :- سلفر

مصالح :- اسپیکاک

طاقت :- صرف اونچی طاقتیں مستعمل ہیں لیکن جلد صلب اور باد بار

نہ دہرائی جائیں۔

MEZEREUM

میزریوم

خصوصی علامات

۱۔ چیچک کے ٹیکے کے اثرات مابعد کے طور پر اکوتہ اور خارش والے
ابھار۔

۲۔ سر پر موٹے جھڑے کا سا کھڑنڈ جس کے نیچے گاڑھا مواد جمع ہو۔

عام استعمال

یہ دوا آتشگی و ختازیری علامات میں کام آتی ہے خصوصاً جبکہ پردہ
استخوان اور جلد جسم متبکائے مرض ہوں۔

عمومی علامات

مریض مراق اور مایوسی کا شکار، لاپرواہ، بات بات پر غصہ اور
پھریشیانی۔

آتشک میں پائے کے بیجا استعمال سے پردہ استخوان کی سوزش
یا جوڑوں کے درد، مڈلیوں پر گھٹیاں۔

بوسیدہ دانتوں میں درد، بات کو درد زیادہ ہو۔

زخموں کے اور پسفید موٹے پیڑیاں جن کے نیچے زرد سپ پھج ہو۔
 بچہ کے چہرے پر تر چنسیاں جن میں رات کو شدید کھلی ہو،
 چہرہ سرخ اور سوجا ہوا۔

زیادتی :- سرد ہوا میں، رات کو، شام سے لے کر نیم شب تک
 گرم تھا سے، چھوٹے سے، حرکت کرنے سے۔
 کبھی، کھلی ہوا میں۔

مصلح :- ایجوٹائیٹ، کلکیریا، بلائیونیا، کیفیر، کال آئیوڈائیڈ،
 مرکوریس، نکس و امیکا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ تک اور اوپر۔

MELILOTUS

میلی لولس

تخصوصی علامات

- ۱۔ اجتماع خون جس کو سیلان خون سے سکون ہو۔
- ۲۔ شدید درمی یا اعصابی درد سر جسے نکسیر بہت سے سکون ہو۔
- ۳۔ نکسیر سے قبل چہرہ پر شدید ترین سرخی، تمامہٹ اور کن پٹیوں
 میں تپکن۔
- ۴۔ کسی عضو سے سیلان خون سے قبل چہرہ پر شدید سرخی۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے اجتماع خون میں نافع ہے۔ جسے خون کے جاری ہو جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

عمومی علامات

کسی حصہ یا کسی عضو کی خون کی نالیوں میں اجتماع خون، بھراؤ یا ورم، تشنجی دور سے دانت نکلنے کے زمانہ میں، اعصابی بچوں میں، چھٹے بچوں میں اینڈسٹن اور مرگی کے دورے۔
قبض، مقعد میں سکرٹن، درد اور پاخانہ دقت سے ہو، تپکن، بھراؤ۔ حاجت ندارد تا آنکہ پاخانہ کافی مقدار میں اندر اکٹھا نہ ہو جائے۔
زیادتی، برسات و تبدیلی موسم میں طوفان کی آمد پر، حرکت سے، چار بجے شام کو۔
طاقت :- ۱۰ ایک سے ۲۰ قطرے تک۔

MUREX

میوہ کس

خصوصی علامات

۱۔ آلات تناسل کو ذرا سا چھو دینے سے شدید شہوانی تحریک۔

۲۔ رحم میں چھوٹے کا سارو۔

عام استعمال

عام طور پر مستورات کے عوارض گردن رحم کی خرابیاں، اسقاطِ حمل، حیض درد کے ساتھ ہونا، حیض کثرت سے ہونا، سیلانِ الرحم، ذریا ببطیس، مستورات میں خواہش جماع نہایت زیادہ، دورانِ حمل کی تکالیف اور خروجِ رحم وغیرہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

مریضہ زود سوج اور نغمکین ہو۔

شام کے وقت پیٹ خالی معلوم ہو (سیدیا)

سن یا اس کے زمانہ کی تکالیف (لیکے سس، سیدیا، سفیر)

رحم میں زخم جیسی دکھن، دھڑکن، شانہ اور کہنی میں درد، تفکاک

ٹانگوں میں کمزوری، جلد میں خشکی، حیض بے قاعدہ، سیلانِ رحم نسلوانی

اعضا، لٹکے پڑتے ہیں جیسے بانہ زکلی پڑیں گے۔

زیادتی :- نحیف چھونے سے۔

طاقت :- نچیل طاقت میں مستعمل ہے۔

خصوصی علامات

- ۱۔ ذہنی خرابی، خودکشی پر مائل ہے۔
- ۲۔ دل کی تکالیف جن کے ساتھ خشک کھانسی ہو۔
- ۳۔ بائیں خستہ الرحم میں عصبی درد کے ساتھ دھڑکن تیز ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر دل کے عوارض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

دل کا بڑھ جانا، خشک خراش دار کھانسی کے ساتھ، دل کی اندرونی جھلی میں سوجن ہو اور ساتھ ہی وجع المفاصل کی تکلیفات۔
دل میں شدید چھین کی دردی، دھڑکن بہت تیز، دم گھٹتا ہو اور بولنا دشوار ہو۔

درجہ سرنو تہی، بعض اوقات اس کے ساتھ دیرپہ میں بھی درد،
دل کی دھڑکن تیز، چہرہ نیلیوں، تھے۔

زیادتی :- غشیات کا استعمال سے ۔
 کٹھی :- کھلی ہوا میں ، سیر کرنے یا سواری کرنے سے ۔
 مصلح :- اسونیا ، ٹوہکیم ۔
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ۔

NUX MOSCHATA

نکس موسکاٹا

خصوصی علامات

- ۱۔ جسم پر خشکی ، پسینہ ناز و نادر آئے ۔
- ۲۔ تمام تکالیف میں غنودگی اور نیند کا غلبہ یا غشی کا میلان ۔
- ۳۔ تکالیف غنودگی یا نیند کا غلبہ پیدا کر دیں ۔
- ۴۔ منہ میں بچہ خشکی ، زبان اس قدر خشک کہ تاؤ سے چپک جائے ۔

عام استعمال

یہ دوا ان عوارض میں کامیاب ہوتی ہے جن کے ساتھ غنودگی ، نیند یا غشی کا میلان پایا جائے اور مختلف اعضاء میں بچہ خشکی ہو ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کمزور ، خیالات منتشر ، گھڑی میں خوشی اور

گھڑی میں غم زدہ ، مزاج یکایک تبدیل ہوتا ہے۔
 ہر غذا کے بعد پیٹ تن جائے ، آنتوں میں جلن اور خراش ، منہ
 اور گلا خشک ، ہر چیز ریاح بن جائے۔

حمض قبل از وقت اور بجزرت ، خون گاڑھا اور سیاہ ، نیند
 کے بعد گلا خشک اور کمر میں درد ہو ، حمض کی جگہ سفید سیلان۔

خشک مسٹیریکل کھانسی جب یکایک گلا بیٹھ جائے۔

آنکھیں ، منہ ، گلا ، زبان بچہ خشک۔

اسہال ، موسم گرما میں یا موسم خزاں کے وبائی دست یا بچوں
 میں دانٹ نکلنے کے زمانہ میں یا خواتین کو چھل کے دوران دست۔
 گاڑی میں سواری سے کمر درد ، جس پہلو لیٹے اس پہلو میں درد ہو
 جسم پر بستری زخم ہوں۔

سنگار لرنہ کے سانچہ اور پیاس کے بغیر ، پسینہ نہ آتے۔

زیادتی :- ٹھنڈی تر ہوا سے ، سردی کھانے سے ، سرد پانی سے
 دھونے سے ، درد والی کرٹ لیٹنے سے ، حرکت سے۔

کبھی :- گرمی سے ، خشک موسم سے۔

مصلح :- کمیوند ، جلسی میم ، نکس و امیکا ، اوپیم ، ولیریانہ ،
 زنگم۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک نیز ۲۰۰ طاقت

NUX VOMICA

نکس و امیرکا

تخصوصی علامات

- ۱- مریض جھگڑالو، کینہ ور اور بدخواہ ہو یا دہلا پتلا، غصہ ور اور اعصابی طبیعت والا ہو۔
- ۲- بچہ ذکی الحس بیرونی اثرات، شور، خوشبو یا ت، روشنی یا رگ زنگ سے (نکس موسکاٹا)
- ۳- معمولی تکلیفات بھی ناقابل برداشت ہوں (کمیوٹلا)
- ۴- جو مریض پہلے ایو پینیک اوویہ استعمال کر چکے ہوں، ان کا علاج شروع کرنے کے لئے یہ ایک کارآمد دوا ہے، بشرطیکہ ہلش بھی ہو۔
- ۵- تشنہ دوسے ہوش و حواس کے ساتھ جذباتیت سے چھپنے سے یا حرکت سے۔
- ۶- دروزہ شدید دورہ والے جو پانازہ پیشاب کی حاجت پیدا کریں۔

عام استعمال

یہ سب سے بڑی روزمرہ کی دوا ہے کیونکہ اس کی بہت

سی علامات بیشتر تمام امراض میں پائی جاتی ہیں۔

عمومی علامات

سر میں چکر کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد، درد سر اور اس کے ساتھ متلی خاص کر کھانے کی خرابی کے باعث۔ صبح کو آنکھوں کے پوٹے چپک جاتیں، صبح سے دوپہر تک روشنی برداشت نہ ہو اور سہ پہر کو مریض مزے سے دیکھے۔

صبح کے وقت کانوں میں گڑ گڑاہٹ اور درد۔

زکام ناک سے دن میں بہتا رہے اور رات کو خشک ہو جائے۔

دانتوں، مسوڑھوں اور چہرہ کی ہڈیوں میں درد۔

کھانسی جو ٹھنڈی ہو اسے یا منت مشقت سے زیادہ ہو۔

! منہ کا ذائقہ کڑوا، صبح کو کڑے کھٹے ڈکاء، بھوک ہو مگر کھانے کو جی نہ چاہے، کھانے کے بعد متلی، حاملہ کی متلی، معدہ میں دباکے سے درد، پیٹ میں جلن، حوال جگر میں کوچن۔

دائمی قبض، اجابت ناممکن ہو، پھپھس، ناف کے نیچے درد، مقعد بوجھل، پانخانہ میں خون اور آڑوں ہو، بوا سیر بادی یا خون۔ پیشاب کم یا جلتا ہوا، درد کے ساتھ، درد گردہ جو اعضا تناسل اور ٹانگ تک ہو۔

قرط میں درد واپنی جانب، حیض بے تاعدہ، کبھی جلدی، کبھی

دیر سے کبھی بہت کم کبھی بکثرت ، سفید سیلان و دم درد کے ساتھ ، اور اٹھنے یا دباؤ ڈالنے سے خروجِ رحم ۔

خشک کھانسی آدھی رات کے بعد

ماقہ پروں کی یکایک ناخاتمی صبح کے وقت ، یا سُن ہو جائیں ، چلنے میں ٹھننے آواز دیں ۔

سجھان لزرہ کے ساتھ ، سبھار کے دوران نم معدہ پر کچھ حصہ چھونے سے سرد معلوم ہو ۔

زیادتی :- صبح کے وقت ، دماغی محنت سے ، کھانے سے ،

یا زیادہ کھانے کے بعد ، مصالحہ دار ، منشی اشیار ، چھوٹے شور و غصہ سے ، خشک موسم سے ۔

کبھی :- شام کو ، آرام سے ، لیٹنے سے ، نم اور تر موسم سے

معاون :- کلکیریا ، کالی کارب ، سیپیا ، سلفر ۔

مخالفت :- ایٹک الیڈ ، اگنیشیا ، زنکم ، سٹیم ۔

مصلح :- ایجو ناسٹ ، کیبفر ، کیموٹلا ، کافیا ، اگنیشیا ،

پلسا ٹیلا ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ تک اور اوپر

نازک مزاج افراد کو یہ دوا صبح کو نہار منہ نہ دینا چاہیے ۔

اور نہ ہی کھانا کھانے یا دماغی محنت کے فوراً بعد دینا چاہیے ۔

اس کے استعمال کے بعد بھی کچھ کھانا پینا یا دماغی کام دو

گھنٹہ کے وقفہ سے ہونا چاہیے ۔ اس کے استعمال کا بہترین

وقت سونے سے کچھ پہلے یا چار گھنٹہ قبل ہے ۔

NATRUM SULPH.

نیٹرم سلف

خصوصی علامات

- ۱۔ تکالیف جو موسم کی یا ماحول کی مرطوبیت سے پیدا ہوں یا بڑھیں ۔
- ۲۔ مریضہ پست حوصلہ ہو، خوش کن گانے سے بھی غم زدہ ہو جائے ۔
- ۳۔ دماغی چوٹیں ۔
- ۴۔ پوٹوں پر چھوٹے چھوٹے آبلوں کی طرح دانے ۔
- ۵۔ دست ، پہلی بارہ اٹھنے پر یا پاؤں پر کھڑا ہونے پر ۔
- ۶۔ سوزاک ، سبزی مائل زرد و ابے درد ۔
- ۷۔ سچوں میں ترمردہ جو ہر مرطوب موسم کی تبدیلی کے ساتھ آتے ۔
- ۸۔ سائیکوٹک نمونیہ ، بائیں بھینچے سے کانسچلا حصہ متاثر ہو ۔
- ۹۔ ورم دماغ کے باعث دماغ کی جڑ میں شدید کھینے اور نوخیزے والے درد ۔

عام استعمال

مرطوب آب و ہوا یا مرطوب مکان و نم دار جگہ میں رہنے سے یا صفراوی اثرات سے جو عوارض لاحق ہوں ان کے لئے خصوصی طور پر مستعمل و مفید ہے، مریض کو موسم برسات برا لگتا ہے۔

عمومی علامات

اسہال جو علی الصبح زیادہ ہوں، پیٹ میں گرگڑا ہٹ ہواور ریاہ بولتے ہوں، قہوڑا چلنے پھرنے سے اسہال زیادہ ہوں، دست آنے کے ساتھ، دیرج کے باعث پھٹ پھٹ کی آواز پیدا ہو۔ اسہال یا دمہ کی تکالیف موسم برسات میں زیادہ ہوں۔ مزمن دمہ میں تر کھانسی ہو، سینہ کے بائیں جانب دکھن ہو جس کے باعث مریض کو اٹھ کر بیٹھا پڑے۔

زیادتی :- بائیں طرف لیٹنے سے، نمی سے، نم دار موسم سے۔

کٹھی :- خشک موسم سے، دبانے سے، پہلو بدلتے سے۔

معاون :- آرسینیکم البم، مخوجا، بیلاڈونا، فیوم ٹیلیکم، فاسفورس

نیزوم میور۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

NATRUM MUR.

نیرم میور^ط

خصوصی علامات

- ۱- کئی خون اور بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے۔
- ۲- بے حد لاغری، باوجود اچھی غذا کھانے پینے کے۔
- ۳- درد سر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔
- ۴- درد سر جو آنکھوں میں دھندلا پن کے ساتھ شروع ہو۔
- ۵- زبان پر نقشہ سایا سُرُخ بکھرے ہوئے چھٹے۔
- ۶- اثرات نمک کے زیادہ استعمال کے۔
- ۷- بخار کے ایسے موتیوں کی طرح۔

عام استعمال

خون کی کمی، نو تہی بخار، شدید قبض، مزمن درد سر، منہ ہونٹوں یا زبان کی خشکی یا سن ہو جانا، اچھی سے اچھی غذا جسم کو طاقت نہ پہنچائے، ہاضمہ اور پیٹ کی تھرا بیاں یہ کیفیات ہوں تو مستعمل و مفید ہے۔ مائیکو لیا، وہم، مایوسی

استسقا، سیلان الرحم وغیرہ میں بھی حسب علامات نافع ہے۔

عمومی علامات

طبیعت گری رہنا ، بد مزاجی ، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو ، سر چکرائے ، ذہن میں الجھاؤ ، سر کے بال گریں ۔
 پیوٹوں میں بے حد سرخی اور دکھن ، آنکھوں سے پانی گرسے ۔
 کانوں میں درد اور کوچن ، بھنبھناہٹ ، کھنکھناہٹ ، کان سے لے کر گردن اور کندھے تک درد ۔
 ناک کی ہڈی میں درد ، ناک پر دانے ۔

ہونٹ سوچھے ہوئے ، آبلے پڑے ہوئے ، ہونٹ چٹخے ہوئے ، زبان بھاری اور آبلہ دار ، جلندار ، نصف زبان کسن اور جگڑی ہوئی ۔ مسوڑھوں سے خون آئے ۔
 دانت میں درد جو ہوا لگنے سے بڑھے ۔
 ہاضمہ خراب ، خم معدہ میں دکھن ۔

پاخاز سخت قبض کے ساتھ یا پھر تیلے دست پانی جیسے ۔
 مردوں میں خواہش جماع زیادہ مستورات میں حیض کی خرابیاں اور سیلان الرحم ۔

خشک نزلہ ، صبح کو بلغم گرسے ۔
 پیٹھ ، ہاتھ ، پیر یا کرہوں میں کمزوری سوجن جکڑن یا درد ۔ عرصہ تک رہنے والے سخت لرزہ کے ساتھ بخار ۔
 زیادتی ۔ دس یا گیارہ بجے صبح گرمی سے ، سمندری ہوا

سے ، بات چیت یا مشقت سے -

کمی ، کھلی ہوا میں ، ٹھنڈے پانی سے دھونے سے
بیٹھے سے ، فاقہ کرنے سے -

معاون :- ایپس ، کیپسی کم ، سپیا ، اگنیشیا -

مصلح :- آر سینکم الہم ، کیمفر -

طاقت :- ۳ سے ۳۰ ، ۲۰۰ اور اوپر -

GNAPHALIUM

نیفالیم

خصوصی علامات

۱- عرق النسا (سنگڑی کا درد) جس متاثرہ حصہ جسم میں سن ہونے
کا میلان ہو -

۲- پیڑ بھرا بھرا اور بوجھل محسوس ہو - حیض وقت سے آئے -

۳- کولہے سے لے کر ٹخنے تک کے عصب میں شدید درد
یکے بعد دیگرے سن ہونے اور درد کا میلان -

عام استعمال

یہ دوا خصوصی طور پر عرق النسا اور وجع المفاصل میں مستعمل ہے -

عمومی علامات

عرق انساں جبکہ عضو ماؤف میں درد کے ساتھ سن ہو جانا بھی ہو۔
وجع المفاصل اور صبح کے اسہال۔

دونوں طرف رنخساروں کی ہڈی میں یہ درد کہہ درد ہو۔

پھیٹ کے مختلف حصوں میں تو لہجی درد، بچوں میں ہرپسہ کی
قسم کے دست اور تپ، مثانہ کی غدود میں اشتعال۔

مستورات کے پیڑ میں ایسا معلوم ہو کہ مہرا ہوا ہے اور
بوجھ ہو، حیض درد اور کمی کے ساتھ۔

کمر میں مزمن درد، پیٹھ کی طرف سہارا لگانے سے درد کم
ہو۔ کمر میں درد اور سن ہو جانا، پیڑ کے نیچے حصہ پر بوجھ بہتر
میں لیٹنے پر نیند لیوں، ٹانگوں اور پیر میں تشنجی درد ہو، شمنوں کے
جوڑ اور ٹانگوں میں وجع مفاصل۔ پنڈلی اور پیر میں بار بار درد
ہوں، پاؤں کے پنجے میں گٹھیاوی درد، ٹانگیں پیٹ کی طرف سکیڑ
لینے سے افاتہ محسوس ہو۔ گٹھیا کے باعث ہڈی کا بڑھ جانا، ران کے
اندرونی جانب عصبی درد، جوڑوں میں درد جیسے ان میں روغنیت کا
نقدان ہو، کمر اور گردن کے پٹوں میں مزمن مفاصلی درد۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک متعمل ہے۔

VERBASCUM

وردسکم

تخصیصی علامات

- ۱۔ نزلہ وزکام جس کے ساتھ نوبتی دردِ اعصاب ہو۔
- ۲۔ چہرے کے عصبی درد جیسے متاثرہ حصے کچلے جاسکتے ہوں۔
- ۳۔ آواز کا بیٹھ جانا۔
- ۴۔ پیشاب کا غیر ارادی طوبہ پر اخراج۔
- ۵۔ مانتھوں کے جوڑوں میں سختی اور دکھن۔

عام استعمال

یہ دوا کانوں، نظام تنفس اور مثانہ سے تعلق رکھنے والے اعصاب کے عوارض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

چہرے کی ہڈیوں میں اعصابی درد، ایسا معلوم ہو کہ کسی نے ہڈیوں کو کھیل دیا، بولنے، جھکنے اور حرارت کی تبدیلی سے درد زیادہ ہو۔ کان میں درد، بہرا پن، بواسیریں، آواز بیٹھی ہوئی، رات کو کھانسی آئے، دمہ، پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکا کرے۔

درد سر، خشک کھانسی، آواز بیٹھ جانے میں مفید ہوتی ہے۔
 معنوں کے اوپر درد، لڑکوں کا مزمن نزلہ اور کھانسی، دمہ میں
 بھی مفید ہوتی ہے۔ اسے مولین آئیل کی شکل میں بہرے پن کے
 لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ میں مویج کا درد، کھڑے ہونے میں دابنہ
 پیر کے تلوے میں تشنجی بوجھ جو کہ چلنے سے غائب ہو جائے۔
 کھانا کھانے کے بعد پیشاب بہت آئے، سچے بستر پہ پیشاب
 کہہ دیا کریں۔

دابنہ پیر میں، ٹنخنے اور تلوے میں دکھن، فناگیں بھاری،
 انگوٹھے سس ہوں۔

زیادتی :- موسمی ٹمپریچر (درجہ حرارت) کی تبدیل سے، گفتگو سے،
 چھینکنے سے، دانت بھینچنے سے، ۹ بجے صبح سے ۴ بجے شام
 تک۔

طاقت :- مد ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ امراض جن میں قوت حیات اور دوسرے جسمانی قوی جلد جلد کم ہوتے جا رہے ہوں، ممکن نقاہت مردنی کی سی۔
- ۲۔ قریباً تمام تر کالیف کے ساتھ پیشانی پر ٹنڈا پسینہ۔
- ۳۔ چاند پر برف کے ڈھیلے کا احساس ٹنڈک کے ساتھ (سیا)
- ۴۔ چہرہ پیلا، نیلا، آنکھیں اور چہرہ کھنچ جاتے اور مردہ کی سی شکل بن جاتے۔
- ۵۔ تہش اور فرحت بخش اشیا کی خواہش۔
- ۶۔ جسم کے کسی حصہ کی برف کی سی ٹنڈک۔
- ۷۔ شدیدتے زیادہ مقدار میں دستوں کے ساتھ۔
- ۸۔ رمی یا فاسد ملیریا بخاروں میں بچید مردی اور پیاس کے ساتھ چہرہ ٹنڈا اور سردوں جیسا۔

عام استعمال

ہیضہ کا پہلا اور دوسرا درجہ، نمونہ، دمہ، بزرگائی ٹس، تپ محرقہ، ملیریا وغیرہ میں ہونے والی مردنی کی سی نقاہت اور

ٹھنڈے پینے نیز جنوں، پر سوتی، دیوانگی وغیرہ متعدد عوارض میں حسب
علامات مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر دیوانگی کی کیفیت، ہر چیز کو کاٹنا چاہیے، مراقبہ -
در در سرتل اور تھے کے ساتھ، دماغ کے اندر جلن لیکن سر پر
سرور پسینہ، چاند پر سردی، سر کا بھاری پن، دبانے سے افاقہ ہو۔
آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، پوٹے مفلوج، دوسری نگاہ، تونڈھی
آنکھوں کے سامنے سیاہ نکتے اور چنگاریاں گھومیں۔

چہرہ سرد، اترا ہوا، نیلیوں، بد شکل، پیشانی پر سرد پسینہ۔
زبان سرخ، سوچی ہوئی یا سیاہ چٹخی ہوئی، حلق میں رکاوٹ یکایک
نیز جلن اور کھر کھرا پن۔

ٹھنڈے مشروب نیز ترش اور مفرح اشیاء مثلاً پھل وغیرہ
کی خواہش۔

متواتر متل اور تھے، جس کے ساتھ پتلے دست نہایت کمزور
کرنے والے، معدہ میں جلن۔

تبض مقلد کے فعل نہ کرنے سے، سچوں میں پتلے دست یا

سبز سیاہی مائل پانازہ جس کے ساتھ چہرہ زرد ہو اور ٹھنڈے پینے
آئیں۔

پیشاب سبزی مائل یا سرخی مائل قصوراً قصوراً۔

حیض کے وقت درد، تھکے اور دست مع سرد پینے کے۔
 ذقتہ کھانسی دم گھٹنے والی
 بنجارہ لرزہ کے ساتھ جو دیر تک ہے۔ اندرونی جلن اور باہر
 چہرہ، ماتہ، پیر سرد اور ساتھ ہی ٹنڈا لیس وار پینے۔
 مرض خواہ کچھ بھی ہو اگر ساتھ سردی کمزوری اور سرد لیس وار پینے
 موجود ہو تو در میٹرم البوم کا خیال کرنا چاہیے۔
 زیادتی، حرکت سے، پینے سے، حیض کے قبل اور دوران میں،
 پانچانہ کے وقت، پینے کے وقت، ٹور سے۔

معاون :- آر نیکا

مصلح :- ایکونائیٹ، آرسینکم، کیمفر، چائنا، سٹانی سیکریا،
کافیا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک۔

VERATRUM VIRIDE

در میٹرم ویراٹریڈ

خصوصی علامات

- ۱۔ درم اور اجستماع خون دماغ کی جڑ میں، سینہ میں، ریڈیٹھ اور معدہ میں۔
- ۲۔ درمی سکتہ میں نبض مدہم، بھری ہوئی لوہے کی طرح سخت۔

- ۳۔ ورم دماغ کے ساتھ تشنجی دورے ۔
- ۴۔ ریڑھ اور دماغ کے ورم کے ساتھ ٹھنڈا چھپچھپا پسینہ ۔
- ۵۔ زبان سفید یا زرد اور بیچ میں سرخ لکیر ۔
- ۶۔ نبض بے قاعدہ ، مدہم ، نرم ، کمزور ۔

عام استعمال

حاد امراض جیکے شریانوں میں خون کا جوش ہو یا اجتماع خون ہو، نبض تیز اور بھری ہوئی، اکثر پسینہ، ابکائیاں اور تپ بھی ہوتویہ دوا کارآمد اور مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

دماغ میں اجتماع خون، سر ٹھپٹا ہوا محسوس ہو، خواہ یہ اجتماع خون کثرت خون کے باعث یا ٹو گنے اور ورم دماغ کے سبب ۔
 مہرسم کا ابتدائی درجہ، ابکائیاں تپے ۔
 نمونہ جس کے ساتھ معدہ کی اکسا ہٹ شامل ہو، پسینہ بکثرت ۔
 ٹویہ میں بھی اس دوا کا نمایاں اثر ہوتا ہے ۔
 شدید بانگائی شش اور ورم، سنجار تیز، ابکائی تپے ۔
 پر سوت میں پردہ صفاق کی یا خصیۃ الرحم کی سوزش، ورم رحم تشنجی چہرہ نیلا، ہڈیاں، متلی ۔
 ذات الخب، سوزش جگر، ورم گردہ، سوزش شانہ کا ابتدائی

درجہ -
 بخار، صبح کو عوارث کم شام کو تیز، گھٹنا بڑھا بارگاہی -
 زیادتی حرکت سے، صبح جاگنے پر، شام کے وقت -
 کسی - نلنے سے، دہانے سے -
 طاقت - ۳ طاقت سے، ۲ طاقت تک

VARIOLINUM

ویرولینیم

خصوصی علامات

۱۔ چیچک کا حملہ یا اندیشہ

عام استعمال

چیچک کے علاج کے لئے یا چیچک سے بچاؤ کے لئے استعمال ہے۔

عمومی علامات

چیچک کا حملہ ہو چکا ہو یا اس کا احتمال ہو۔

گدی میں درد، چوڑھے سوجھے ہوئے، پہلے پن، ضرمن نزلہ، بدن پر

آئے۔

سانس لینے میں تکلیف، حلق بند محسوس ہو، اگر میں سخت درد
 رے چینی، درد کمر سے ہٹ کر پیڑوں میں چلا جائے۔
 کلائی میں بائی کا درد، ٹانگوں میں درد، قلعن، تیز سجاد، مواد پیر
 نے، بدبودار سینہ۔

مصلح :- اینٹی بیٹریک، سیلینڈرینیم، فلو جی، وکسینیم
 طاقت :- ۳۰ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

HYPERICUM

ہائپرکیم

خصوصی علامات

- ۱۔ زخمی ہو جانے پر جھوگا کا اندیشہ۔
- ۲۔ بہت زیادہ حساس اعصاب کے مقام پر چوٹ یا زخم۔

عام استعمال

اعصابی ضرب یا زخم وغیرہ کے درد کے لئے مستعمل ہے۔

عمومی علامات

چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اعصاب کو سخت نقصان پہنچ جائے۔

ریٹھ اور دماغ میں ضرب آنے کے اثرات مابعد۔
کسی کیل، کانٹے یا نوکیلی چیز سے انگلیوں وغیرہ پر نغم ہو۔

ورم عصب کے ساتھ صلب اور درد

کسی ضرب کے باعث درد سر یا ورم دماغ۔

جلد پر پسینہ بکثرت، ضربات کے باعث بالچوڑ۔

زیب ادقی :- بند کمرے میں، کپڑے پٹنے سے۔

کسہی :- سر پیچھے کی طرف جھکانے سے۔

مصلح :- آر سینیکم البہم، کھیڑلا۔

خودراک :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک۔

HYDRASTIS

ہائڈرا سٹس

خصوصی علامات

- ۱۔ تاردار رطوبتوں کے اخراج۔
- ۲۔ معدہ میں کمزوری کا احساس۔
- ۳۔ ہاضمہ اور جگر کی فراہمیوں، کمزوری اور لاغزی۔

عام استعمال

ہاضمہ کی خرابیوں، نزلادی کیفیت، لیکوریا اور کنفسر میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

نحتوں سے زرد رنگ گاڑھی رطوبت کا بجزرت اخراج جس میں
تار موجود ہوں۔

نزلاوی رطوبت داغ سے حلق میں گرتی محسوس ہو، حلق یا تالو
سے کھسکھانے پر زرد رنگ کا تار دار بلغم خارج ہو، آتشکی حلق یا
پارہ اور کلوریٹ آف پوٹاشس وغیرہ کے استعمال کے اثرات بدر
شراب کے بجزرت استعمال سے صحت تباہ ہونے پر ماضیہ اور
جگر کی خرابیاں۔

لیکوریہ یعنی سیلان الرحم، تار دار، گاٹھا، لیس دار، زرد جو شرمگاہ
کے مزے سے لہے لہے تاروں کی طرح نکل جاتے (کال باسیکرام) شرمگاہ
میں کھلیں۔

کینسر سخت، جلد میں چپکی ہوتی گانٹھ، جلد پر داغ اور
دھبے، جلد سکڑی ہوئی، درد چاقو کے سے تیز کاٹنے والے۔
مستورات میں سر پستان اندر دھنسنے ہوئے، دودھ پلانے والی
عورتوں کا منہ آجاتے، زبان بڑی جس پر دانتوں کے نشان ہوں۔

زیادتی :- رات کو گرمی سے، نہانے سے، خشک تیز ہوا سے،
کسی اور دبانے سے

مصلح :- سلفر

طاقت :- ۲۰ طاقت تک۔

HYDROCOTYLE

ہائڈروکوٹائل

خصوصی علامات

۱۔ خضام کے اثرات۔

۲۔ مختلف جلدی عارض

عام استعمال

متعدد جلدی تکالیف میں عام طور پر مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض معنوم رہے، سر میں بیماری پن، تسکن اور طبیعت
لاگت رہنا۔

غذا سے نفرت، پیٹ میں برباج (نفخ)، جگر کی خرابی۔
مستورات کو اندام نہانی کے اندر گرم معلوم ہوا اور اوپر کھینچی اور
کوچن ہو۔

جلد پر زہر بار کی سی سوجھی، سرخ چمکتے، جلد موٹی ہو گئی ہو، جلد
پر سفید ٹھکے ہوں، سینہ پر دانے نکلیں، تنوں میں ناقابل برداشت
کھین، آتش کی مادہ ہو، کوڑھ یا نیل پا کا مارہ۔

یہ دوائیں پا، کورڈہ، اکوتہ، جلد کاموٹا ہو جانا وغیرہ میں بہت کامیابی سے استعمال کی گئی ہے۔

طاقت، - در شکر اور ۶ طاقت - نیز ۲۰۰ طاقت بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

HYOSCYAMUS

ہائوسیا مس

تخصیصی علامات

- ۱۔ امراض جن میں دماغی چستی بڑھ جائے، لیکن کس قسم کی درمی کیفیت موجود نہ ہو۔
- ۲۔ جسم کے ہر عضلہ میں دانکھول سے پاؤں کے انگوٹھے تک تشنج
- ۳۔ خوف، تشک، ہو کس سازش کے ہونے کا۔
- ۴۔ شہوانی جنون، بے حیائی، کپڑا نہ پہنے، ننگا ہے، یا ننگا ہو جائے۔
- ۵۔ کانسی جو لیٹنے پر بڑھ جائے اور اٹھ کر بیٹھنے سے کم ہو۔
- ۶۔ شدید بیخوابی، چڑچڑیے اور غصیلے انسانوں کی، جو کاروباری پریشانیوں کے باعث ہو۔
- ۷۔ سنجار جو صلب ہی ثابتاً مٹن جاتے۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر اعصاب پر ہوتا ہے، مریض مالنخولیا کی محسوس تصویر ہو، طبیعت جھگڑالو، مضبوط الحواس، بے شرم اور بے حیا ہو، چپٹوں میں اینٹھن، سرسامی حالت اور اعصاب کا کمزوری سے متعلقہ عوارض میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

بچوں میں تشنجی دورے، خوف یا آنٹوں میں کیڑوں کے باعث ہشیر یا بالینزہ والا نڈیان، مریض بے چینی کے ساتھ بستر سے کود پڑے اور بھاگنے کی گوشش کرے۔ سوالات کا جواب بالکل مہمل اور بے تکلف، خیال کرے کہ وہ غلط مقام پر ہے، خیال کاموں کے متعلق بات چیت کرے۔

خوف، اکیلا ہونے سے، زہریلے جانے کا، کاٹے جانے کا، اثرات بد محبت ناکام ہونے کے، جسد و عقدہ، بے تکلف بات چیت اکثر اس کے بعد مرگی ہو۔

شہوان جنون، تنگ پڑا ہے اور بک بک کرے۔
فالج مشانہ، وضع حمل کے بعد، پیشاب کے رک جانے کے ساتھ۔
بغداد میں سرسامی کیفیت، ہوا میں اڑتے ذرات کو پکڑے یا بستر کو نوچے۔

زیادتی :- رات کو حیض کے دوران، کھانے کے بعد، لیٹنے سے۔
کسی :- بھکنے سے ۔

مصلح :- ایسک ایسڈ ، بلا ڈوفا ، چائنا ، سٹرامونیم ۔
طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک ۔

HEPAR SULPH.

ہیپر سلفر

خصوصی علامات

- ۱- ذرا سی چوٹ بھی پک جائے ۔
- ۲- پیشاب کی دھار بہت آہستہ آہستہ بغیر زور یا طاقت کے نکلے ۔
- ۳- ذکی الحسی جسمانی اور دماغی ۔
- ۴- حد سے زیادہ ذکی الحسی ٹھنڈی ہوا سے ۔
- ۵- جلد میں ذکی الحسی چھونے سے یا کپڑا مس ہونے سے ۔

عام استعمال

جہاں پیپ فارغ کرنی مقصود ہو ایہ دوا پیپ بننے کو روکتی

بھی ہے۔ مگر جب پیپ پڑ گئی ہو تو اسے جلد خارج کر کے زخم کو مندل کرتی ہے۔ نوزلی درد سر، نموتیہ، خناق، سرخ بخار کے بعد استسقاء ہو، لوزتین کا بڑر جانا، پرانہ آتشکی عوارض، جگر کا بڑر جانا، بواسیر آنکھوں کے امراض غدودوں کے عوارض اور پاپے کے استعمال کے برے اثرات بالبعد وغیرہ کے لئے مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض شام کے وقت افسردہ ہو، معمولی سی بات سے رنجیدہ ہو جائے۔ رونے پر آمادہ ہو۔

سر میں خاص گرداہنی کن پٹی میں میخ ٹھونکنے کا سادرد، ناک کی جڑ میں درد، سر کے بال گر کر کچھ ہو رہا ہو، سر پر کھجلی والے دانے آنکھوں میں ورم اور درد۔

کان سے بدبودار پیپ خارج ہو۔

چہرے کی ہڈیوں میں چھونے سے درد ہو، زہر بادی پھلے باچھوں میں۔

مسوڑھوں سے آسانی خون نکل پڑے، دانت میں درد جو گرم کمرے میں یا دبانے سے زیادہ ہو۔

ترش اور مصالحمہ دار اشیاء کی رغبت، مرغن اشیاء سے نفرت پیٹ میں ریج کا اجتماع، ران کے غدود میں سوجن۔

پتلا پاخانہ بھی دقت سے خارج ہو، دست پتلے، غیر مضہم شدہ،

سفید یا مٹی کے رنگ کے پافانے۔ پیشاب جلن کے ساتھ آئے، پیشاب
 جلن کے ساتھ آئے، پیشاب کی نالی کا منہ متورم اور پیپ آئے۔
 خشک کھانسی۔ ذات الخب میں کھانسی صبح کو زیادہ ہو۔
 بسہری کا ابتدائی درجہ، بغل کی گلٹیوں کا پکنا۔

لرزہ و تپ پیاس کے بغیر یا پیاس کے ساتھ، ذرا سی حرکت
 پر پسینہ آجائے۔

جلد ناتندرست، خفیف چوٹ بھی پک جائے۔
 زیادتی :- درد کے پہلو لیٹنے سے، ٹھنڈی ہوا سے، کپڑا اتارنے سے،
 چھونے سے۔

کمی - گرمی سے، کپڑا لیٹنے سے خاص کر سر کو، کھلنے کے بعد۔
 معاون :- کیلنڈرولا

مصلح :- ایسٹیک ایسڈ، بیل ڈونا، کیمومیلا، سلیشیا۔
 طاقت :- اسے ۲۰۰ مک (چھوٹی طاقتیں پھوڑوں کو بکاتی ہیں۔ اور
 بڑی طاقتیں میثاتی ہیں۔)

تخصیصی علامات

- ۱۔ ڈبلیوں کی سوزش، اجھار یا سرطان
- ۲۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی تکلیف

عام استعمال

جبڑوں، مسوڑھوں اور دانتوں کے عوارض میں عام طور پر مستعمل ہے اور مفید بھی۔

عمومی علامات

مسوڑھوں کے چھوٹے، ڈبھی کا غیر معمولی اجھار، دانت نکلنے کی تکلیف، ڈبلیوں کا نیچر یعنی سخت ہو جانا، ڈبلیوں کی سوزش، ڈبلیوں کے سرخان اور ہر قسم کی رسولیاں۔

ناک کی ڈبھی میں زخم، کھائے ہوئے دانت کی وجہ سے چہرہ میں عصبی درد ہونے ہوں۔ دانت درد کے ہمراہ جبڑے کے قریب سوزش ہو،

جہڑے کی ہڈیاں ٹٹھکتی ہو، مسوڑھوں میں پھوٹا ہو، گردن کے غدود بڑھے ہوتے اور سخت ہوں۔

طاقت :- چھوٹی طاقتیں ہی عام طور پر مستعمل ہیں۔ اس کا منجن بھی بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

HAMAMELIS

ہیپامیسلس

تخصّوصی علامات

- ۱- وریدوں میں دم آنے کا میلان، ماؤزہ حصص میں چوٹ لگنے کا سا اور پھوٹے کا سا درد۔
- ۲- چوڑوں سے آشوب چشم، آنکھوں میں شدید پھوٹے کا سا درد۔
- ۳- سیاہ رنگ کا سیلان خون جسم کے کسی مخرج سے۔

عام استعمال

جسم کے کسی بھی مخرج سے وریدی (سیاہ) سیلان خون ہو تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ علامہ برین اسقاطِ حمل کے سیلانِ خون کو روکنے کے لئے اور خونِ بوا سیر کے لئے بہت کارآمد ہے۔

عمومی علامات

سر میں درد جس کے ساتھ غفلت ہو، گردن، ماتھا اور سر بوجھل معلوم ہو، آنکھ کے پردے پر خون کا اجتماع۔

ناک سے خون کا بکثرت استعمال، جس سے دماغ ہلکا ہو۔

حلق کے غدود سوجھے ہوئے ہوں، مسوڑھے سوجھے ہوئے ہوں، جن سے خون نکلے۔

پیشاب سے خون جاری ہو، گردوں میں اجتماع خون، فوط کا دم، فوط کی رگ میں درد ہو جو فوطے سے دان تک ہو۔

حیض چمک دار خون والا جو جم نہ سکے۔

پھینچ پھینچوں سے خون آنا، کھانسی کے ساتھ خون جیسے ذائقہ والا بلغم خارج ہو۔

دگوں کا اجتماع خون سے پھول جانا اور ان سے ادرار خون، بواسیر، دکھن اور درد والی، خونی بواسیر۔

زیادتی :- گرم ہوا سے، تر ہوا سے، ٹیٹنے سے، دوپہر کے بعد، آگے جھکنے سے۔

کسی :- شام کو گھرتے باہر۔

معاون :- فیرم ٹیلیکیم۔

مصلح :- آرٹیکا، کیفر، چائنا، پسا ٹیلدا۔

طاقت :- مدد پھرت سے ۳۰ طاقت تک۔

EUPATORIUM PERF.

یوپٹیوریم پرف

خصوصی علامات

- ۱- شکر بیوں کی صحت کی تباہ شدہ کیفیت .
- ۲- تمام جسم میں چوڑے کا سا احساس یا ایسا معلوم ہو کہ تمام جسم ٹوٹا پڑا ہے۔
- ۳- ٹھریوں کے درد، پیٹھ میں، سر میں، سینہ میں .
- ۴- آنکھوں کی پتلیوں میں درد بھرا چھوٹے کا سا درد .
- ۵- زکام جس کے ساتھ بڑی بڑی میں درد ہو۔
- ۶- سنجار جس کے ساتھ ٹھریوں میں درد ہو۔

عام استعمال

نقرس، انفلوئنزا، ایسے عارضوں کے لئے مستعمل و مفید ہے جن میں ٹھریاں اور پسلیاں درد کریں، پسینہ بہت کم یا بالکل نہ آتا ہو۔

عمومی علامات

بوڑھے آدمیوں کی تکلیفات ۔
 صفراوی یا بلیر یا بخاروں کے لیے یا مسلسل حملوں سے پیدا شدہ تکلیفات
 کے لئے بھی مفید ہے ۔
 یہ دوا آلات ہضم و جگر، ریشہ جات، دماغی جھلیوں پر اثر کرتی ہے ۔

سر، آنکھ، ناک، اور دسم، اندر دکھن، ہوا میں نکلنے سے زیادہ ہو، روزانہ صبح
 کو متلی اور در دسم ہو، آنکھ کے ڈھیلے میں دکھن (برائیونیا، سسی سی فیوگا) روشنی
 برداشت نہ ہو (ایکونائیٹ، بیلا ڈونا، مرکیورس) زکام چھینکیں (ایکونائیٹ،
 سگونییریا) ہڈیوں میں سخت درد ۔

ٹھنڈے پانی کی پیاس (ایکونائیٹ، آرسینکم اہم، برائیونیا) متلی اور
 غذا کی قے (ایپیکاک) صفرا کی قے ہو (آرسینکم اہم، پاڈوفالکم) قے کے قبل
 پیاس ہو، ہر دفعہ پانی پینے کے بعد قے ہو (فاسفورس، سلیشیا)

گلا پڑا ہو (کاربوریک، ہیپیر فاسفورس) شام کو ہبک ہبک کرنے والی
 کھانسی، کھانسی کے ساتھ سینہ میں دکھن ۔

گردن، پیٹھ، ہاتھ، پیر، گردن اور گدی میں درد (چیلیڈونیم) کمر میں چوٹ
 کا درد (آزینیکا) کل جسم میں ایسا شدید درد کہ گویا گویا گویا پٹا گیا ہے (آزینیکا) کلائی
 میں ایسا درد کہ گویا اکھڑ گئی ہے (برائیونیا، کلکیریا، رٹاسکس)

بخار، سردی کم لگے پھر بھی لرزہ بہت ہو، کمر اور اعضا میں دکھن (سٹاسکس)
 لرزے کے بعد قے، لرزہ کے بہت پہلے پیاس شروع ہو اور لرزہ اور

تپ میں برابر جاری رہے۔ کپکپی اور بدن کی دکھن زیادہ ہو، پسینہ نہ دارد۔
یہ دوا انفلوئنزا میں، لرزہ دلے بنجار میں انتہائی دکھن، نزلہ وغیرہ
کی حالت میں بہت مفید ہے۔

لرزہ والا بنجار جو کہ روزانہ ۷ بجے سے ۹ بجے تک آئے اور دوسرے
روز دوپہر کو آئے، جسم میں درد اس قدر زیادہ ہو کہ کل جسم کو ٹاپٹاپا ہوا محسوس
ہو جیسے ہڈی ہڈی ٹوٹی جاتی ہے، لرزہ کے اقتتام پر اور بنجار سے پہلے
قتے ہو، درد سر شدید ہو، پسینہ بہت کم آئے یا بالکل نہ آئے، انفلوئنزا یعنی
نزلہ والا بنجار جس میں کہ بدن میں سخت درد ہو، آنکھ کے ڈھیلے میں دکھن، سر
میں تپکن، گدی میں درد، پیاس، متلی اور صفر اکی جے، ہچکلی، زکام، چھینٹکیں،
گلا پٹا ہوا، کھانسی اور سینہ میں دکھن، رات کو کھانسی زیادہ ہو، کمر ہاتھ
اور پیرا لٹرض کل جسم کے گوشت میں درد ہو۔

زیادتی :- نوبت تیسرے یا ساتویں دن بائیں جانب
کمی :- بات چیت سے، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہونے سے۔
طاقت :- مدر نکچر سے ۳ طاقت تک۔

EUPHRASIA

یوفریسیا

خصوصی علامات

- ۱۔ تیز سوزش پیدا کرنے والے آنسو، بہتے والے زکام کے ساتھ۔
- ۲۔ آنکھ سے ہر وقت پانی بہے۔
- ۳۔ حیض درد بھرے جو صرف ایک گھنٹہ رہیں۔
- ۴۔ کھانسی کے دوران آنکھوں سے آنسوؤں کی زیادتی، کھانسی صرف دن کے وقت۔ (قیرم، نیٹرم میور)

عام استعمال

آلات تنفس کی بلغمی جھلی اور آنکھ اور ناک کی رطوباتی جھلیوں سے رطوبت کثرت سے جاری ہو، نزلہ، زکام کی کیفیت ہو، نیز آنکھوں کی مختلف تکالیف میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

آنکھ میں جلن اور پانی بہنا، آنکھوں سے پانی نکلے جو جلد کو کاٹتا

ہوا محسوس ہو، آنکھوں میں کھجلی اور جلن (مرکیوریس اور سلفر) نگاہ دھندلی ہو، ایسا معلوم ہو کہ آنکھ کے سامنے پردہ پڑا ہے (کاسٹیکم، مرکیوریس، پٹرو لیم، پلسا ٹیلا، سلفر) ایسا معلوم ہو کہ آنکھ کے کناروں پر کچھ بھرا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے نگاہ دھندلی ہو جائے اور مجبوراً پلکوں کو دبانا پڑے۔ (کروکس، پلسا ٹیلا) ایسا معلوم ہو کہ آنکھ پر بال لگا ہوا ہے۔ جس کو مٹانا چاہئے۔ روشنی کی طرف دیکھنا جاسکے۔

شدید زکام، گاڑھی رطوبت بکثرت ناک سے خارج ہو (آر سینکم اہم مرکیوریس) اس کے ساتھ جلتے آئسو آنکھ سے بہیں۔ روشنی کی طرف دیکھنا جاسکے۔ شام اور رات کو تکلیف زیادہ ہو، زکام کے بغیر ہی بہت چھینکیں آئیں۔ (کیمو میلا)

نزلہ کی وجہ سے آواز بگڑی ہوئی (ایکونائیٹ، کاربوویج، ہیرسپلر، ٹاسفورس) صبح کو اٹھنے پر کھانسی ہو اور کثرت سے بلغم نکلنے سینے کے بیچ کی ہڈی کے نیچے درد۔

جاگنے میں اور کھلی ہوا میں جمائیاں آئیں۔ ہیرنگ صاحب کے آزمودہ علامات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا آنکھ کے ہر قسم کے امراض میں خواہ ^{حالا} دہوں یا مزمن ہوں، مفید ہے۔ خاص علامات یہ ہیں۔

آنکھوں سے پانی بہتا ہو، آنکھوں میں چیچا کچھ جمع ہوا، آئسو اور جلن، زکام میں درد، آئسو آنکھوں سے پانی بہے، زکام اور نزلہ میں آر سینکم اور مرکیوریس سے مشابہ ہے۔ انفلوئنزا میں بہت کارآمد ہوتی ہے۔ ایلیم سڈیا اور یوفریشیا کے زکام میں یہ فرق ہے۔ کہ

یو فریشیا میں آنکھ سے خراش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔
لیکن ناک محفوظ رہتی ہے۔ اس کے برعکس ایلیم سپا میں ناک سے
خراش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اور آنکھ کی
رہتی ہے۔

قبض، حیض درد کے ساتھ قلیل، صرف ایک گھنٹہ یا ایک دن
رہے۔ اس کے ساتھ آشوب چشم بھی ہو، کھانسی، کالی کھانسی
خسرہ کی بیماری کا ابتدائی درجہ جس میں آنکھ کی تکلیف ہو۔
زیادتی :- صبح کو شام کو، مکان کے اندر، گرمی سے، روشنی سے
کمی :- قہو سے، اندھیرے میں کھانا کھانے سے، مکان کے باہر
گھومنے سے، سو کر اٹھنے کے بعد۔

معاون :- ایکونائٹ، کلکیریا، کونیم، نکس و امیکا، فاسفورس،
پلسا ٹیل، رسٹاکس، سلیشیا۔

مصلح :- کیمفر، کاسٹیکم، پلسا ٹیل۔

طاقت :- ۳ سے ۲ طاقت تک۔



• ادارے کی نئی طبی اور جدید کتب

آرٹ آف ہومیو پیتھی
Art Of Homoeopathy



سیلیکٹ میٹریا میڈیکا (انگریزی)

ایٹن، بی، کمپو، بوگر، بورک، کینٹ



آ کو پریشتر سے علاج



آ کو پنچجر سے علاج

(پیشی طریقہ علاج)



عابد کینٹ گائیڈ



پشاور بازار کتب

اردو بازار لاہور

Ph # 042-7680736

شیخ مجتبیٰ کتب خانہ سینٹر

القسم کار

www.pdfbooksfree.pk